

THE UNIVERSITY

OF ILLINOIS

LIBRARY

580.1

L64s16

v.4 2

BIOLOGY.

BIOLO

JUL 17 1953

JUL - 3 1970

JUL 17 1970

CAROLI LINNÆI,

EQUITIS STELLAE POLARIS, ARCHIATRI REGII, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. UPSAL.

SYSTEMA VEGETABILIUM.

EDITIO DECIMA SEXTA,

CURANTE

CURTIO SPRENGEL,

EQUITE STELLAE POLARIS ET AQUILAE RUBRAE, PROF. MED. ET REI HERB. IN UNIVERS. HAL.

VOLUMINIS IV. PARS II.

CURAE POSTERIORES.

GOTTINGAE,

SUMTIBUS LIBRARIAE DIETERICHIANAE.

1827.

530.1
L64s16
v.4 pt2

CURAE POSTERIORES

IN

SYSTEMA VEGETABILIUM.

261306

Digitized by the Internet Archive
in 2010 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/systemavegetabil42linn

AD

VOLUMEN I.

CLASSIS I.

pag. 3.

n. 5. *Phrynium* W. Anthera lateralis in filamento petaloideo. Stigma incurvum.

pag. 4.

n. 18. *Ditmaria* *. Add. Stam. 3, 4 ſterilia.

n. 21. *Cucullaria* Schreb. Capſ. 3locularis. Sem. ſolitaria apice alata.

n. 22. *Qualea* Aubl. del. glandula. Petalum 1 obcordatum. Fructus 3locularis 3valvis, placenta columnari centrali libera.

Poſt n. 24. *Amphilochia* Mart. Cal. 5ſepalus, ſepalo ſummo breviter calcarato. Petalum 1 obcordatum unguiculatum. Anthera 4locularis. Capſula corticata 3locularis 3valvis, loculis ſub-1ſpermis. Congruit quidem fructu cum Agardhia *, quam cuperem cum illa jungere, ſi modo calcar ſepali et petalum unquam diſpexiſſem, antherae etiam loculis binis, haud quaternis, adverſantibus. Cum propter antheſin nondum in meis ſpeciminibus evolutam rite contemplari perianthium nequeam, largior, ſepalis ſubeſſe petalum unum vel alterum, ita ut character potius ſit: Cal. 5ſepalus. Petalum 1 vel 2. Et Vochiſieis potius quam Terebinthaceis adnumeranda Agardhia. Quodſi forte olim cum Amphilochia conjungitur, prius tamen nomen meum eſt, etiamſi genus melius a Martio examinatum.

pag. 5.

n. 26. *Salomonia* Lour., Donio ſuadente ad Monadelphiam ablegator.

n. 37. *Callitriche.* Anthera 2locularis. Nux 4ſperma.

n. 50. *Triſticha* Thuars. non Lour. melius Junceis adnumeratur.

pag. 7.

Canna indica Ait. *Indiam occidentalem* patriam habent. Add. ad n. 10.

orientalis Roſc. 15. C. foliis oblongis glabris, floribus ſeſſilibus, bracteis duplicibus, laciniis labii ſuperioris erectis lanceolatis 2dentatis, labio inferiori revoluto 2fido. *Ind. or.* (C. chinenſis W., indica Ro :

pedunculata Rosc. sic melius definitur: C. foliis oblongo-lanceolatis, floribus racemosis geminis longe pedunculatis, calyce reflexo, laciniis corollae emarginatis. *Ind. occ.* Deleatur synon. W.

pallida Rosc. 16. C. foliis oblongis glaucis, bracteis pubescentibus, laciniis labii superioris erectis obtusiusculis, corolla maculata. *Inf. Carib.*

Ad C. *patentem* Rosc. add. patriam *Inf. Helenae.*

Ad C. *latifoliam* Rosc. add. caule villoso.

Ad C. *luteam* Rosc. add. patriam *Amer. austr.*

C. *speciosa* Rosc. habet flores pedunculatos, haud sessiles. Add. ad n. 13.

compacta Rosc. 17. C. foliis ovato-oblongis late marginatis, spica compacta, laciniis corollae subemarginatis. *Patria?*

††† *Labium corollae superius* 0.

denudata Rosc. 18. C. caule fruticoso, foliis subcoriaceis costatis, floribus sessilibus, labio corollae infer. lanceolato acuto erecto. *Patria?*

brasiliensis Rosc. 19. C. caule herbaceo, foliis ovato-oblongis costatis margine coloratis, floribus pedunculatis, labio corollae infer. spathulato erecto. *Brasil.* (C. denudatae var. Rosc.)

pag. 8.

Ad Calatheam Meyer. accedunt:

flavescens Lindl. 4. C. foliis radicalibus oblongis costato-venosis subtus glaucis, capitulo sessili multifloro, sepalis exterioribus acuminatis. *Brasil.* Bot. reg. 932.

violacea Lindl. 5. C. caule tereti folioso, foliis ovali-oblongis acutis subtus purpurascentibus, capitulo multifloro, sepalis acutis. *Brasil.* Bot. reg. 961.

Ad Marantam.

angustifolia Sims. 11. M. caule nodoso, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, panicula flexuosa, bracteis internis coloratis, calyce ovato. *Peru.* Bot. mag. 2398.

bicolor Ker. 12. M. acaulis, foliis ellipticis supra maculatis subtus purpurascentibus, petiolis medio paniculigeris, paniculae articulatae ramulis fasciculatis bracteatis, bracteis lanceolatis cuspidatis. *Brasil.* Bot. reg. 786.

M. *Tonchat* Aubl. melius sic: M. caule fruticoso ramoso, ramis dichotomis pilosis, foliis ovatis glabris petiolatis, racemis terminalibus paucifloris. *Guiana.*

furcata Mart. 13. M. caule stricto dichotomo, foliis oblongo-lanceolatis subsessilibus glaberrimis, pedunculis geminis 2floris, germinibus pubescentibus. *Brasil.*

cristata Mart. 14. M. caule ramoso herbaceo, foliis longe petiolatis oblongis subtus pubescentibus, pedunculis cristato-paniculatis secundis, pedicellis 2floris. *Brasil.*

ſpicata Aubl. 15. M. acaulis, foliis oblongis acuminatis glaberrimis, ſpica imbricata lanceolata. *Guiana. Braſil.*

M. *zebrina* Sims. a Roſcoeo Phryniis adnumeratur.

Ad Phrynium.

grandiflorum Roſc. 7. Phr. acaule, petiolis baſi incraſſatis medio floriferis, bracteis 1floris. *Braſil.*

Ad Phr. *dichotomum* Roxb. accedit ſynonymon Donax Arundaſtrum Lour.

ovatum Mart. 8. Phr. foliis radicalibus oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, ſcapo 1folio, ſpica ovata. *Braſil.*

pag. 9.

Ad Hedychium.

flaveſcens Carey. 12. H. foliis lanceolatis elongatis ſubtus pubeſcentibus, ſpica imbricata, bracteis inferioribus obtuſiſſimis ciliatis, ſuperioribus cylindricis 2-3-floris, filamento labellum bilobum ſubaequante. *Bengal.*

maximum Roſc. 13. H. foliis oblongis ſubtus pubeſcentibus, ſpica capitata, bracteis obtuſis ciliatis, calyce villoſo, labello amplo bilobo filamentum ſuperante. *Ind. orient.*

aurantiacum Roſc. 14. H. foliis diſtichis linearibus, coſta ſubtus villoſa, ſpica imbricata, bracteis cylindricis ſub-3floris, filamento labellum bilobum bis ſuperante. *Ind. or.* (H. anguſtifolium Bot. mag. 2078.)

glaucum Roſc. 15. H. foliis lanceolatis acuminatis undulatis ſubtus glaucis, ſpica gracili, bracteis 1floris, labelli 2partiti laciniis linearibus, filamento longiſſimo. *Ind. or.*

acuminatum Roſc. 16. H. foliis lanceolatis ſubtus villoſis, ſpica laxa, bracteis 1floris, labello acute 2partito filamentum incurvum ſuperante. *Nepal.*

heteromallum Ker. 17. H. foliis oblongis ſubtus ſericeo-villoſis, ſpica laxe imbricata conica, bracteis ternis 1floris, labello 2partito, filamento longiſſimo. *Ind. orient.* Bot. reg. 767.

Gardnerianum Wall. 18. H. foliis oblongis acuminatis undulatis glabris, ſpica patula, bracteis 2floris, filamento labellum late ovatum 2fidum bis ſuperante. *Nepal.*

carneum Carey. 19. H. foliis diſtichis lanceolatis glabris, ſpica laxa, bracteis convolutis ciliatis 1floris, filamento labellum 2fidum ſuperante. *Bengal.* Bot. mag. 2637.

longifolium Roſc. 20. H. foliis lanceolatis elongatis glaucis, coſta media ſubtus hirſuta, ſpica patente elongata, bracteis 2floris, labello 2lobo, filamento longiſſimo. *Bengal.*

Ad H. *anguſtifolium* notandum Roxb. deſcr. non ic. Icon enim Roxburghii refert H. coccineum Sm. n. 8.

Ad H. *flavum* Roxb. — foliis lanceolatis marginatis ſubtus villoſis, filamento labellum acquante.

Ad H. *elatum* R. Br. — foliis oblongo-lanceolatis ſubtus villoſis glaucis, ſpicis elatis multifloris, labello 2lobo.
Ad H. *ſpicatum* Sm. — foliis lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, ſpica terminali laxa foliis breviore, labello 2fido filamentum ſuperante.
Ad H. *thyrſiforme* Sm. — bracteis convolutis reflexis 2-3floris, labello 2partito, filamento longiſſimo.
Ad *Kämpferam rotundam* pertinet ſyn. K. longa Jacqu.

pag. 10.

Ad Kämpferam.

marginata Carey. 7. K. foliis ſubrotundo-ovatis marginatis ſubtus glaucis pubeſcentibus, filamento labelloque 2lobis, lobis emarginatis. *Ind. or.*
Ad K. *ovalifoliam* Roxb. — labello 2lobo, lobis mucronatis, filamento 3fido, lacinia media emarginata.
Ad K. *anguſtifoliam* lege Smith. non Roſc.

Ad Curcumam.

Poſt n. 9. *latifolia* Roſc. 18. C. tuberibus ſubrotundis pyriformibus, foliis lato-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, ſpica comoſa, bracteis cucullatis flores ſuperantibus, labello oblongo ſubintegro biſtriato. *Ind. orient.*
Ad C. *Zedoariam* Roſc. — foliis utrinque ad coſtam purpureis, ſpica radicali. (Amomum Zerumbet König., Curcuma Zerumbet Roxb.)
Ad C. *aromaticam* Salisb. — foliis ſubtus ſericeis, ſpica laterali. (C. Zedoaria Roxb.)
Ad C. *ferrugineam* Roxb. — ſcapo ſolo (non foliis ſubtus) ferrugineo, laciniis corollae lanceolatis erectis.
Ad C. *rubeſcentem* Roxb. nota, ſpicam ſubinde eſſe centralem.
Ad C. *elatum* Roxb. — foliis *ſubtus* villoſis, ſpica comoſa, bracteis cucullatis corollas ſubaequantibus.
Ad C. *Amadam* Roxb. — ſpica compacta comoſa, coma roſea.

pag. 12.

Ad Zingiber Gärtn.

Poſt n. 6. *chrysanthum* Roſc. 15. Z. ſpica ſeſſili imbricata, bracteis oblongis, ſuperioribus acumine torto hirſuto terminatis, labello 3lobo, lobo medio porrecto 2fido. *Nepal.*
Ad Z. *officinale* Roſc. — ſpicis pedunculatis, bracteis obtuſiſſimis, labelli 3lobi lobo medio latiori emarginato.
Ad Z. *rubens* Roxb. — labello oblongo obtuſo 3lobo.

pag. 13.

Ad Z. *capitatum* Roxb. — bracteis interioribus oblongis obtuſiusculis.

Ad Coſtum.

Piſonis Lindl. 13. C. foliis oblongis acuminatis carnoſis glabris, capitulo terminali, bracteis obtuſis, inferioribus foliaceis. *Braſil.* Bot. reg. 899.

maculatus Roſc. 14. C. caule hirſuto maculato, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, ſpica radicali imbricata, bracteis obtuſis, labello obovato denticulato biſtriato. *Afric. tropic.* (C. afer β. Ker. in bot. reg. 683.)

nepalenſis Roſc. 15. C. foliis lanceolatis ſubtus villoſis, vaginarum ore ciliato, ſpica terminali capitata, bracteis ovatis coloratis, labello latiſſimo undulato crenato hyalino. *Nepal.*

Ad C. *ſpicatum* Sm. (non Sw.) — ſtigmate 2lobo, lobis quadratis ciliatis, poſtice proceſſibus lanceolatis acutis.

pag. 14.

Ad Helleniam W.

Ad H. *coeruleam* R. Br. — racemo terminali inclinato, labello 3lobo baſi 2calloſo, lobo medio emarginato.

Ad Alpiniam.

tubulata Ker. 15. A. foliis remotis oblongis glabris, ſcapo radicali ſtricto villoſo, bracteis ſcarioſis flores ſubaequantibus, floribus tubuloſis, labello incluſo, anthera ſeſſili. *Ind. occid.?* Bot. reg. 777.

auriculata Roſc. 16. A. foliis lanceolatis coſta media utrinque ferrugineo-piloſa, racemo pendulo, labello ſubrotundo crenato, baſi proceſſibus auriculatis. *Inſ. Molucc.*

diffiſſa Roſc. 17. A. foliis lanceolatis marginatis, ſpica pendula, labello panduriformi, filamento 2fido diandro. *China.* Roſc. ſcitam. t. 54.

Ad A. *calcaratam* Roſc. — filamento 2fido, ramulo altero antherifero.

pag. 15.

Ad Globbam.

Königiana * 13. Gl. foliis ovato-oblongis glabris, racemi ſpicati pedicellis 3floris, antherae proceſſibus retuſis ſubcarnoſis. *Ceilon.* (Hura Siamenſium König apud Retz. obſ. 3. p. 49.)

Ad Gl. *ſubulatam* Roxb. — bracteis oblongis coloratis.

cuſpidata Mart. 14. Gl. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris, vaginis ciliatis, ſpica ſeſſili foliorum vaginis involuta. *Braſil.*

Ad Lopeziam Cav.

Lopeziae hirſutae Jacqu. proxima L. pubeſcens W.

pag. 16.

Ad Ditmariam *.

floribunda * 1. D. foliis obovatis, ramulis ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis paniculae breviſſimis incraſſatis. *Guiana.*

violacea * 2. D. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis, ramis ſubferrugineis, pedunculis paniculae elongatis

gracilibus. *Brafil.* (Eriſma violaceum Mart. nov. gen. t. 82., Qualea calcarata Link.)

Ad Cucullariam.

rotundifolia * 5. C. foliis verticillatis ſubſeſſilibus cordato-orbiculatis emarginatis coriaceis glaucis, racemis ſolitariis, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 83.)

elliptica * 6. C. foliis verticillatis ſubſeſſilibus cordato-ellipticis emarginatis coriaceis glaucis, racemis ſolitariis, germinibus villoſis. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 84.)

Tucanorum * 7. C. foliis verticillatis petiolatis ſpathulatis emarginatis glabris, racemis terminalibus, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 85.)

rufa * 8. C. foliis verticillatis petiolatis oblongis obtuſis ſubtus parallele venoſis, junioribus, pedunculis calycibusque ferrugineo-tomentoſis, racemis longiſſimis ſparſifloris, calycibus obtuſiusculis, germinibus hirſutiſſimis. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 86.) C. *tomentoſa* Meyer. praeter folia decuſſatim oppoſita acuminata calycibus etiam acutis differt.

grandis * 9. C. foliis verticillatis petiolatis ſpathulatis membranaceis utrinque glabris, racemis cylindricis elongatis aggregatis, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 88.)

Hänkeana * 10. C. foliis verticillatis longe petiolatis oblongis emarginatis baſi attenuatis utrinque glabris, racemis terminalibus compoſitis aggregatis, germinibus tomentoſis. *Peru.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 89.)

pyramidalis * 11. C. foliis verticillatis oppoſitisque petiolatis ovato-oblongis acuminatis ſubtus pedunculisque villoſis, racemo terminali, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 90.)

floribunda * 12. C. foliis verticillatis oppoſitisque petiolatis ovato-lanceolatis cuſpidatis ſubtus ſcabris, racemis aggregatis, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 91.)

ferruginea * 13. C. foliis oppoſitis petiolatis oblongis cuſpidatis ſubtus reticulatis ramisque fuſco-tomentoſis, racemis ſtrictis elongatis, germinibus glabris. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 92.)

alpeſtris * 14. C. foliis oppoſitis petiolatis oblongis obtuſis utrinque glabris, racemis elongatis, germinibus laevibus. *Brafil.* (Vochyſia Mart. nov. gen. t. 87.)

pag. 17.

Ad Qualeam.

multiflora Mart. 5. Qu. foliis oppoſitis ternisve oblongis acutis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemis axillaribus cymoſis abbreviatis piloſis, calycibus hirſutiſſimis. *Brafil.*

parviflora Mart. 6. Qu. pulverulento-tomentoſa, foliis alternis oblongis obtuſiusculis venoſis, racemis terminalibus ſubpaniculatis, calcare obtuſo. *Braſil.*

ecalcarata Mart. 7. Qu. foliis oblongis acuminatis ſubtus venoſo-reticulatis fulvo-pubeſcentibus, racemis lateralibus paucifloris, calyce ecalcarato, corolla 2petala 1andra vel 1petala 2andra. *Braſil.*

grandiflora Mart. 8. Qu. foliis breviter petiolatis ovato-lanceolatis acutis elongatis ſubtus reticulatis pubeſcentibus, floribus axillaribus ſubſolitariis, calycibus hirſutis, calcare elongato. *Braſil.*

faſciculata * 9. Qu. foliis ovato-oblongis obtuſis ſubtus villoſis, floribus axillaribus faſciculatis. *Braſil.* (Callisthene Mart.)

diſticha * 10. Qu. ramis diſtichis patentiſſimis, foliis oppoſitis ſubſeſſilibus elliptico-oblongis utrinque glabris, floribus ſolitariis axillaribus. *Braſil.* (Callisthene major Mart. nov. gen. t. 75.)

minor * 11. Qu. ramis patentibus, foliis diſtichis lineari-oblongis glabriusculis glanduloſo-mucronatis, floribus axillaribus ſolitariis, calcare obtuſo. *Braſil.* (Callisthene minor Mart. nov. gen. t. 76.)

AMPHILOCHIA Mart.

dichotoma Mart. 1. A. ramis dichotomis divaricatis pubeſcentibus, foliis ſubcordato-oblongis obtuſis ſubtus villoſiusculis, racemis terminalibus verticillatis, calcare breviſſimo. *Braſil.*

cordata Mart. 2. (Qualea cordata * n. 4.)

pag. 19.

Ad Hippurin.

montana Ledeb. 3. H. flaccida ſubramoſa, foliis ſenis linearibus acutis. *Ora occid. Amer. bor.*

pag. 22.

Ad Blitum.

maritimum Nutt. 4. Bl. glomerulis axillaribus ſpicatis, calycibus membranaceis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis inciſo-dentatis. *Nov. Caeſar.*

Ad Triſticham Thuar.

hypnoides * 3. Tr. caule breviſſimo ramoſo, foliis ſparſis minimis ovato-3angularibus, pedunculis terminalibus 2-ſpathaceis. *Braſil.* (Dufourea Hilar.)

CLASSIS II.

pag. 24.

Poſt n. 63. *Bolivaria* Schlechtend. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis 5partita. Stam. tubo inſerta. Stigma capitatum. Capſ. didyma 2locularis circumſciſſa, loculis 2ſpermis. Sem. reticulato-arillata.

Poſt n. 66. *Labichea* Gaudich. Cand. Cal. 3partitus. Pet. 5 orbiculata. Antherae inaequales, altera apice producta. Stylus filiformis. Germen compreſſum 2ovulatum.

pag. 25.

n. 70. *Henckelia* *. Add. ad characterem. Capſ. filiquaeformis 2locularis 2valvis dorſo dehiſcens, placentis revolutis, ut ſpeciem 4locularis faciat. Sem. nuda.

Lyſionotus Don. Cal. 5partitus. Cor. campanulata, limbo 5lobo. Stam. 2 ſterilia. Stigma ſubinfundibuliforme. Capſ. Henckeliae. Sem. muricata utrinque comoſa.

n. 73. *Sciuris* Schreb. deleatur, reducenda ad Galipeam Aubl. p. 518. n. 856.

pag. 27.

Poſt n. 102. *Aïdelus* *. Cal. 4partitus. Pet. 4 calyce multo breviora. Stam. breviſſima. Stigma ſeſſile. Capſ. compreſſa 1locularis 2valvis, placenta libera centralis. *Caryophylleae?*

Hemianthus Nutt. Cal. tubuloſus 4dentatus inferne fiſſus. Cor. lab. ſup. obſoletum, inf. 3partitum, lacinia media ligulata. Filamenta 2fida, ramulo altero antherifero. Capſ. 1locularis 2valvis polyſperma. *Primuleae.*

Oncoma *. (Oxera Labill.) Cal. 4partitus ſcarioſus. Cor. tubuloſa, fauce dilatata, limbo 4lobo inaequali. Stam. fertilia exſerta, 2 ſterilia. Stigma 2fidum. Germen 4lobum polyſpermum diſco 4lobo impoſitum. *Bignonieae.*

pag. 29.

n. 139. *Laciſtema* Sw. habet potius Capſulam 3valvem 1ſpermam.

pag. 30.

Ad n. 10. *Jasminum trinerve* Vahl. Cor. limbus 6-8partitus. Laciniae corollae lanceolatae tubo multo breviores.

ſtenopetalum Lindl. 46. J. ſcandens laeve, foliis ovato-lanceolatis acuminatis 3nerviis, laciniis calycis ſubulatis, corollae filiformibus tubo multo longioribus. *Ind. or.* (J. trinerve Roxb.)

pag. 31.

Ad n. 13. (Mogorium myrtifolium Lam.)

Poſt n. 14. *nepalenſe* *. 47. J. foliis oppoſitis ellipticis acuminatis integerrimis glabris lucidis, pedunculis trichotomis 3floris, laciniis calycis ſubulatis abbreviatis, corollae linearibus obtuſis. *Nepal.* (J. dichotomum Don.)

Ad n. 15. J. *bracteatum* Roxb. eſt volubile, foliis ellipticis obtuſiusculis.

Ad n. 17. (Nyctanthes grandiflora Lour.)

pag. 32.

Poſt n. 39. *heterophyllum* Roxb. 48. J. foliolis ſubrotundo-ovatis acuminatis glabris, paniculis corymboſis pubeſcentibus, dentibus calycis obſoletis. *Nepal.*

pag. 33.

Poſt n. 44. *pubigerum* Don. 49. J. foliolis ſeſſilibus pubeſcentibus ovato-oblongis acutis, pedunculis 1floris elongatis, ramis angulatis hirtis. *Nepal.*

aureum Don. 50. J. foliolis ovatis acutis glabris 3nerviis, paniculis lateralibus paucifloris, ramis 3angulis glabris. *Nepal.*

Ad Liguſtrum.

n. 2. L. *japonicum* Thunb. — paniculae pedicellis glabris.

bracteolatum Don. 5. L. foliis ovato-lanceolatis acutis utrinque ramulisque glabris, paniculae ramis brachiatis piloſiſſimis bracteatis. *Nepal.*

Ad L. *nepalenſe* Wall. (L. ſpicatum Don.)

pag. 35.

Ad Notelaeam Vent.

Poſua Don. 6. N. foliis oppoſitis oblongis acuminatis, pedunculis axillaribus 1floris cernuis aggregatis, laciniis calycis aequalibus. *Nepal.*

Ad Linocieram Sw.

Ad n. 3. (Chionanthus ceilanica L.)

pag. 36.

Poſt Fontaneſiam:

BOLIVARIA Schlechtend.

integrifolia Schlechtend. 1. B. foliis lanceolatis integerrimis. *Braſil.*

triſida Schlechtend. 2. B. foliis linearibus pinnatifidis ſcabris. *Braſil.*

pag. 37.

Ad n. 12. (Piſonia mexicana W.)

Poſt Codarium:

LABICHEA Gaudich.

caſſioides Gaud. *Nov. Holl. occ.* Frutex foliis pinnatis, floribus racemoſis luteis.

pag. 38.

Ad Schwenckiam.

Poſt n. 4. *molliſſima* Mart. 5. Schw. foliis cordato-ovatis obtuſis molliſſime villoſis, racemis terminalibus compoſitis, floribus ſubſeſſilibus ſecundis. *Braſil.*

pubeſcens Mart. 6. Schw. foliis ovatis acuminatis pubeſcentibus, pedunculis filiformibus. *Braſil.*

Hilariana Cand. 7. Schw. caule gracili foliisque lanceolatis glabris, pedunculis laxe paniculatis filiformibus. *Braſil.* Cand. hort. genev. t. 10.

HENCKELIA *.

* *Cauleſcentes.*

barbata * 1. H. fruticoſa erecta, foliis oppoſitis ovatis acuminatis integerrimis hirſutis, pedunculis axillaribus paucifloris, ſtaminibus apice barbatis. *Sumatra.* (Didymocarpus barbata Jack. Syſt. veg. 2. p. 837.)

fruteſcens * 2. H. ſuffruticoſa erecta, foliis oppoſitis longe petiolatis ovato-lanceolatis ſubſerratis ſubtus incanis, pedunculis axillaribus aggregatis paucifloris. *Inſ. Pulo-Pinang in freto Malaccae.* (Didymocarpus fruteſcens Jack. Syſt veg. l. c.)

corniculata * 3. H. ſuffruticoſa erectiuscula, foliis alternis obovatis acutis ſerratis villoſis, pedunculis axillaribus elongatis, floribus faſciculatis ſecundis. *Sumatra.* (Didymocarpus corniculata Jack. Syſt. veg. l. c.)

aromatica * 4. H. herbacea pubeſcens, foliis petiolatis oppoſitis ſubrotundo-ovalibus obtuſis crenatis ſupra ſericeis, ſupremis ſeſſilibus ſubcordatis, pedunculis terminalibus paucifloris calycibusque glanduloſo-piloſis. *Nepal.* (Didymocarpus aromatica Wallich. Don.)

crinita * 5. H. herbacea erecta, foliis alternis ſpathulatis acutis ſerratis piloſis ſubtus rubris, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris petiolo adnatis. *Inſ. Pulo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus crinita Jack. Syſt. veg. l. c.)

racemoſa * 6. H. herbacea erecta, foliis oppoſitis lanceolatis duplicato-ſerratis ſupra glabris ſubtus piloſis, pedunculis axillaribus 2fidis racemoſis. *Sumatra.* (Didymocarpus racemoſa Jack. Syſt. veg. l. c.)

elongata * 7. H. herbacea erectiuscula, foliis oppoſitis ovatis utrinque attenuatis ſerratis papilloſo-piloſis, racemis axillaribus ſecundis, pedicellis binatis remotis, corolla elongata. *Inſ. ad oram Sumatrae.* (Didymocarpus elongata Jack. Syſt. veg. l. c.)

villoſa * 8. H. herbacea villoſiſſima, foliis petiolatis ovalibus duplicato-crenatis, pedunculis ſolitariis multifloris, calycibus laevibus. *Nepal.* (Didymocarpus villoſa Don.)

oblonga * 9. H herbacea lanata, foliis breviter petiolatis elliptico-oblongis acutis duplicato-ſerratis rugoſis ſubvilloſis, pedunculis geminis paucifloris,

calycibus glabris. *Nepal.* (Didymocarpus oblonga Wallich. Don.)

primulaefolia * 10. H. herbacea pubescens, foliis petiolatis cordato-ovalibus bicrenatis utrinque rugosis sericeis, pedunculis geminis multifloris calycibusque pilosis. *Nepal.* (Didymocarpus primulaefolia Don.)

reptans * 11. H. herbacea reptans, foliis ellipticis crenulatis villosis, pedunculis axillaribus subaggregatis 1floris. *Inf. Pulo-Pinang in freto Malacc.* (Didymocarpus reptans Jack. Syst. veg. l. c.)

** *Acaules, scapo subumbellifero.*

incana * 12. H. foliis radicalibus longe petiolatis ovatis obtusis inciso-crenatis rugosis dense lanatis, scapo elongato multifloro glabro, involucris calycibusque villosis. *Ind. or.* (Gratiola montana Rottl., Röttlera incana Vahl.)

plicata * 13. H. foliis radicalibus subsessilibus cordato-orbiculatis carnosis margine revolutis rugoso-plicatis candido-sericeis, scapo elato pubescente multifloro. *Nepal.* (Didymocarpus plicata Don.)

macrophylla * 14. H. foliis radicalibus cordato-ovalibus dentato-crenatis supra villosis subtus nudiusculis, scapo foliis breviori glabro, involucris calycibusque rotundatis. *Nepal.* (Didymocarpus macrophylla Wallich. Don.)

cinerea * 15. H. foliis radicalibus petiolatis cordato-ovalibus inaequaliter crenatis supra cinereo-tomentosis, scapo foliis breviori farinoso paucifloro, involucris subdentatis tomentosis. *Nepal.* (Didymocarpus cinerea Don.)

Henckeliae genus constitui 1817, Vahlius jam 1804 Röttleram, falso scriptam, cum Rottlera alia a Roxburghio 1795 jam optime constituta fuisset. Tandem 1822 Jackius Henckeliam Didymycarpi haud apto nomine insignivit.

LYSIONOTUS Don.

serratus Don. *Nepal.* Herba perennis erecta glabra, foliis ternis lanceolatis coriaceis serratis, floribus umbellatis roseis.

Ad Schizanthum.

pinnatus R. et P. 1. Sch. glanduloso-pubescens, foliis pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusis dentatis, pedunculis erectis subracemosis. *Chili.*

porrigens Hook. 2. Sch. glanduloso-pilosus, foliis 2pinnatifidis, laciniis oblongo-linearibus obtusiusculis crenatis, pedunculis paniculatis divaricatis. *Chili.* Hook. exot. tl. t. 86.

Sciuris omnino p. 38. 39. deleatur.

pag. 39.

Ad Cyrtandram Forst.

Tres species enumeratae frutescunt, corollaque gaudent ringente. His accedunt novae:

frutescens Jack. 4. C. suffrutescens, foliis lanceolatis serratis glabris, pedunculis axillaribus 3floris. *Sumatra.*

rubiginoſa Jack. 5. C. fruteſcens erecta, foliis obovato-lanceolatis ſerratis glabris, pedunculis axillaribus 1floris faſciculatis calycibusque viſcoſo-piloſis. *Sumatra.*

Ab his recedunt *Herbaceae*, foliorum altero minori, floribus ſaepe capitatis involucratis, corolla ſubirregulari.

macrophylla Jack. 6. C. ſuberecta, foliis ampliſſimis ſubrotundo-ovatis acutis ſerratis glabris, altero ſtipulaeformi, pedunculis petiolo brevioribus, involucro 1phyllo. *Sumatra.*

maculata Jack. 7. C. humilis, foliis cordato-ſubrotundis acutis ſerratis ſupra glabris ſubtus villoſiusculis, corollis maculatis. *Sumatra.*

bicolor Jack. 8. C. erectiuscula, foliis cordato-lanceolatis margine revolutis ſupra glabris ſubtus villoſis purpureis, pedunculis petiolo brevioribus. *Sumatra.*

hirſuta Jack. 9. C. aſcendens piloſa, foliis cordato-ovatis obtuſiusculis crenatis, capitulis paucifloris hirſutis, involucro 2partito. *Sumatra.*

glabra Jack. 10. C. foliis late ovatis ſerratis glabris, pedunculis abbreviatis, involucro 1phyllo. *Sumatra.*

incomta Jack. 11. C. erecta hirſuta, foliis ovato-ellipticis ſerratis, pedunculis abbreviatis, involucro 2phyllo. *Sumatra.*

peltata Jack. 12. C. aſcendens, foliis longe petiolatis peltatis ovatis acuminatis obtuſe ſerratis glabris, pedunculis abbreviatis. *Sumatra.*

carnoſa Jack. 13. C. ſcandens, foliis inaequalibus carnoſis integerrimis ſubtus tomentoſis, altero oblique oblongo-lanceolato, altero minimo cordato acuminato, pedunculis abbreviatis, involucro 2phyllo. *Sumatra.*

aurea Jack. 14. C. elata, folio utroque perfecto ſubrotundo ovato acuminato ſerrato ſericeo, capitulis denſis ſubſeſſilibus. *Sumatra.*

Ad Gratiolam.

miſſuriana Beck. 29. Gr. caule tereti ſimplici, foliis lineari-lanceolatis apice dentatis, pedunculis axillaribus 1floris folia ſuperantibus, bracteis calyce longioribus. *Ad fl. Miſſuri.*

pag. 41.

Ad Bonnayam Link.

pumila * 15. B. erectiuscula, foliis inaequalibus obtuſiusculis ſerratis ſubtus rubris, pedunculis 2floris folia aequantibus 2bracteatis. *Nepal.* (Chirita pumila Don.)

bifolia * 16. B. caule erecto gracili pubeſcente 2phyllo, folio altero minimo petiolato, altero maximo cordato ſeſſili, pedunculo terminali 1floro. *Nepal.* (Didymocarpus Wallich., Chirita Don.)

Ad B. *grandifloram* * (Chirita urticaefolia Don.)

pag. 43.

Ad Wulffeniam Sm.

† *obliqua* Don. 2. W. caulescens pubescens, foliis petiolatis semicordatis ovatis acutis integerrimis, floribus remotis, labio corollae superiori duplo breviori, fauce nuda. *Nepal.*

pag. 50.

n. 24. Ad *Urceolariam capensem* * (Linaria aphylla * Syst. veg. 2. 797.)

pag. 51.

Post n. 47. U. *conservaefolia* Jackf. Don. 65. U. foliis multifido-capillaceis, vesiculis 0, scapo paucifloro, calcari brevissimo conico, labio super. indiviso inferius 2lobum superante. *Nepal.*

pag. 53.

Ad Stachytarphetam Vahl.

Post n. 7. *quadrangula* Mart. 16. St. fruticosa, foliis ovatis acutis crenato-serratis subtus scabris, spicis laxis, bracteis subulatis calyce brevioribus, caule tetraquetro. *Brasil.*

trispicata Mart. 17. St. fruticosa, ramis compressis, foliis oblongis utrinque attenuatis crenato-serratis glabris subtus venoso-reticulatis scabris, spicis ternis, bracteis calyce brevioribus. *Brasil.*

elatior Schrad. 18. St. herbacea, foliis lineari-lanceolatis remote serratis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, bracteis acuminatis calycem superantibus. *Brasil.*

Ad St. *strigosam* Vahl. (St. hispida Mart.)

pag. 54.

Ad *Cunilam Buchanani* * n. 6. (C. nepalensis Don.)

pag. 55.

Ad Monardam.

Russeliana Nutt. 15. M. caule laevi, foliis subsessilibus lanceolatis serratis glabris, floribus capitatis, calycibus pubescentibus, tubo corollae longissimo, labio inf. undulato. *Ditio Arcansae Amer. bor.*

Bradburiana Beck. 16. M. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis subsessilibus dentatis pilosis, involucro colorato, calycis hirsuti dentibus divaricatis. *Ad fl. Missuri.*

scabra Beck. 17. M. caule glabriusculo, foliis ovato-lanceolatis serratis punctato-scabris, calycis hirsuti dentibus erectis. *Ad fl. Missuri.*

pag.

pag. 66.

Ad Salviam.

Poſt n. 143. *rubra* * 188. S. caule elato ramoſo hiſpido, foliis omnibus amplexicaulibus oblongis bullato-rugoſis dentatis ſubtus villoſis, verticillis 6floris, calycibus pubeſcentibus, galea glanduloſa ſtamina ſuperante. *Patria?* Hort. hal.

pag. 67.

Ad n. 160. S. *ſylveſtris* et in *Sibiria* obvia. (S. deſertorum Schangin)

pag. 68.

Poſt n. 170. *Simſiana* Schult. 189. S. caule herbaceo villoſo, foliis cordatis acutis repando-crenatis rugoſis, bracteis cordatis longe mucronatis coloratis, calycibus ſimpliciter dentatis, ſtaminibus galeam anguſtam aequantibus. *Ruſſia.* Bot. reg. 1003.

pag. 73.

Ad Veronicam.

Poſt n. 40. *himalenſis* Don. 91. V. caule erecto piloſo, foliis ſeſſilibus oblongis inciſo-crenatis utrinque hirſutis, racemis longe pedunculatis, bracteis lanceolatis pedicellos ſuperantibus. *Emodi montes.*

Poſt n. 45. *deltoidea* * 92. V. erecta glaberrima, foliis deltoideo-ovatis acutis baſi cuneatis inaequaliter dentatis, racemis laxis, bracteis foliaceis obtuſiusculis. *Nov. Holl.* Sieber n. 483.

Poſt n. 48. *punctata* Don. 93. V. caule repente glabro, foliis inferioribus petiolatis ovalibus, ſuperioribus amplexicaulibus lanceolatis acutis crenulatis, racemis tenuifloris, bracteis laciniisque calycis acutis. *Ad ſcaturigines Nepal.*

pag. 77.

Ante Oligarrhenam:

AÏDELUS *.

micranthus * *Nepal.* Herba procumbens ramoſa glabra, foliis oppoſitis oblongis ſubſpathulatis dentatis, floribus axillaribus ſolitariis minutis breviſſime pedunculatis albidis. Hort. hal. 1825.

HEMIANTHUS Nutt.

micranthemoides Nutt. *Jamaica. Amer. bor.* Herba repens glabra, foliis ſubrotundo-ellipticis integerrimis ſtriatis, floribus axillaribus breviter petiolatis albidis. (Herpeſtes micrantha Purſh. Syſt. veg. 2. p. 801., Gratiola repens Sw ?)

ONCOMA *.

pulchellum † *Nov. Caled.* Frutex orgyalis, ramis verrucosis, foliis oblongis obtusis glabris, floribus lateralibus corymbosis. (Oxera pulchella Labill. nov. Caled. t. 28.)

pag. 78.

Ad Jussiciam.

Post n. 8. *gonystachya* Mart. 127. J. spica terminali quadrifariam imbricata, calyce 5fido subulato, labio cor. superiore 2fido, bracteis minutis subulatis, foliis oblongo-lanceolatis crenatis glaberrimis. *Brasil.*

humuliflora Mart. 128. J. spicis terminalibus geminis imbricatis villosis, bracteis subrotundis aristatis, foliis ovatis utrinque attenuatis ciliatis. *Brasil.*

Post n. 15. *calycotricha* Link. 129. J. panicula terminali compacta, calycis 5partiti laciniis lineari-setaceis flexuosis corollam subaequantibus, labio cor. infer. 3fido recurvato, foliis subcordato-oblongis acutis repandis undulatis glabris. *Brasil.*

pag. 79.

Post n. 23. *simplex* Don. 130. J. caule simplici foliisque ovatis obtusis venosis pilosis, spica terminali densa abbreviata, calyce 4partito. *Nepal.*

Post n. 33. *spathulata* Mart. 131. J. spicis axillaribus oppositis bifidis secundis, bracteis spathulatis, foliis oblongis utrinque attenuatis pubescentibus. *Brasil.*

oblongata Link. 132. J. caule fruticoso ramoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis, racemulis axillaribus folio brevioribus paucifloris, involucro 3phyllo, calycibus 5partitis. *Brasil.*

pag. 80.

Post n. 41. *racemulosa* Wikstr. 133. J. racemulis axillaribus bracteatis, calycibus corollisque 4fidis, foliis subcordato-ovatis obtusis pubescentibus, caule fruticoso angulato. *Inf. Carib.*

pag. 81.

Post n. 61. *genuflexa* Mart. 134. J. spicis terminalibus pedunculatis, bracteis calycisque 5partiti laciniis linearibus ciliatis, labio cor. superiore integro, foliis ovatis cauleque repente hirsutis. *Brasil.*

pag. 82.

Post n. 79. *geniculata* Sims. 135. J. panicula terminali laxa nutante, bracteis subulatis, labio cor. super. integerrimo, foliis ovato-lanceolatis glabris. *Inf. Carib.* Bot. mag. 2487.

pag. 84.

Poſt n. 108. *cuneifolia* Mart. 136. J. ſpicis axillaribus compoſitis, bracteis orbiculatis mucronatis ciliatis, foliis obovatis crenatis glabris. *Braſil.*

Poſt n. 115. *antirrhina* Mart. 137. J. ſpicis axillaribus cymoſis folio brevioribus, floribus ſubſecundis baſi gibbis, foliis oblongis acuminatis integerrimis glabris. *Braſil.*

pag. 85.

Ad Diclipteram Juſſ.

Poſt n. 2. *recurvata* * 26. D. ſpicis axillaribus terminalibusque dichotomis recurvatis, bracteis ſubulatis calycibusque villoſis, corolla pubeſcente, foliis breviter petiolatis ovatis hirſutis. *Braſil.* (D. braſilienſis Mart.)

pag. 87.

Poſt n. 25. *ſpecioſa* Mart. 27. D. pedunculis axillaribus 1floris, bracteis exterioribus ovatis venoſis, foliis ovato-oblongis ſubcrenatis ſubtus ſcabris, caule fruticoſo. *Braſil.*

pag. 89.

Ad Eranthemum.

crenulatum Wallich. 17. E. ſuffruticoſum erectum glaberrimum, foliis ovato-oblongis acuminatis obſolete crenatis, ſpicis verticillatis ebracteatis. *Ind. orient.* Bot. reg. 879.

modeſtum Mart. 18. E. racemis axillaribus terminalibusque, floribus verticillatis, bracteis ſetaceis, foliis ovato-oblongis ſeſſilibus ſupra hirſutis. *Braſil.*

detruncatum Mart. 19. E. ſpicis terminalibus trichotomis, bracteis ſubulatis ferrulato-ciliatis, foliis ovato-oblongis in petiolum attenuatis pubeſcentibus, pulvillis (verrucisve) infra folium truncatis. *Braſil.*

verbenaccum Mart. 20. E. ſpica terminali ſimplici, floribus oppoſitis, bracteis ovatis cuſpidatis, foliis oblongis in petiolum decurrentibus glaberrimis. *Braſil.*

Ad *Campylanthum ſalſoloidem* Rott. (Teucrium filiforme Poir. enc. ſuppl. 2. p. 769.)

pag. 90.

Ad Acaenam.

Poſt n. 4. *ſarmentoſa* Carmich. 16. A. foliolis oblongis argute inciſo-ſerratis ſupra glabris venoſis ſubtus ſericeis, ſtipulis indiviſis, caule repente. *Inſ. Acunnae.* (Anciſtrum Thuars.)

Poſt n. 10. *agrimonioides* Kunth. 17. A. foliolis oblongis utrinque attenuatis groſſe ſerratis glabris, ſtipulis integerrimis, ſpicis axillaribus longiſſime pedunculatis, floribus inferioribus remotis bracteatis. *Mexico.*

pag. 104.

Ad Salicem.

Poſt n. 79. *roſtrata* Richardſ. 116. S. foliis oblongis acutis integerrimis pubeſcentibus ſubtus glaucis, germinibus longe pedicellatis ovato-ſubulatis tomentoſis, ſtigmate feſſili 4fido. *Amer. arctic.*

pag. 105.

Poſt n. 88. *arctica* R. Br. 117. S. ramis decumbentibus glabriusculis, foliis obovatis obtuſis ſubtus villoſiusculis, ſquamis amenti obovato-orbiculatis, germinibus ſubſeſſilibus tomentoſis, ſtigmate 4fido ſtylum aequante. *Inſ. Melville.*

Poſt n. 91. *diſperma* Roxb. 118. S. foliis ellipticis mucronatis integerrimis utrinque ramulisque ſericeo-villoſis, ſquamis amenti ♂ 8andris ovalibus obtuſis, germinibus ventricoſis ſericeis ſtylo coronatis. *Ind. orient.*

pag. 106.

Poſt n. 97. *deſertorum* Richardſ. 119. S. foliis ovalibus integerrimis venoſis ſubtus glaucis, germinibus ſeſſilibus tomentoſis, ſtigmate ſeſſili 2fido. *Amer. arctic.*

pag. 109.

Ad Piper.

Poſt n. 38. *juliflorum* Nees. 230. P. foliis oblongis obtuſis baſi inaequalibus eglandulosis glabris, ſpicis oppoſitifoliis denſis cernuis brevibus ſubechinatis. *Braſil.*

pag. 112.

Poſt n. 78. 79. *Suipigua* Hamilt. 231. P. foliis ovatis 5nerviis glabris, ſpicis filiformibus ſolitariis folio brevioribus, caule volubili. *Nepal.*

Mulleſua Hamilt. 232. P. foliis oblongis utrinque attenuatis 3nerviis glabris, capitulis globoſis ſolitariis pedunculatis petiolo longioribus. *Nepal.*

Guigual Hamilt. 233. P. foliis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, capitulis globoſis ſolitariis petiolos aequantibus. *Nepal.*

pag. 118.

Poſt n. 174. *Guildingianum* * 234. P. pubeſcens, caule repente ramoſiſſimo, foliis petiolatis orbiculato-cordatis obtuſis 3nerviis, ſpicis pedunculatis oppoſitifoliis erectis. *Inſ. Carib.* (Peperomia reniformis Hook, exot. fl. t. 164.)

pag. 120.

Poſt n. 205. *rubellum* Haw. 235. P. pubeſcens, caule ramoſiſſimo, foliis ſubquaternis ellipticis ſubtus convexis ru-

bris 3nerviis venoſo-reticulatis, ſpicis axillaribus terminalibusque ſubſolitariis. *Ind. occid.*

pag. 121.

Ad n. 221. P. *obverſum* Vahl. (Peperomia ovalifolia Hook. exot. fl. t. 165.)

pag. 122.

Ad Cladium.

Ad n. 3. Cl. *ſchoenoides* R. Br. (Cl. teretifolium Nees in Sieber agroſt. n. 6.)

Poſt n. 4. *dubium* Nees. 15. Cl. panicula racemoſa, ſquamis late ovatis acuminatis, bracteis baſi ciliatis, culmo tereti 1nodi baſi foliato, foliis compreſſis anguſtiſſimis glabris culmum ſubaequantibus. *Nov. Holl.* Sieber agroſt. n. 5.

pag. 123.

Ad Cl. *decompoſitum* R. Br. (Cl. Filum Nees in Sieber agroſt. n. 11.)

pag. 124.

Ad Laciſtema.

myricoides Sw. 1. L. foliis lanceolatis integerrimis ſubeveniis reſinoſo-punctatis, amentis ſolitariis, ſtigmatibus 2 ſeſſilibus. *Jamaica.*

oblongum * 2. L. foliis oblongis integerrimis venoſis, amentis ſubſolitariis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 2, 3. *Braſil.*

pubeſcens Mart. 3. L. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubintegerrimis ſubtus villoſis, amentis denſe aggregatis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 2, 3. *Braſil.* (Mart. nov. gen. t. 94.)

Berterianum Mart. 4. L. foliis oblongis obtuſiusculis baſi attenuatis reſinoſo-punctatis ſerratis venoſis, ſtylis 2 filiformibus. *Cuba. Hiſpaniola.* (L. alterum *.)

ſerrulatum Mart. 5. L. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerrulatis utrinque glaberrimis, amentis aggregatis, ſtylo ſimplici, ſtigmatibus 3. *Braſil.* (Mart. nov. gen. t. 95.)

CLASSIS III.

pag. 125.

n. 143. *Sonerila* Roxb. Cor. 1petala rotata 3partita. *Ericeis affinis.*

pag. 127.

Poſt n. 180. *Gilliesiâ* Lindl. Perianthium duplex: exter. e 5 bracteis ſepaloideis patentibus compoſitum, internum carnoſum labelliforme. Stamina 3 perfecta baſi in urceolum connata. Stam. 3 ſterilia dentiformia poſtica. Stigma capitatum 3angulare (interdum abortiens 3fidum). Capſ. 3locularis 3valvis, valvis medio ſeptiferis. *Familia?*

pag. 128.

Poſt n. 187. *Pſeudanthus* Sieb. Flores monoeci: ♂ glomerati terminales. Cal. 6partitus, laciniis 2 concretis. Antherae ſubgloboſae ſeſſiles in fundo calycis. Flores ♀ axillares ſolitarii. Cal. foliaceus 6fidus perſiſtens. Nux 6coſtata 1ſperma. *Santalcae?*

pag. 131.

Poſt n. 246. *Talaſium* *. Flores ſpicati. Cal. bracteatus 2valvis lanatus. Cor. glaberrima ſubcartilaginea perſiſtens mutica.

pag. 132.

Centrophorum Trin. n. 258. deleatur. Eſt enim Andropogon acicularis Retz.

Caryochloa *. Flores paniculati. Cal. 2valvis ariſtatus. Cor. 2valvis cum ſemine concreſcens. Caryopſis grandis dura tuberculoſa, ariſta laterali torta elongata.

pag. 133.

Poſt n. 269. *Pleuropogon* R. Br. Flores racemoſi. Cal. 1florus muticus, valvis inaequalibus. Cor. valva inf. obtuſa mutica, ſuper. nervo utroque lateraliter biſeto. Caryopſis libera.

Poſt n. 280. *Pleuraphis* Torr. Flores ſpicati. Flosculi terni baſi involucro villoſo, laterales ♂. Cal. centralis 1florus 2valvis 5ſetus. Cor. valva inferior 1ſeta. Calyces laterales 2flori, valva inf. dorſo ſetigera.

pag. 141.

Ad *Valerianam ſaxatilem* L. n. 27. (V. trinervis Viv. flor. corſic.)

pag. 142.

Poſt n. 50. *clata* Don. 69. V. caule ramoſo tereti laevi, foliolis lanceolatis integerrimis pubeſcentibus, floribus corymboſo-paniculatis, fructibus ſulcatis villoſis. *Nepal.*

pag. 143.

Ad Fediam Mönch.

Poſt n. 3. *truncata* Reichenb. 23. F. fructu antice 2coſtato globoſo, appendicula apicis oblique truncata elongata integerrima. *Creta.*

microcarpa Reichenb. 24. F. fructu antice 2coſtato ovato-globoſo, appendicula apicis minima ovata integerrima. *Ager monspel.* (Valerianella Loiſ.)

F. *carinata* R. et Sch. (non Loiſ.) habitat et in *Thuringia.* (Valerianella Loiſ.)

pag. 144.

Poſt n. 12. *rotata* Reichenb. 25. F. fructu pubeſcente, dentibus ſenis late ovatis patentibus uncinulatis. *Patria?*

F. *diſcoidea* Vahl. dentes fructus etiam uncinulatos habet: habitat in *Luſitania.* (Valeriana diſcoidea Brot.)

F. *uncinata* M. B. habet dentes ſubulatos.

Ad F. *minutam* Vahl. dele ſyn. Loiſeleurii.

F. *eriocarpa* Desv. occurrit et in *Germania Italiaque.*

F. *pumila* Vahl. habet dentes fructus ternos obtuſos patentes.

pag. 145.

Ad Sonerilam Roxb.

ſquarroſa Roxb. 4. S. foliis obovatis integerrimis utrinque cauleque hiſpidulis, pedunculis terminalibus ſolitariis, floribus umbellatis 4fidis. *Nepal.*

Ad Burmanniam.

Ante n. 1. *uniflora* Rottl. 10. B. caule filiformi 1floro, calyce 3carinato, capſula 3alata, alis oblongis, foliis lanceolato-lincaribus acutis. *Ind. or.*

Poſt n. 4. *coeleſtis* Don. 11. B. caule filiformi ſub-3floro, alis capſulae oblongis apice rotundatis, foliis radicalibus lanceolatis cuſpidatis breviſſimis. *Nepal.*

B. *diſticha* L. habitat et in *Nepalia* et in *nova Hollandia.* (B. diſtachya R. Br.)

pag. 146.

Croci lutei Lam. varietas videtur Cr. *lagenaeflorus* Salisb.

pag. 151.

Ad *Gladiolum gracilem* Jacqu. (Glad. debilis Bot. mag. 2585.)

pag. 153.

lin. 3. dele ſyn. Gl. *campanulati* Andr.

pag. 158.

Ad Haemodorum Sm.

brafilienſe * 6. H. racemis paniculatis, pedicellis aggregatis nutantibus, ſtaminibus verſus apicem laciniarum inſertis. *Braſil.* (Hagenbachia brafilienſis Nees.)

pag. 160.

Ad Iridem.

I. *ruthenica* Ker. ſimilis quidem I. *humili* M. B., differt tamen ſtylis inciſo-ſerratis.

Poſt n. 21. *longiſpatha* Fiſch. 55. I. foliis lineari-lanceolatis ſubfalcatis, ſcapo teretiusculo tortuoſo ſub-3floro, ſpatha longiſſime attenuata, germinibus angulatis. *Sibir.?*

pag. 161.

Ad n. 29. *Iris heterophylla* hort. pariſ. proxima quidem I. *Güldenſtädtianae* Lepech., differt tamen laciniis internis corollae erectis emarginatis ſtyli laminas ſuperantibus germinibusque 6angularibus (non hexagonis).

pag. 162.

Poſt n. 50. *nepalenſis* Wallich. 56. I. foliis enſiformi-falcatis, ſcapo 2floro, tubo corollae elongato, germinibus 3gonis. *Nepal.* Commutari poteſt cum I. *biflora*, ſed haec ſcapum habet foliis altiorem, germina teretiuscula.

pag. 164.

Ad Moraceam.

Herberti Lindl. 27. M. foliis linearibus plicatis ſcapo ramoſo multifloro brevioribus, ſpathis inflatis flore multo brevioribus, laciniis cor. exterioribus tortis apice caudatis, interioribus exiguis abrupte incurvo-revolutis purpureo-penicillatis. *Braſil. Chili.* (Tigridia Herbertiana Herb. in bot. mag. 2599.)

† *gladioloides* Kunth. 28. M. foliis linearibus ſtriatis caule tereti apice ramoſo brevioribus, ramis ſub-3floris. *Peru.*

† *acorifolia* Kunth. 29. M. foliis lineari-enſiformibus ſtriatis ſcapo compreſſo apice ramoſo brevioribus, ramis geminis ſub-3floris. *Caracas.*

pag. 170.

Poſt *Xiphidium* Löfl.:

GILLIESIA Lindl.

graminea Lindl. *Chili.* Herba viridis e bulbo, foliis radicalibus gramineis, ſcapo tereti umbellifero. Bot. reg. 992.

pag. 171.

Ad Udoram Nutt.

granatenſis * 2. U. foliis verticillatis linearibus integerrimis ciliatis. *Nov. Granat.* (Elodea granatenſis Humb.)

orinocenſis * 3. U. foliis verticillatis ſubulatis recurvatis. *Ad Orinocum.* (Elodea orinocenſis Rich.)

Quam Roſtcovius (fl. ſedin. p. 370.) in lacu prope Sedinum invenit, Serpicula verticillata ipſi dicta, longe aliena eſt planta, verticillis remotis, foliis linearibus acuminatis ſerrulatis. Cum nec flores nec fructus viderim, conjecturae locus eſt, *Caulinine* ſpeciem vel novam eſſe, vel adeo C. *flexilem* W.

pag. 173.

Ad Commelinam.

Poſt n. 29. *deficiens* Herb. 66. C. foliis oblongo-lanceolatis acutis baſi ciliatis, vaginis ſtriatis, involucro cordato cucullato, corolla 2petala, anthera tertia maxima. *Braſil.* Bot. mag. 2644.

Poſt n. 41. *longifolia* * 67. C. foliis lineari-lanceolatis glabris ſtriatis baſi ciliatis, panicula terminali nuda. *Ora Afric. orient.* (Aneilema Hook. exot. fl. t. 204.)

hiſpida Hamilt. 68. C. caule radicante aſcendente, foliis lanceolatis acuminatis aſperis, ora vaginarum ciliata, racemis paniculatis hirſutiſſimis. *Nepal.* (Aneilema Don.)

radicans * 69. C. caule radicante, foliis linearibus, vaginis villoſis, pedunculis 5floris. *Nepal.* (Aneilema Don.)

pag. 175.

Ad Olacem.

O. *obtuſa* Blum. videtur var. O. imbricatae Roxb.

Poſt Olacem:

PSEUDANTHUS Sieb.

pimeleoides Sieb. *Nov. Holl.* Fruticulus foliis imbricatis lanceolato-linearibus mucronatis glabris, floribus ♂ albis.

pag. 176.

Ad Comocladiam.

propinqua Kunth. 5. C. foliolis oblongo-lanceolatis acutis ſubintegerrimis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, paniculis ſimplicibus. *Cuba.*

molliſſima Kunth. 6. C. foliolis parvis ovato-oblongis acutis dentatis ſupra ſubtomentoſis ſubtus ſericeis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 7. t. 607.

pag. 181.

Ad Willichiam Mut.

callitrichoides * 2. W. erectiuscula glabra, foliis oppositis ellipticis obtusis integerrimis nervosis, pedunculis 1floris, corolla sub-3loba. *In cataractis Orinoc.* (Hydranthelium Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 646.)

pag. 185.

Ad Restionem.

Ad R. *tropicum* R. Br. (R. lateriflorus Nees in Sieber agrost. n. 42.)

pag. 188.

Ad Lyginiam R. Br.

†*montevidensis* * 3. L. floribus androgynis, vaginis bracteisque imberbibus, fasciculis multifloris, fructibus longe pedicellatis. *Monte Video.* Sello.

pag. 193.

Ad *Lepidosperma filiforme* Labill. (L. tetragonum Nees in Sieber agrost. n. 49.)

pag. 195.

Ad Rhynchosporam Vahl.

Post n. 5. *pilulifera* Bertol. 39. Rh. spicis axillaribus compositis pedunculatis folio brevioribus, spiculis globulosis, caryopse glabra, culmo angulato foliolo, foliis linearibus. *Brasil.*

Post n. 12. *tenerrima* Nees. 40. Rh. spicis subaggregatis involucratis, squamis mucronato-aristatis glabris, caryopse rugosa sub-3dentata, culmo foliato foliisque setaceis laevibus. *Nov. Holl.* Sieber agrost. n. 116.

pag. 197.

Ad Caustin R. Br.

recurvata * 4. C. spicis solitariis terminalibus sub-3floris, squamis glabris acutis, ramis hinc canaliculatis, ramulis fasciculatis falcato-recurvis. *Nov. Holl.* (Restio uncinatus Nees in Sieber agrost. n. 35.)

C. *pentandra* R. Br., ramis canaliculatis strictis, ramulis triquetris, vaginis longe aristatis.

pag. 200.

Ad Fimbristylin Vahl.

Ad F. *elatam* R. Br. (F. marginata Labill. nov. Caledon. t. 16.)

Post n. 38. *striata* Labill. 62. F. umbella composita involucrum superante, spiculis ovatis, squamis mucronatis 3andris, caryopse cancellata, culmo tereti basi

foliato, foliis obtuſis ciliatis, vaginis pubeſcentibus. *Nov. Caledon. Nov. Holland.* (F. obtuſifolia Nees in Sieber agroſt. n. 117.)

pag. 203.

Ad Scirpum.

Poſt n. 9. *congeſtus* Hamilt. 159. Sc. ſpica elliptica, glumis obtuſiſſimis ſcarioſis, ſtigmatibus 3, culmis caeſpitoſis teretibus ſulcatis. *Nepal.* (Eleocharis Don.)

pag. 204.

Ad Sc. *Brownii* * (Eleocharis riparia Nees in Sieber agroſt. n. 20.)

pag. 205.

Ad Sc. *retroflexum* Poir. var. Eleocharis recurvata Nees in Sieber agroſt. n. 24. *Nov. Holl.*

pag. 206.

Poſt n. 55. *muticus* Don. 160. Sc. ſpiculis lateralibus ſeſſilibus glomeratis, ſquamis concavis mucronulatis, ſtigmatibus 3, culmo triquetro aphyllo apice obtuſo. *Nepal.*

pag. 207.

Poſt n. 68. *Wallichianus* * 161. Sc. culmo baſi 2phyllo vaginato foliisque ſetaceis ſtriatis, vaginis apice barbatis, ſpicis ternis oblongis, ſquamis mucronatis carina ſcabris. *Nepal.* (Iſolepis capillaris Don.)

pag. 208.

Poſt n. 82. *globoſus* * 162. Sc. capitulo globoſo denſe multifloro, ſpiculis glabris ſub-3floris, ſquamis obtuſis baſi lanatis, culmo tereti aphyllo. *Nov. Holl.* Sieber agroſt. n. 29.

Thuarſii * 163. Sc. capitulo globoſo multifloro, ſpiculis ovatis, ſquamis late ovatis nervoſis margine ſcarioſis apice calloſis, culmo hinc ſulcato. *Inſ. Acunnae.* (Sc. ſulcatus Thuars., Iſolepis Carmich.)

Sequitur ſectio:

** *Corymbis aut umbellis lateralibus.*

anceps Poir. 164. Sc. corymbis axillaribus paucifloris, ſpicis parvis ſeſſilibus 3-4floris, ſquamis ovatis acutis nitidis patulis, culmo ancipiti foliato, foliis enſiformibus culmum ſuperantibus. *Madagaſcar.*

iridifolius Poir. 165. Sc. corymbis axillaribus faſtigiatis, ſpicis conicis obtuſis, culmo compreſſo altiſſimo, foliis enſiformibus anguſtis. *Madagaſcar.*

latifolius Bertol. 166. Sc. corymbis compoſitis axillaribus, ſpicis ſolitariis ovatis acuminatis, ſquamis mucronatis, culmo angulato ſulcato, foliis enſiformibus ſtriatis. *Braſil.*

bromeliaefolius Rudg. 167. Sc. corymbo-ſupradecompoſito, ſpicis teretibus acuminatis, ſquamis obtuſis coloratis, culmo elato 3quetro, foliis lanceolatis carinatis. *Guiana.*

corymboſus Roth. n. 83.

pag. 210.

Poſt n. 103. *elongatus* Don. 168. Sc. umbella compoſita prolifera, ſpicis oblongis teretibus, ſquamis mucronatis glabris, involucro polyphyllo umbellam ter ſuperante, foliis carinatis ſcabris culmum ſuperantibus. *Nepal.*

Poſt n. 110. *Donianus* * 169. Sc. umbella compoſita prolifera, ſpicis ovatis paucifloris, ſquamis mucronulatis, involucro 5phyllo umbellam ſuperante, culmo 4gono inferne vaginato, foliis carinatis ſcabris. *Nepal.* (Sc. quadrangulus Don.)

pag. 212.

Sc. ſulcatus Elliott. nomen mutet in Sc. *Elliottii* *, cum Sc. ſulcatus Roth. n. 50. jam adſit.

pag. 213.

Poſt n. 141. *bicolor* * 170. Sc. ſpicis capitatis ovatis teretibus, ſquamis margine coloratis, involucro 2phyllo hinc erecto illinc deflexo, culmo angulato filiformi, foliis canaliculatis anguſtiſſimis. *Inf. Acunnae.* (Iſolepis Carmich.)

ſquarroſus * 171. Sc. capitulo globoſo, ſpiculis ovatis, ſquamis margine concoloribus, involucro aphyllo, folio altero deflexo, culmo angulato filiformi baſi foliato, foliis canaliculatis anguſtiſſimis. *Inf. Acunnae.* (Iſolepis Carmich.)

n. 150. legatur *Humboldtii* *.

pag. 214.

Ad Sc. *denſum* Wall. (Iſolepis tenuiſſima Don.)

pag. 216.

Ad Cyperum.

Ad C. *articulatum* L. adde patriam: *nov. Holl.*

Poſt n. 22. *ſetifolius* Don. 238. C. umbella 4-6radiata, involucro ſub-5phyllo umbellam multo ſuperante, ſpiculis ſquarroſis, ſquamis obtuſis infra apicem recurvo-mucronatis. *Nepal.*

pag. 221.

Poſt n. 95. *Wallichianus* * 239. C. ſpicis ſubquinis linearibus, ſquamis ovalibus obtuſis ſtriatis, involucro ſub-5phyllo umbellam excedente foliisque linearibus carinatis aſperis. *Nepal.* (C. pulcher Don.)

trifulcus Don. 240. C. ſpicis ſubquinis ovali-oblongis obtuſis, ſquamis appreſſis repando-criſpatis, foliis linearibus ſcabris culmo trifulco brevioribus. *Nepal.*

nervoſus Bertol. 241. C. ſpicis linearibus remotiusculis erecto-patulis, ſquamis obovatis obtuſis multinerviis, involucro pentaphyllo, radice tuberifera. *Braſil.* Opuſc. ſcientif. 3. p. 407.

pag. 222.

Poſt n. 103. *caricinus* Don. 242. C. ſpicis racemoſis tenuifloris linearibus remote alternis, bracteis lineari-ſetaceis ſcabris ſpicas ſuperantibus, ſquamis mucronatis, foliis culmo 3quetro longioribus. *Nepal.*

pag. 225.

Ad C. *piloſum* Vahl. (C. paniculatus Don.)

pag. 227.

Poſt n. 171. *Sieberianus* * 243. C. ſpicis ovato-oblongis compreſſis ſub-20floris fulvis, ſquamis obtuſiusculis appreſſis, involucro ſub-3phyllo longiſſimo, culmo 3quetro ſcaberrimo folia linearia ſuperante. *Nov. Holland.* (C. microcephalus Nees in Sieber agroſt. n. 103.)

pag. 233.

Mariſcus parviflorus Nees in Sieb. agroſt. n. 101. ad exemplar, quod vidi, nondum adultus, varietas eſſe M. *laevigati* R. et Sch. videtur, qui igitur et in *nova Holl.* provenit.

Ad patriam M. *panicei* Vahl. adde *Ind. or.*

pag. 234.

Poſt n. 8. *rigidus* * 28. M. ſpicis numeroſis cylindricis ſubpedicellatis, ſpiculis oblongis 1floris erecto-patulis ſtriatis bracteas ſetaceas ſuperantibus, involucro polyphyllo longiſſimo, culmo 3quetro glabro. *Nov. Holl.* (Carex Sieberi Nees in Sieber. agroſt. n. 104.) M. paniceus proximis differt culmo gracili, involucro 4phyllo, ſpiculis 3floris.

pag. 238.

Ad Olyram.

braſilienſis * 8. O. floribus femineis pluribus inferioribus, ſpicis paniculatis, foliis ovato-oblongis obtuſis ſtriatis ſcabris. *Braſil.* (Raddia braſilienſis Bertolon. opuſc. ſcient. vol. 3. p. 410.)

pag. 239.

Poſt *Oropetium* Trin.:

THALASIUM *.

montevidenſe * *Monte Video.* Gramen pedale erectum baſi radicans, culmo ramoſo geniculato, vaginis retrorſum villoſis, foliis convoluto-filiformibus. Sello.

pag. 241.

Ad *Alopecurum anguſtifolium* Sibth. (A. Pallaſii Trin.)

pag. 243.

Ad Polypogona.

ſimplex * 16. P. racemo ſtricto, calycibus rigidis ſcabris ſub baſi barbatis, carolla breviter ariſtata, foliis convolutis culmoque glabris, ligula nulla. *Nov. Holl.* (Podoſaemon n. ſp. Nees in Sieb. agroſt. n. 94.)

pag. 245.

Ad Paſpalum.

Poſt n. 20. *lanatum* * 81. P. ſpicis binatis alternis, rhachi anguſta, flosculis 4ſerialibus ovatis acutis 1nerviis lanatis, foliis latiusculis undulatis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 250.

deleatur *Centrophorum chinenſe Trin.*

pag. 252.

Ante Oryzopſin:

CARYOCHLOA *.

montevidenſis * *Monte Video.* Gramen cubitale glabrum, foliis filiformibus, panicula viridi. Sello.

pag. 254.

Ad Deyeuxiam Clarion.

Poſt n. 8. *megapotamica* * 12. D. paniculae effuſae ramis racemoſis, calycibus corolla brevioribus longiſſime lanatis, ariſta elongata geniculata, rudimento articulato calycem ſuperante, foliis planis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 256.

Ad Stipam.

Poſt n. 31. *verticillata* Nees. 37. St. paniculae effuſae ramis inferioribus verticillato-faſciculatis, calycibus an-

guſtiſſimis acuminatis, ariſta longiſſima flexuoſa baſi pubeſcente, foliis planiusculis, ligula nulla. *Nov. Holl.* Sieb. agroſt. n. 64.

rudis * 38. St. panicula contracta pauciflora, calycibus elongatis linearibus acuminatis glabris nervoſis, ariſta valida torta longiſſima, foliis convoluto-filiformibus. *Nov. Holl.* (St. pubeſcens Nees in Sieb. agroſt. n. 66.)

pag. 258.

Ad Agroſtin.

Ad A. *aſperam* Mx. (A. cryptandra Torr.)

Poſt n. 18. *paradoxa* R. Br. 86. A. panicula coarctata lanceolata fuſco-purpurea, corollae ſubpedicellatae valvis nervoſis, foliis planis, ligula denticulata. *Inſ. Melville.* (Colpodium latifolium R. Br.)

airoides Torr. 87. A. panicula pyramidata glabra, calycibus corolla brevioribus, valva altera acuta, obtuſa altera, foliis linearibus glabris, vaginis ore barbatis. *Ad montes ſcopuloſos Amer. bor.*

pag. 263.

Poſt n. 76. *caeſpitoſa* Torr. 88. A. paniculae contractae pedicellis ſuperne incraſſatis, calycibus cuſpidatis corollam ſuperantibus glaberrimis coloratis, corollae ſcabrae ariſta elongata, culmo caeſpitoſo, foliis diſtichis rigidis convolutis. *Ad fl. Miſſuri.*

pag. 265.

Poſt *Cryſin:*

PLEUROPOGON R. Br.

Sabinii R. Br. *Inſ. Melvill.* Gramen glabrum, floribus racemoſo-ſpicatis.

Ad Spartinam ſtrictam Roth. adde patriam et *Amer. bor.*

pag. 266.

Ad Ariſtidam.

Poſt n. 6. *megapotamica* * 35. A. paniculae ſtrictae elongatae ramis ſubſecundis, calycibus longiſſimis ariſtatis glabris, ariſta corollae longiſſima patula ſcabra. *Rio grande.* Sello.

pag. 267.

Poſt n. 12. †*faſciculata* Torr. 36. A. paniculae elongatae ſpiciformis ramulis faſciculatis, calycibus corollam ſubaequantibus, ariſtis elongatis patulis, foliis lineari-filiformibus glabris, ligula barbata. *Canada.*

pag. 268.

Ad n. 24. *piloſa* Labill. 37. A. paniculae racemoſae ſtrictae ramis erectis, valvis calycinis inaequalibus ariſtatis corollam ſubaequantibus, ariſtis corollae in-

aequalibus, culmo inferne foliisque linearibus laxis pilosis. *Nov. Caledon.*

pag. 269.

Ad Lycurum Humb.

muticus * 3. L. culmo erecto, foliis convolutis elongatis, superioribus ciliatis, flosculis lanatis muticis. *Monte Video.* Sello.

pag. 270.

Post *Aegopogona:*

PLEURAPHIS Torr.

Jamesii Torr. *Canada.* Gramen gracile glabrum, radice repente, foliis angustissimis glaucis scabris, ligula fimbriata. Ann. of the Lyc. of New-York, 1. p. 148. t. 10. (Hymenothecium 5setum Lag.?)

pag. 275.

Ad Hierochloën Gmel.

pauciflora R. Br. 8. H. racemo simplici, calycibus glaberrimis, flosculo ♂ superiore brevissime setigero, foliis culmi brevissimis, radicalibus involutis. *Inf. Melville.*

pag. 276.

Ad Airam.

Post n. 16. *Sabulonum* Labill. 50. A. paniculae strictae ramis multifloris apice pubescentibus, calycibus corollisque mucronatis glabris subaequalibus, foliis vaginantibus convolutis, culmo basi radicante. *Nov. Caledon.*

pag. 277.

Post n. 24. *arctica* * 51. A. panicula coarctata lanceolata, ramis laevibus, arista stricta valvam subaequante, foliis involutis, culmis abbreviatis. *Inf. Melville.* (Deschampsia brevifolia R. Br.)

Ad A. *paludosam* Roth. (A. uliginosa Bönningh. Reichenb. ic. t. 150.)

A. capillaris Host. eadem cum A. caryophyllea L. . . Bernhardi in Flora 1825. p. 545.

pag. 279.

Ad Melicam.

Post n. 10. *Fischeri* * 22. M. panicula coarctata spicaeformi, calycibus laevibus sub-3floris flosculos subaequantibus, flosculis basi subsericeis, foliis linearibus, ligula truncata. *Inf. Melville.* (Dupontia Fischeri R. Br.)

pag.

pag. 282.

Ad Saccharum.

Poſt n. 20. *floridulum* Labill. 29. S. paniculae ramis racemoſo-ſpicatis faſtigiatis, flosculis geminis ariſtatis inaequaliter pedunculatis, culmo elato, foliis latiusculis ſerrulatis. *Nov. Caledon.*

pag. 283.

Ad Andropogona.

Poſt n. 6. *megapotamicus* * 67. A. ſpica terminali imbricata longiſſima, flosculis ſericeo-villoſis, ariſtis longiſſimis hirſutis ſecundis, foliis convolutis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 287.

Ad *Andropogona nutantem* proximus, ni idem, A. *glaucus* Torr. in Ann. of the Lyc. of N.-York, 1. p. 153.

Ad Andropogona acicularem Retz. patria *China. Inſ. ocean. pacif. Nov. Holl.* (Centrophorum chinenſe Trin. p. 250.)

pag. 290.

Ad Anatherum P. B.

Poſt n. 8. *megapotamicum* * 9. A. ſpicis ſolitariis, rhachi articulata piloſa, flosculis glabriusculis appreſſis, foliis longiſſimis glabris ſerrulatis, culmi nodis longe piloſis. *Rio grande.* Sello.

pag. 302.

Ad *Cenchrum auſtralem* R. Br. C. anomoplexis Labill. in *nov. Caledon.* var. foliis latioribus.

pag. 305.

Ad Setariam P. B.

Poſt n. 14. *vaginata* * 20. S. panicula ſpicata elongata vaginata, ſetis ſubſolitariis ſurſum aſperis flexuoſis, flosculis acutis glabris nervoſis, culmo foliisque laevibus. *Rio grande.* Sello.

piliſera * 21. S. paniculae laxae ramis ſubſpicatis, ſetis gracillimis piliformibus ſubbinis, flosculis alternis ſubſecundis ovatis acutis nervoſis rhachique pubeſcentibus, foliis lato-lanceolatis ciliatis, vaginis longe piloſis, culmo flaccido. *Inſ. Maſcaren. Nov. Holl.* (Urochloa panicoides P. B.)

pag. 308.

Ad Panicum.

P. gracile Nees in Sieber agroſt n. 72. pertinet ad P. diſtachyon n. 13.

pag. 316.

Ad Panicum.

Poſt n. 118. *loliaceum* Bertol. 203. P. paniculae racemoſae ramis ſtrictis, flosculis oblongis hirſutis nervoſis, foliis lanceolato-linearibus ſupra pubeſcentibus, culmo vaginisque hirtis. *Braſil.*

pag. 317.

Poſt n. 132. *megapotamicum* * 204. P. paniculae ramis patentibus, flosculis breviſſime pedicellatis glabris acutis nervoſis, corollis lucidis, culmo angulato foliisque convolutis glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 320.

Poſt n. 174. *polygonatum* Schrad. 205. P. paniculae erectae ramis ſtrictis, axillis piloſis, flosculis breviter pedicellatis lanceolatis acutis nervoſis glabris, vaginis piloſis, nodis culmi barbatis. *Nov. Holl.* Sieb. agroſt. n. 121.

condenſatum Bertol. 206. P. panicula racemoſa condenſata ſtrictiſſima, flosculis lanceolatis acuminatis nervoſis, foliis cordato-lanceolatis culmoque decumbente glaberrimis. *Braſil.*

pag. 327.

Elymus mollis R. Br. in Franklin. itin. p. 732. videtur idem ac E. *villoſus* Mühlenb. n. 7.

pag. 328.

Ad Pappophorum Schreb.

elongatum * 8. P. panicula cylindrica elongata lobata, calycibus glabris, ariſtis ſubvicenis, foliis convolutis longiſſimis. *Monte Video.* Sello.

pag. 329.

Poſt n. 7. *megapotamicum* * 9. P. racemo ſpicato paucifloro, pedunculis abbreviatis villoſis, calycibus ſubternis glabris nervoſis, ariſtis ſubduodenis longiſſimis patentibus, culmo ſimplici, foliis ciliatis. *Rio grande.* Sello.

Ad Seſsleriam Scop.

Poſt n. 10. *Pumilio* * 13. S. panicula coarctata abbreviata, calyce 3floro, flosculo infimo perfecto, reliquis neutris 1valvibus. *Afric. med.* (Triraphis Pumilio R. Brown ad Denham et Clapperton. iter, p. 245.)

pag. 332.

Ad Danthoniam Cand.

paradoxa R. Br. 13. D. panicula ſtricta, calycibus glabris 4floris, flosculis breviter villoſis, ariſta dorſali baſi dilatata torta calycibus breviore, culmo foliisque

filiformibus glabris. *Nov. Holl.* (Stipa, ſphalmate ſcribae forte, Nees in Sieber agroſt. n. 34.)

Ad Köleram Perſ.

macilenta Gaud. 9. K. panicula ſpicata cylindrica laxiuscula, flosculis glabris, calycibus 3floris cuſpidatis, ariſta breviſſima, culmo ſimplici foliisque anguſtiſſimis glabriusculis. *Gallia provinc.*

pag. 333.

Ad Avenam.

Poſt n. 10. *villoſa* Bertol. 54. A. panicula ſtricta, corollis baſi barbatis calycem aequantibus, valva corollae exter. 2feta, ariſta dorſali geniculata, culmo paniculaeque ramis villoſis, foliis anguſtiſſimis vaginisque glabris. *Italia med.*

pag. 335.

A. *Forskolei* Vahl. et *arundinaceam* Delil. eamdem habet ſpeciem R. Brown ad Denham. it. p. 244.

pag. 338.

Ad Poam.

Poſt n. 21. *Sieberiana* * 135. P. paniculae nutantis ramis flexuoſis ſcabris, ſpiculis coloratis, flosculis liberis remotiusculis 3nerviis acutiusculis carina ſcabris, foliis filiformibus angulatis, ligula nulla. *Nov. Holl.* (P. auſtralis Nees in Sieber. agroſt. n. 77.)

pag. 339.

Poſt n. 22. *arctica* R. Br. 136. P. panicula effuſa, ramis pauciforis capillaribus laevibus ſpiculisque coloratis ovatis 3-4floris, corollae valva inferiore ſubſericea baſi lanata, foliis linearibus, ligula ſubquadrata eroſa. *Grönland. Amer. arctic.*

Poſt n. 31. *anguſtata* R. Br. 137. P. panicula ſimplici coarctata lineari-lanceolata, ſpiculis oblongis coloratis glabris ſub-4floris, valvis corollae eroſis denticulatis 5nerviis, foliis anguſte linearibus, ligula ſubquadrata. *Amer. arctic.*

abbreviata R. Br. 138. P. panicula ſimpliciſſima abbreviata coarctata, ſpiculis coloratis 4-5floris, valvis calycis acutiſſimis ſubaequalibus flosculos baſi lanatos pubeſcentes aequantibus, foliis convoluto-ſetaceis. *Inſ. Melville.*

pag. 342.

Poſt n. 63. *megapotamica* * 139. P. paniculae ramoſiſſimae laxae ramulis capillaribus elongatis 1floris ſpiculisque linearibus glabris coloratis, flosculis acutis trinerviis, culmo elato, foliis convolutis. *Rio grande.* Sello.

pag. 349.

Ad *Ceratochloam unioloidem* Cand. forte Uniola ſtricta Torr. ann. of the Lyc. of N. York, 1. p. 155.

pag. 350.

Ad Eleuſinen Gärtn.

Poſt n. 5. *rigida* * 16. E. ſpicis digitatis ſubquaternis ſtellato-patentibus, rhachi glabra ſpiculisque 8floris muticis, culmo aſcendente, oris vaginarum piloſis. *Patria?* (Cynosurus rigidus Hort. berol.)

Ad n. 8. del. ſyn. Poa digitata R. Br.

digitata * 17. E. ſpicis digitatis, ſpiculis imbricatis ſub-7floris glabris muticis, culmo tereti, foliis vaginisque glabris. *Nov. Holl.* (Poa digitata R. Br.)

pag. 353.

Ad Feſtucam.

Hemipoa Delil. in lit. 63. F. paniculae erectae ramis alternis rigidis coloratis, ſpiculis ſubſeſſilibus 4-6floris glabris muticis, culmo ſtricto, foliis anguſtiſſimis glabris. *Ager monspel.*

pag. 354.

Ante n. 35. *capitata* Balb. 64. F. ſpica ſolitaria ovata compreſſa ſub-4flora glabra, calycibus acutiſſimis, floſculis ſubcoloratis muticis, culmo tenero ſimplici, foliis abbreviatis linearibus patulis glabra, ligula elongata vaginante. *Sardinia.*

pag. 358.

Ad Bromum.

Inter n. 18. et 19. *ſardous* * 46. Br. paniculae racemoſae erectae ramulis articulatis ſubincraſſatis, ſpiculis lanceolatis erectis ſub-10floris glaberrimis, floſculis diſtantibus, ariſtis rectis valvas ſubaequantibus, valva inter. corollae ſubariſtata, foliis anguſtis culmoque geniculato laevibus. *Ad litora Sardiniae.*

megapotamicus * 47. Br. panicula erecta racemoſa contracta, ſpiculis ovatis ſub-6floris hirſutis, calycibus floſculisque nervoſis, valva cor. exter. obtuſa ſcarioſa, ariſtis ſubflexuoſis valvas aequantibus, foliis pubeſcentibus, vaginis villoſis. *Rio grande.* Sello.

pag. 362.

Ad Lepyrodiam R. Br.

elongata * 5. L. culmo ſubramoſo gracili, vaginis reflexis ſublanatis, ſpiculis ♂ ſeſſilibus remotis, ♀ ſubpedunculatis, ſquamis mucronatis. *Nov. Holl.* (Calorophus elongata Labill., Reſtio lateriflorus R.

Br., Leptocarpus ſquarroſus Nees in Sieb. agroſt. n. 38.)

Ad *Holoſteum diandrum* Sw. lege ſtipulis *utrinque* 4, loco utriusque.

H. *ſucculentum* L. deleatur, rediturum vol. 2. p. 395. ſynonymon Arenariae peploidis.

pag. 363.

Ad Polycarpon.

apurenſe Kunth. 3. P. caule diffuſo ramoſo pubeſcente, foliis verticillatis (5–10) ſpathulatis ciliatis, ſtipulis ovatis acuminatis, floribus cymoſis. *Ad Orinocum.*

Montia fontana L. et in alpibus quitenſibus occurrit. Humb. nov. gen. 6. p. 79.

pag. 364.

Ad Königiam.

nepalenſis Don. 2. K. caule erecto retrorſum hiſpido, foliis ovatis acutis, floribus terminalibus glomeratis. *Emodi montes.*

CLASSIS IV.

pag. 366.

Poſt n. 385. *Pſyllocarpus* Mart. Cal. 8fidus, laciniis 2 longioribus. Cor. infundibuliformis 4fida, fauce barbata. Stam. incluſa. Stigma clavatum. Capſ. 2locularis 2valvis. Sem. peltata compreſſa chartacea.

pag. 369.

Poſt n. 456. *Phelline* Labill. Cal. 4dentatus perſiſtens. Cor. rotata 4partita. Stam. baſi corollae inſerta. Stigma 4dentatum. Capſ. ſuberoſa 4locularis, loculis 1ſpermis intus dehiſcentibus. *Styraceae.*

Poſt n. 461. *Philagonia* Blum. Flores dioeci. Cal. 4dentatus. Petala 4. Stamina petalis alterna. Antherae 2loculares dorſo affixae. Diſcus annularis obſoletus. Stigma peltatum grande. Capſ. 4locularis, loculis 2ſpermis. *Terebinthaceae.*

pag. 377.

Ad Dipſacum.

mitis Don. 7. D. caule angulato inermi ramoſo, foliis petiolatis 3lobis pinnatifidisque piloſis, paleis recepta-

culi rectis flosculos subaequantibus. *Emodi montes.* (D inermis β. Wallich.)

Ad D. *pilosum* pertinet D. inermis α. Wallich. D. strictus Don.

Ad Scabiosam Vaill.

Post n. 6. *reversa* Ledeb. 13. Sc. foliis lanceolatis indivisis pinnatifidisque amplexicaulibus supra nitidis, laciniis lanceolatis subintegerrimis, caule hirsuto, involucro ciliato, pappo setaceo. *Sibir.*

Hornemanni * 14. Sc. foliis pubescentibus, radicalibus lyratis, caulinis pinnatifidis amplexicaulibus, caule ramosissimo aspero, ramis patentibus, corollulis radiantibus. *Patria?* (Sc. pyrenaica Hornem. in lit.)

pag. 379.

Ad Succisam *leucanthum* * (Scabiosa mediterranea Viv. app. ad fl. cors.)

pag. 381.

Ad Asterocephalum Vaill.

Post n. 16. *diffusus* *. 48. A. foliis radicalibus lyratis acutiusculis serratis glabriusculis, caulinis pinnatifidis, laciniis linearibus integerrimis, corollulis radiantibus involucrum duplo superantibus, setis pappi testaceis. *Teneriffa.* (Scabiosa diffusa Reichenb. hort. t. 16.)

pag. 382.

In varietatibus A. *Columbariae* * dele Scabiosam setiferam Lam., adde Scab. unisetam Sav., Savianam Reichenb.

pag. 383.

Ad A. *gramuntium* * (Scabiosa mollis W. suppl.)

Ad A. *agrestem* * add. setis pappi brevissimis.

pag. 385.

Ad Patriniam Juss.

nudiuscula Fisch. 5. P. foliis omnibus 2pinnatifidis glabris, laciniis lanceolatis obtusiusculis, floribus corymboso-paniculatis. *Imaus.*

coronata Fisch. 5. P. foliis radicalibus oblongis integerrimis pinnatifidisque carnosis glabris, scapo stricto, corymbis compactis. *Dauuria.*

pag. 386.

Post *Declieuxiam* Humb.:

PSYLLOCARPUS Mart.

ericoides Mart. 1. Ps. simpliciusculus superne divisus, foliis verticillatis subulatis internodio brevioribus, floribus terminalibus aggregatis. *Brasil.*

asparagoides Mart. 2. Pf. ramoſus glaber, ramis gracilibus virgatis, foliis verticillatis filiformi-ſetaceis, floribus capitatis. *Braſil.*

laricinus * 3. Pf. ramoſiſſimus glaber, foliis faſciculato-verticillatis ſetaceis, floribus terminalibus ſubſpicatis. *Braſil.* (Pf. laricoides Mart.)

thymbroides Mart. 4. Pf. ramoſiſſimus pubeſcens, ramis ſquarroſis, foliis faſciculatis, floribus terminalibus ſubſpicatis. *Braſil.*

pag. 387.

Ad Galium.

Poſt n. 19. *atherodes* * 111. G. foliis lineari-filiformibus longe ariſtatis patentiſſimis glabris, pedunculis axillaribus 1floris 2phyllis folio brevioribus, petalis obtuſis 1nerviis. *Rio grande.* Sello.

pag. 388.

Ante n. 26. *corſicum* * 112. G. foliis ſubſenis ovato-oblongis acutis pubeſcentibus, caule debili villoſo, pedunculis divaricatis 3fidis paucifloris. *Corſica.*

Ad G. *aſperifolium* Wall. videtur G. *parviflorum* Don. proxime accedere.

pag. 390.

Poſt n. 66. *megapotamicum* * 113. G. foliis rigidis lanceolatis acutis ſpinuloſo-ciliatis ſubtus pallidis glabris, fructibus grandibus ſeſſilibus granulatis, caule ſimplici erecto. *Rio grande.* Sello.

pag. 391.

Poſt n. 78. *Hamiltonii* * 114. G. foliis oblongis acutis utrinque piloſiusculis, pedunculis terminalibus trichotomis laxiſloris, caule erecto ramoſo piloſo. *Nepal.* (G. latifolium Hamilt. Don.)

veſtitum Don. 115. G. foliis ovali-oblongis obtuſis utrinque canleque ſimplici hirſutiſſimis, pedunculis axillaribus trichotomis, floribus glomeratis, fructibus denſe hiſpido-tomentoſis. *Nepal.*

Ad G. *degans* Wall. (G. ciliatum Hamilt. Don.)

pag. 396.

In phraſi *Aſperulae galioidis* M. B. lege lacinulis corollae *uncinulatis* loco ungniculatis.

pag. 397.

Ad *Rubiam cordifolium* L. pertinere et *alatam* Wall. n. 6. et *Munjiſtam* Roxb. n. 20. Don.

Poſt n. 9. *noxia* Hilar. 23. R. caule decumbente ramoſo hirſutiusculo, foliis quaternis ellipticis mucronatis 3nerviis pellucido-punctatis hiſpidiusculis, pedunculis axillaribus 1floris, baccis albis. *Braſil.*

pag. 403.

Ad Spermacocen.

megopotamica * 62. Sp. caule ſuffruticoſo ramoſo hirto, foliis lanceolatis cuſpidatis utrinque ſtrigoſis, ſtipularum ciliis elongatis ſtrictis, capitulis denſifloris, calycibus ariſtatis corollam ſubaequantibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 406.

Ad Ernodeam Sw.

nepalenſis * 3. E. caule herbaceo tomentoſo, foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis nervoſis pubeſcentibus, ſtipulis 3partitis ſetaceis, cymis terminalibus trichotomis multifloris. *Nepal.* (Cuncea trifida Hamilt. Don.)

pag. 411.

Ad Hedyotin.

Ad H. *ulmifoliam* Roxb. pertinere H. *lineatam* Ej. n. 37. Hamilton. apud Don. fl. nepal. p. 134.

pag. 412.

Ad H. *ſtrictam* Wall. (H. fuſca Hamilt. Don.)

pag. 413.

Poſt n. 33. *ciliolata* Torr. 44. H. foliis ſpathulatis ſeſſilibus ciliatis, pedunculis trichotomis, caule ramoſo. *Ad cataractas Niagarae.*

pag. 414.

Poſt n. 39. *laxa* Don. 45. H. foliis ovatis acutis utrinque piloſiusculis, pedunculis axillaribus dichotomis, floribus ſubternis, caule ramoſo debili laevi. *Nepal.*

pag. 415.

Ad Manettiam Mutis.

Poſt n. 6. *cordifolia* Mart. 9. M. herbacea volubilis, foliis cordato-ovatis acutis glabriusculis, pedunculis axillaribus 1-3floris, calycibus 4fidis. *Braſil.*

M. *uniflora* Humb. habet calyces 8partitos.

pag. 415.

Ad *Catesbaeam ſpinoſam.* (C. latifolia Lindl. in bot. reg. 858.)

pag. 418.

Ad Gardneriam Wall.

glabra Wall. 2. G. foliis ovato-oblongis acuminatis pedunculis ſimplicibus 1floris. *Nepal.*

G. *ovata* Wall. habet folia oblonga utrinque attenuata.

pag. 420.

Ad Callicarpam.

Poſt n. 4. *rubella* Lindl. 22. C. foliis cordato-oblongis antrorſum dilatatis acuminatis crenato-dentatis utrinque ramisque villoſo-tomentoſis, cymis pedunculatis 2partitis multifloris. *China.* Bot. reg. 883.

C. *longifolia* Lam. melius habet folia lanceolata acuminata elongata, corymbos axillares abbreviatos. Cf. Hook. exot. fl. 133.

pag. 421.

Ad *Walleniam laurifoliam* Sw. var. anguſtifolia (W. anguſtifolia Mart. in nov. act. nat. cur. 11. p. 87.).

pag. 425.

Ad Exacum.

Poſt n. 9. *erubeſcens* * 15. E. caule ſimplici tereti, foliis lanceolatis acutis 3nerviis amplexicaulibus, floribus paniculatis, laciniis corollae rotundatis. *Braſil.* (Dejanira erubeſcens Schlechtend.)

palleſcens * 16. E. caule ſimplici teretiusculo, foliis late ovatis acutis obſcure 3nerviis coriaceis amplexicaulibus, floribus denſe congeſtis, laciniis corollae rotundatis. *Braſil.* (Dejanira palleſcens Schlechtend.)

nervoſum * 17. E. foliis ſeſſilibus oblongis acuminatis 5nerviis pellucido-marginatis, floribus denſe congeſtis, laciniis corollae oblongis. *Braſil.* (Dejanira nervoſa Schlechtend.) E. *tetragonum* Roxb. proximum differt praeter patriam, calycibus 4alatis.

pag. 426.

Ad Sebaeam R. Br.

Inter n. 2. et 3. *ſulfurea* Schlechtend. 9. S. caule ſubtetragono ramoſo, foliis ſeſſilibus late ovatis acutis, calyce anguſte alato, floribus 5fidis, ſtaminibus exſertis. *C. B. S.*

craſſulaefolia Schlechtend. 10. S. caule tetragono ramoſo, foliis amplexicaulibus cordato-ſubrotundis acutis ſubcoriaceis nervoſis, floribus corymboſis 5fidis, calycibus argute carinatis. *Afric. auſtr.*

capitata Schlechtend. 11. S. caule ſimplici folioſo, foliis confertis ovatis 3nerviis, panicula coarctata terminali, floribus 4fidis, ſtaminibus exſertis. *C. B. S.*

pag. 427.

Ad Houſtoniam.

Poſt n. 2. *minima* Beck. 9. H. caule erecto ſimplici ſcabriusculo, foliis ſpathulatis ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, laciniis calycis late ovatis acutis erectis. *Ad fl. Miſſuri.* H. *patens* Ell. proxima

differt caule ramoso, laciniis calycis linearibus. Cf. Silliman's journ. vol. 10. p. 262. Elliott. Carolin. austr. p. 191.

pag. 428.

Ad Labatiam Sw.

macrocarpa Mart. 3. L. arborea, foliis oblongo-lanceolatis glabriusculis, floribus pedunculatis aggregatis. *Brasil.* Mart. nov. gen. 2. t. 160. 161.

pag. 430.

Ad *Buddleam Neemda* Roxb. (B. subserrata Hamilt. Don.)

pag. 434.

Ad Plantaginem.

Post n. 12. *macrocarpa* Chamiss. 92. Pl. foliis lanceolatis integerrimis erectis glabriusculis, scapo subangulato, spica cylindrica densiflora, capsula maxima 2loculari 2sperma (non circumscissa). *Inf. Aleut.*

truncata Chamiss. 93. Pl. hirsutissimo-tomentosa, foliis lanceolatis basi attenuatis, spicis clavatis elongatis basi laxis, capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

Ad Pl. *lanceolatam* n. 15. pertinere Pl. *attenuatam* Wallich. n. 23. Don.

Ad Pl. *xorullensem* Humb. (Pl. mexicana Link., graminea W. herb.)

pag. 438.

Post n. 68. *tumida* Chamiss. 94. Pl. subcaulescens, foliis linearibus obtusiusculis integerrimis cinereo-sericeis, scapo laevi tereti, spica ovali, staminibus corolla brevioribus, capsula 2loculari 2sperma. *Chili.*

brasiliensis Sims. 95. Pl. subcaulescens, foliis lineari-lanceolatis integerrimis ciliatis nervosis, spica cylindrica elongata glabra, stylis longissimis. *Brasil.* Sello. Bot. mag. 2616.

pag. 440.

Post n. 83. *princeps* Chamiss. 96. Pl. fruticosa elata ramosa, foliis amplexicaulibus lineari-lanceolatis glaberrimis, spica elongata sparsiflora laxa, capsula 1loculari 2sperma. *Inf. Sandwich.*

coriacea Schlechtend. 97. Pl. suffruticosa, foliis lineari-lanceolatis coriaceis integerrimis glabriusculis, spicis crassis cylindricis elongatis, antheris grandibus longe exsertis, capsula 2sperma. *Rio grande.* Sello.

Post *Plantaginem:*

PHELLINE Labill.

comosa Labill. *Nov. Cal.* Frutex foliis fastigiatis subspathulato-oblongis dentatis glabris, floribus paniculatis, gemmis lanuginosis.

pag. 441.

Ad Bruceam Herit.

trifoliata * 4. Br. foliis ternatis oblongis obtuſis glabris, corymbis axillaribus dichotomis, floribus ♀. *Nov. Caledon.* (Evodia drupacea Labill. nov. Caled. t. 74.)

PHILAGONIA Blum.

procera Blum. *Java.* Arbor procera, foliis pinnatis lanceolatis integerrimis glabris, cymis terminalibus 3partitis.

pag. 443

Ad Ammanniam.

† *Floribus axillaribus ſolitariis.*

rubra Hamilt. 19. A. foliis oblongis obtuſis ſeſſilibus, ramulis floriferis axillaribus oppoſitis folia ſubaequantibus, floribus ſeſſilibus, caule ſimplici 4gono erecto. *Nepal.*

pag. 444.

Poſt n. 13. *arenaria* Kunth. 20. A. foliis cordato-linearibus ſemiamplexicaulibus, pedunculis ſub-3floris, floribus 4andris. *Caracas.*

pag. 447.

Ad Ciſſum.

Ad C. *adnatam* Roxb. (C. ariſtata Blum.)

Ad C. *rotundifoliam* Vahl. add., ramis ſcandentibus pruinoſis, geniculis inflatis. Patria: *Java.*

Ad C. *latifoliam* Lam. (C. compreſſa Blum.)

Poſt n. 12. *discolor* Blum. 67. C. foliis cordato-oblongis acuminatis ſetaceo-ferratis discoloribus ramulisque angulatis glabris, cymis oppoſitifoliis ſub-5fidis folio brevioribus. *Java.*

nodoſa Blum. 68. C. foliis ſubcordato-oblongis cuſpidatis ſetaceo-ferrulatis glabris, corymbis oppoſitifoliis dichotomis, pedicellis umbellatis, caule tereti herbaceo nodoſo. *Java.*

pag. 448.

Ad C. *cineream* Lam. (C. pubinervis Blum.)

pag. 449.

Poſt n. 36. *emarginella* Sw. 69. C. foliolis obovatis emarginatis remote crenatis glabris, ramis petiolisque 4gonis. *Inſ. Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.

Poſt n. 43. *papilloſa* Blum. 70. C. foliolis ovato-oblongis acuminatis groſſe argute ſerratis glabris coriaceis, corymbis axillaribus divaricatis, caule lignoſo papilloſo ramoſiſſimo. *Java.*

geniculata Blum. 71. C. foliolis oblongis acuminatis obtuſe denticulatis membranaceis ad coſtam utrinque pubeſcentibus, lateralibus ſemicordatis, corymbis dichotomis geniculatis, caule ſuffruticoſo teretiusculo. *Java.*

rhodocarpa Blum. 72. C. foliolis ovato-ellipticis acuminatis membranaceis glabris groſſe inaequaliter dentatis, lateralibus ſemicordatis, corymbis dichotomis petiolo brevioribus, caule ſub-4gono. *Java.*

hirtella Blum. 73. C. foliolis ovato-oblongis membranaceis inaequaliter ſerratis ſubtus petiolisque tomentoſis, corymbis dichotomis axillaribus. *Java.*

Ad C. *crenatam* Vahl. add. foliolis villoſiusculis.

Ad C. *carnoſam* Lam. (C. pergamacea Blum.)

pag. 450.

Poſt n. 54. *dichotoma* Blum. 74. C. foliis coriaceis glabris, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis glanduloſo-ſerratis, corymbis dichotomis folio brevioribus. *Java.*

thyrſiflora Blum. 75. C. foliolis ovato-oblongis acutis ſerrulatis ſubtus ramisque rubiginoſo-tomentoſis, thyrſis cirrifloris. *Java.*

quinquefolia Soland. 76. C. foliolis oblongis utrinque attenuatis ſerratis glabris, ramis teretibus nodoſis laevibus, paniculae oppoſitifoliae ramis divaricatis. *Braſil.* Bot. mag. 2443.

Ad C. *heterophyllam* Poir. (C. leucocarpa Blum.)

Ad C. *ſerrulatam* Roxb. (C. glabrata Blum.)

tuberculata Blum. 77. C. foliolis oblongis acuminatis ſerratis glabris coriaceis, corymbis petiolo brevioribus, caule compreſſo tuberculato. *Java.*

mutabilis Blum. 78. C. foliolis oblongis acuminatis, lateralibus obtuſiusculis remote ſerratis, ſerraturis ſcarioſis, cymis axillaribus, caule fruticoſo, baccis 3-4-ſpermis. *Java.*

ſcarioſa Blum. 79. C. foliolis ovalibus obtuſiusculis coriaceis apice groſſe ſerratis, ſerraturis apice ſcarioſis, caule rimoſo. *Inſ. Javae ab auſtro vicina.*

laevigata Blum. 80. C. foliolis ovatis acutis glanduloſo-ſerratis laevibus coriaceis, corymbis axillaribus, caule tereti verrucoſo. *Java.*

involucrata * 81. C. foliolis oblongis acuminatis repando-dentatis, floribus polygamis faſciculatis involucratis, marginalibus ♂ pedicellatis, centralibus ☿ ſeſſilibus. *Java.* (Pterisanthes ciſſoides Blum.)

pag. 451.

Ad Cornum.

Poſt n. 13. *macrophylla* Wallich. 17. C. foliis petiolatis ſubrotundo-ovatis acutis integerrimis ſubtus glaucis, cymis terminalibus pedunculatis patentibus. *Nepala.*

pag. 453.

Ad Rivinam.

affinis Mart. 7. R. glabra, foliis ovatis acuminatis obſolete crenulatis margine nudis, racemis aequalibus, calyce 2labiato. *Braſil.*

pag. 454.

Ad Alchemillam.

pectinata Kunth. 11. A. ſarmentoſa filiformis dichotoma, foliis ſubtus argenteo-ſericeis pectinato-ſerratis, radicalibus longiſſime petiolatis reniformibus multilobis, caulinis ſub-3lobis, ſtipulis 3-5fidis, floribus terminalibus diandris. *Nov. Granat.*

ſibbaldiaefolia Kunth. 12. A. caule aſcendente ſuperne ramoſo villoſo, foliis ternato-3partitis ſericeis, laciniis obovatis inciſo-ſerratis, ſtipulis 2-4fidis, corymbis compactis, floribus diandris digynis. *Mexico.*

hirſuta Kunth. 13. A. caule erecto ramoſo foliisque 3partitis hirſutis, laciniis flabellato-multifidis, ſtipulis 2-3-fidis, floribus terminalibus faſciculatis diandris. *Amer. auſtr.?*

nivalis Kunth. 14. A. caule erecto ſubdiviſo denſe folioſo radicante, foliis imbricatis amplexicauli-vaginantibus multifidis externe ſericeo-hirſutis, floribus terminalibus ſubternis ſeſſilibus diandris. *Alp. ſumm. Quito.*

Ad A. *Aphanen* Leers. (A. rupeſtris Kunth. quae A. tripartita R. et P.)

pag. 472.

Ad Perſooniam Sm.

Poſt n. 2. *gnidioides* Sieb. 23. P. foliis filiformibus canaliculatis pungentibus glabris divaricatis, pedunculis breviſſimis ſubſolitariis axillaribus, calycibus ſubſericeis. *Nov. Holl.*

Ad P. *juniperinam* Labill. (P. aceroſa Sieb.)

Poſt n. 6. *arida* Sieb. 24. P. foliis linearibus utrinque attenuatis hirſutis, pedunculis ſolitariis breviſſimis, germinibus villoſis, ſtylis elongatis. *Nov. Holl.*

pag. 473.

Poſt n. 14. *oxycoccoides* Sieb. 25. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis eveniis ſubcoriaceis glabris, ramis diffuſis procumbentibus, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*

revoluta Sieb. 26. P. foliis oblongis obtuſis coriaceis margine revolutis ſubtus pallide ſericeis, fructibus ſtylo obliquo coronatis. *Nov. Holl.*

glaucescens Sieb. 27. P. foliis ſpathulato-lanceolatis mucronatis venuloſis glabris glaucis, ſtylis longiſſimis. *Nov. Holl.*

pag. 474.

Ad Symphyonema R. Br.

abrotanoides Sieb. 3. S. foliis multipartitis, laciniis linearibus glabris 3dentatis, rhachi bracteisque glaberrimis. *Nov. Holl.*

Ad Conoſpermum Sm.

Poſt n. 2. *imbricatum* Sieb. 10. C. foliis imbricatis verticalibus ovatis mucronatis reticulatis baſi contractis ramulisque pubeſcentibus, pedunculis terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 475.

Ad Grevilleam R. Br.

Poſt n. 1. *laurifolia* Sieb. 38. Gr. foliis oblongis acuminatis venoſis ſubtus ſtrigilloſis, racemis multifloris ſpicatis, germinibus villoſis. *Nov. Holl.*

pag. 476.

Poſt n. 12. *acifolia* Sieb. 39. Gr. foliis lineari-filiformibus rigidis patentibus ſupra canaliculatis glabris, racemis abbreviatis, ſtylo longiſſimo glabro. *Nov. Holl.*

Poſt n. 16. *diffuſa* Sieb. 40. Gr. foliis lineari-lanceolatis mucronatis ſubtus ſericeis, capitulis terminalibus pedunculatis. *Nov. Holl.*

pubeſcens Hook. 41. Gr. foliis ſpathulato-oblongis mucronatis utrinque pubeſcentibus, racemis corymboſis, pedicellis calycibusque glabris. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 216.

ferruginea Sieb. 42. Gr. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis venoſis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, ramis hirſutis, fructibus villoſis. *Nov. Holl.*

Ad Gr. *Baueri* R. Br. (Gr. daphnoides Sieb.)

Ad Gr. *occidentalem* R. Br. (Gr. oleoides Sieb.)

pag. 477.

Poſt n. 20. *myrtacea* Sieb. 43. Gr. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ramulisque hirſutiusculis, racemis paucifloris. *Nov. Holl.*

Poſt n. 25. *acanthifolia* Sieb. 44. Gr. foliis pinnatifidis coriaceis glaberrimis, laciniis lanceolatis 3fidis ſpinoſis, ſpicis ſtrobiliformibus, calycibus villoſis, ſtylo glaberrimo. *Nov. Holl.*

pag. 478.

Ad Hakeam Schrad.

Poſt n. 1. *pachyphylla* Sieb. 35. H. foliis teretibus craſſis velutinis mucronatis patentibus, calycibus aggregatis abbreviatis glabriuſculis. *Nov. Holl.*

pag. 485.

Ad Banksiam.

Poſt n. 12. *Cunninghamii* Sieb. 28. B. foliis linearibus integerrimis truncatis mucronatis ſubtus tomentoſis eveniis, ramulis villoſis. *Nov. Holl.*

pag. 487.

Ad Viſcum.

Poſt n. 1. *nepalenſe* * 26. V. ramulis compreſſis ſtriatis dichotomis, articulis ſub-3floris. *Nepal.* (V. dichotomum Don)

pag. 488.

Ad V. *orientale* W. (V. ſtellatum Don.)

Poſt n. 23. *platyphyllum* * 27. V. ramulis alternis angulatis glabris, foliis alternis obovatis ſubtus nervoſis petiolatis, umbellis ſub-4floris pedunculatis ſparſis, involucellis 6fidis perſiſtentibus. *Nepal.* (V. latifolium Hamilt. Don.)

Ad Elaeagnum.

Poſt n. 1. *argentea* Purſh. 10. E. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra lepidotis ſubtus argenteis, pedunculis nutantibus. *Ad fl. Miſſuri.* Colla hort. ripul. t. 28.

pag. 489.

El. *triſloram* Roxb. ad El. *latifolium* L. pertinere Don. et Rich.

Poſt n. 4. *ferruginea* Rich. 11. E foliis elliptico-oblongis acuminatis ſubcoriaceis ſubtus ferrugineo-lepidotis, pedunculis ſubternis axillaribus. *Java.*

El. *conferta* Roxb. — ſtylo ſtellatim piloſo.
El. *arborea* Roxb. — foliis acuminatis, ſtylo glabro.
El. *umbellata* Thunb. — ſtylo glabro. *Nepal?*

pag. 491.

Ad Hamamelida.

chinenſis R. Br. 2. H. foliis ſubovatis integerrimis ſubtus reticulatis ſtellato-pubeſcentibus, capitulis pedunculatis. *China.* (Arbuscula ſinenſis Plukn. t. 368. f. 2. Abel. it. chin. p. 375.)

Dicorypha Thuars.

ſtipulacea Thuars.

pag. 493.

Ad Myricam.

Poſt n. 5. *eſculenta* Hamilt. 17. M. foliis ſpathulatis integerrimis coriaceis nitidis, amentis ♂ axillaribus racemoſis, caule arboreo. *Nepal.*

†*octandra* Hamilt. 18. M. foliis oblongis apice attenuatis ſubintegerrimis glabris, amentis ♂ ſolitariis petiolo longioribus, floribus 8andris. *Nepal.*

pag. 495.

Ad Ilicem.

Poſt n. 12. *elliptica* Kunth. 30. I. foliis ellipticis apice ſerrulatis coriaceis glaberrimis ſupra nitidis, pedunculis 1floris ramulisque villoſis, corollis 5-6petalis. *Peru.*

Scopulorum Kunth. 31. I. foliis obovatis rotundatis obſolete crenatis coriaceis glabris ſupra nitidis, pedunculis 5-7floris viſcoſo-pubeſcentibus, corollis 4-5petalis. *Peru.*

rupicola Kunth. 32. I. foliis ſubrotundo-ellipticis obtuſis crenato-ſerratis coriaceis glaberrimis nitidis, pedunculis ſub-3floris glabris, corollis 4petalis. *Peru.*

odorata Don. 33. I. foliis oblongis crenulatis, umbellis ſeſſilibus glomeratis petiolos aequantibus. *Nepal.*

paraguaienſis Hilar. 34. I. foliis ſpathulato-oblongis obtuſiusculis remote ſerratis glaberrimis, pedunculis axillaribus multipartitis, ſtigmate 4lobo. *Braſil. Paraguay.* (Caffine Gongonha Mart. Syſt. 1. 939.)

myricoides Kunth. 35. I. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerrulatis laevibus, pedunculis 3floris glabris, corolla 4petala. *Nov. Granat.*

pag. 496.

Poſt n. 25. *nepalenſis* * 36. I. foliis ſubellipticis utrinque attenuatis integerrimis, umbellis globoſis pedunculatis pubeſcentibus petiolo brevioribus. *Nepal.* (I. elliptica Don.)

I. *rotunda* Thunb. — floribus 5andris. *Nepal.*

bumelioides Kunth. 37. I. foliis obovatis mucronatis ſubintegerrimis glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Quito.*

pag. 497.

Ad Goniocarpum Thunb.

ſalſoloides Reichenb. 3. G. foliis linearibus glabris, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 498.

Ad Bulliardam Cand.

Sieberii * 4. B. caule erecto ramoſo, foliis linearibus ciliatis, pedunculis breviſſimis axillaribus aggregatis. *Nov. Holl.* (Tillaea pedunculata Sieb.)

pag. 499.

Ad Potamogetona.

Poſt n. 8. *indicus* Roxb. 24. P. gracilis, foliis longe petiolatis lanceolatis acutis coriaceis, ſuperioribus oppoſitis,

tis, ſpicis pedunculatis remote verticillatis, pedunculis aequalibus. *Ind. or.*

Poſt n. 19. *crenulatus* Don. 25. P. foliis lineari-lingulatis obtuſis crenulatis membranaceis 3nerviis ſeſſilibus, ſummis oppoſitis. *Nepal.*

pag. 500.

Ad Ruppiam.

R. *maritima*, — vaginis latioribus, pedunculis 4floris, antherarum loculis oblongis, nuculis erecto-obliquis.

roſtellata Koch. 4. R. vaginis anguſtiſſimis, antherarum loculis ſubgloboſis, nuculis transverſe obliquis roſtellatis. *Ad oras maris baltici.* Reichenb. ic. t. 174.

didyma Sw. 5. R. vaginis ſupremis ampliatis, pedunculis incraſſatis ſubbifloris, nuculis roſtratis baſi connatis. *Inſ. Bartholom. e Carib.* Act. holm. 1825. p. 427.

CLASSIS V.

pag. 505.

Poſt n. 631. *Aſpidoſperma* Mart. Cal. 5partitus. Cor. 5fida. Stam. tubo adnata breviſſima. Stylus clavatus. Folliculus compreſſus glaber.

Couma Aubl. Cal. 5fidus. Cor. infundibuliformis, laciniis anguſtis primum tortis. Stam. breviſſima, antheris ſagittatis. Diſcus hypogynus. Stigma 2fidum. Drupa 3-5pyrena. *Contortae.*

Poſt n. 634. *Mitreola* Rich. Cal. 5partitus perſiſtens. Cor. urceolata. Stam. incluſa. Stigma indiviſum. Capſ. 2locularis, loculis polyſpermis, placentis internis. *Gentianeae. Ophiorrhiza* melius collocatur p. 514. poſt n. 778.

pag. 506.

Fabiana R. et P. Cal. 5fidus, dele *tubum cor. longiſſimum.*

Poſt n. 653. *Sibthorpia.* Cal. turbinatus 5fidus. Cor. ſubrotata. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Capſ. compreſſa 2locularis, placenta centrali. *Scrophularinae.*

pag. 508.

Poſt n. 683. *Beaumontia* Wallich. Cal. 5ſepalus. Cor. ventricoſa campanulata, limbo 5lobo. Antherae ſagittatae. Squamae hypogynae 0. Germen ſimplex.

pag. 510.

Poſt n. 718. *Embelia* Burm. Don. Cal. 5fidus. Cor. 5partita. Stam. laciniis corollae oppoſita, filamentis elongatis, antheris peltatis. Stigma truncatum. Drupa 1ſperma. *Myrſineae.*

Poſt n. 720. *Hunteria* Roxb. Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis. Stigma 2lobum. Baccae duae 1-2ſpermae.

pag. 513.

Poſt n. 773. *Hymenopogon* Wallich. Cal. 5partitus. Cor. longe tubuloſa hypocrateriformis, limbo 5fido. Stam. intra tubum. Capſ. 4valvis 2locularis. Sem. utrinque membranula appendiculata.

Lecananthus Jack. Cal. coloratus amplus carnoſus, inaequaliter 2-4lobus. Cor. calyce minor, tubo abbreviato, limbo 5fido. Stylus 2fidus. Capſ. 2locularis polyſperma.

Pſilobium Jack. Cal. amplus 5partitus. Cor. tubus brevis, limbo 5fido. Stam. baſi corollae inſerta. Stigma clavatum 10alatum exſertum. Fructus ſiliquaeformis 2locularis polyſpermus.

pag. 514.

Ophiorrhiza transponatur e p. 505. huc poſt n. 778. inter Rubiaceas, egregie expoſita ab Ach. Richardo in act. ſoc. nat. Pariſ. vol. 1. p. 61-68.

pag. 515.

n. 793. *Bartlingia* Reichenb. deleatur. Eſt enim *Plocama* p. 516. n. 815.

Poſt n. 801. *Zuccarinia* *. Cal. 1lateralis 3fidus. Cor. infundibuliformis, limbo 5fido. Antherae in tubo ſeſſiles. Stigma 2lobum. Fructus baccatus 1ſpermus? germine 2loculari oligoſpermo. (Jackia Wallich. in flor. ind. 2. p. 323.)

Argoſtemma Wallich. Cal. 4-5dentatus. Cor. rotata, 4-5partita. Antherae conniventes exſertae. Fructus 2locularis polyſpermus?

pag. 516.

Poſt n. 809. *Geophila* Don. Cal. 5partitus. Cor. tubuloſa 5fida. Stam. incluſa. Stigma 2fidum. Bacca 2ſperma calyce coronata. *Rubiaceae.*

pag. 517.

n. 827. *Stylocoryna* Cav. — Capſ. 2-4-polyſperma.

Poſt n. 831. *Leyceſteria* Wallich. Cal. inaequaliter 5partitus. Cor. infundibuliformis ſupra baſin gibba, limbo 5lobo. Stam. exſerta. Stigma capitatum. Bacca 5locularis polyſperma.

pag. 518.

Poſt n. 838. *Perrottetia* Kunth. Cal. 5lobus. Pet. 5 majora perſiſtentia. Stam. cum petalis alternantia. Anthe-

rae cordatae 2loculares (?). Stigma ſeſſile 2lobum. Diſcus orbicularis in fundo floris. Fructus baccatus dipyrenus. *Familia.*

Poſt n. 851. *Icacina* Juſſ. Cal. inferus 5fidus. Pet. 5 e diſco hypogyno orta, cui et ſtamina alterna inſident. Antherae cordatae 2loculares. Stigma truncatum. Fructus 1ſpermus. *Familia?*

n. 856. *Bonplandia* W. deleatur, contrahenda cum *Galipea* Aubl. p. 534.

Poſt n. 857. *Euthemis* Jack. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Stam. hypogyna. Antherae apice poris duobus dehiſcentes. Stylus filiformis. Bacca 5ſperma. Sem. arillata.

† *Syndeſmis* Wallich. Cal. ſpathaceus coloratus hinc fiſſus. Pet. 4, 5 baſi cum filamentis juncta. Antherae ſagittatae. Stylus lateralis, ſtigmate ſimplici. Germen globuloſum 1ſpermum.

Harpullia Roxb. Cal. 5ſepalus. Pet. 5, cum ſtaminibus alterna. Stigma 2lobum. Capſ. 2locularis 2ſperma. *Sapindeae.*

pag. 520.

n. 879. *Brexia* Nor. Noronha enim condidit genus.

Poſt n. 887. *Hortia* Vand. Cal. 5dentatus perſiſtens. Pet. 5 uncinata baſi barbata. Filamenta complanata. Antherae dorſo affixae 2loculares. Capſ. 5locularis, loculis 1-2ſpermis. *Rutaceae.*

Metrodorea Hilar. Cal. 5fidus. Pet. 5. Diſcus glandulofo-tuberculatus. Filamenta ſubulata. Antherae cordatae. Stylus breviſſimus Stigma obtuſum. Germen 5loculare, loculis 2ſpermis. *Rutaceae.*

Dictyoloma Adr. Juſſ. Cal. 5partitus. Pet. 5. Squamae lanatae ſtaminiferae. Stigma capitatum. Capſ. 5 2valves 3ſpermae. Sem. reniformia dorſo reticulato-alata. *Rutaceae.*

pag. 521.

n. 899. *Noiſettia* Humb. Kunth. Sem. ovato-globoſa, *haud alata.*

Anchietea Hilar. Cal. 5partitus. Cor. irregularis, petalo quinto maximo calcarato. Capſ. maxima inflata 3valvis polyſperma. Sem. grandia compreſſa alata. *Ionidia.*

Poſt n. 901. *Amphirrhox* *. Cal. 5partitus. Pet. 5 unguiculata ſpathulata ſubinaequalia, unguibus longis in tubum conniventibus Antherae apice mucronatae. Capſ. 1locularis 3valvis, valvis placentiferis. *Ionidia.*

pag. 522.

Poſt n. 912. *Sphaerocarya* Wallich. Cal. 5partitus. Pet. 5 cum ſtaminibus alterna. Squamae 5 fimbriatae inter ſtamina et oppoſitas calycis lacinias. Stylus indiviſus. Drupa nuce 1ſperma. *Rhamneae?*

Poſt n. 915. *Crumenaria* Mart. Cal. campanulatus 5fidus ſuperne coloratus. Pet. cucullata unguiculata ſtamina recipientia. Stigm. 3. Capſ. 3cocca 3alata. *Rhamneae.*

pag. 523.

Poſt n. 927. *Guillemínea* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus 3bracteatus. Stam. 5 brevia tubo inſerta. Antherae 1loculares. Stigma emarginatum. Capſ. 1ſperma, calyce tecta.

Poſt n. 931. *Pfaffia* Mart. Char. Gomphrenae, praeter ſtigma ſimplex capitatum ſeſſile.

Mogiphanes Mart. Cal. 5ſepalus 2bracteatus, ſtipitatus baſi 5glanduloſus, ſtipitulo demum articulato. Tubus cylindricus antheras 1loculares, interjectis ſquamulis, gerens. Styl. 1. Stigma capitatum. Utriculus evalvis 1ſpermus.

Hoplotheca Nutt. Cal 1phyllus 5fidus 2bracteatus demum dureſcens. Tubus cylindricus ſtaminifer. Antherae 1loculares. Stigma penicillatum capitatum. Utriculus 1ſpermus calyce indurato clauſus.

Poſt n. 934. *Bouſſingaultia* Humb. Cal. membranaceus perſiſtens, limbo duplici, ext. 2-, inter. 5partito. Stam. baſi calycis inſerta. Antherae 2loculares poſticae. Stylus 1. Stigma 3lobum. Utriculus 1ſpermus ſtylo coronatus.

Poſt n. 939. *Licania* Aubl. Cal. turbinatus 5fidus baſi 2bracteatus. Stam. annulo calycis interno inſidentia ejusque laciniis oppoſita. Stylus incurvus, ſtigmate ſimplici. Drupa 1ſperma. *Roſaceae?*

pag. 525.

n. 968. *Heurniam* ſcribo, non Huerniam, cum Juſti Heurnii, collectoris Batavi in Africa auſtrali, nomen gerat. Juſtus Heurnius, paſtor ac medicus, pictor plantarum capenſium, frater Othonis, prof. Leidenſis, et filius Joannis, celeberrimi auctoris. Inclitum nomen, quod inſcitia ſola deformare poteſt! Stapel. ad Theophr. p. 333. Hermann. hort. lugd. bat. p. 54.

pag. 526.

Poſt n. 990. *Ditaſſa* R. Br. Cor. ſubrotata 5partita. Corona duplex, ext. 5partita, inter 5phylla exteriori oppoſita. Antherae membrana terminatae.

pag. 527.

n. 996. *Oxypetalum* R. Br. add. Retinacula maſſarum pollinis ſurſum in appendiculam et dentes ſubulatos abeuntia.

Poſt n. 999. *Phyſianthus* Mart. Cor. campanulata baſi ventricoſa. Corona 5phylla ſublibera carnoſa, foliolis extrorſum apice cucullatis. Stigmata apiculata exſerta.

n. 1001. *Gentiana*, leg. *Cal.* campanulatus.

Poſt n. 1005. *Neuropeltis* Wallich. Cal. 5ſepalus perſiſtens. Cor. infundibuliformis 5fida. Stigmata reniformia. Capſ. 1ſperma bractea dilatata ſuffulta. *Convolvuleae.*

pag. 528.

n. 1014. deleatur *Banffya* Baumg. Eſt enim Gypſophilae ſpecies, vol. 2. p. 373.

Poſt n. 1018. *Meniſcoſta* Blum. Flores polygami. Cal. 4-5fidus. Pet. 4, 5 biſerialia. Stam. lata petalis oppoſita. Diſcus 5dentatus perigynus. Stigm. 2. Baccae didymae 1ſpermae. *Meniſpermeis affinis.*

Poſt n. 1023. *Dulongia* Kunth. Cal. 5dentatus. Pet. 5. Diſcus orbicularis germen obtegens. Stam. cum petalis alterna, cum iisdem ſub ambitu diſci inſerta. Antherae 2loculares. Stylus 0. Stigmata 2. Bacca ſemibilocularis, calyce petalis ſtaminibusque coronata, loculis 2-3ſpermis. *Rhamneae.*

pag. 533.

Poſt n. 1117. *Merckia* Fiſch. Cal. 5ſepalus. Pet. integra. Stam. baſi libera. Capſ. inflata umbilicata ſulcata baſi 3locularis 3valvis. Semina pyriformia. *Caryophylleae.*

pag. 534.

Poſt n. 1140. *Eurycoma* Jack. Flores polygami. Cal. 5partitus. Pet. 5 glandulofo-piloſa. Glandulae 10 geminae inter ſtamina. Fructus 5 1ſpermi baſi coaliti. *Terebinthaceae.*

Poſt n. 1141. *Galipea* Aubl. Cal. 5fidus. Pet. 5 linearia villoſa conglutinata. Stam. 5, quorum 2-4 ſaepe abortiunt. Antherae baſi 2lobae. Styli 5 ſubcoaliti. Cocci 5 2valves. *Rutaceae.*

---

pag. 536.

Ad Tricratum Herit.

arenarius * 3. Tr. foliis cordatis orbicularibus carnoſis, involucro perſiſtente, ſtaminibus incluſis, lobis limbi repando-undulatis. *California.* (Abronia Hook. exot. fl. t. 193.)

pag. 538.

Ad Cerinthen.

alpina Kit. 6. C. caule ramoſo, foliis cordato-ovatis integerrimis glabris, corollis 5dentatis, dentibus revolutis, antheris filamenta longitudine ſuperantibus. *Ad Danubium. Hungar.* (C. 5-maculata Wahlenb. carpath., ſuevica Martens.)

pag. 539.

Heliotropium viridiflorum Lehm. deleatur, rediturum ſub Tournefortia.

Ad H. *linifolium* Lehm. (H. compactum Don., brevifolium Wall.)

pag. 540.

Poſt n. 26. *obovatum* Roxb. Don. 65. H. caule decumbente ſubramoſo, foliis obovatis petiolatis eveniis utrinque ſericeis, ſpicis conjugatis, calycibus tubo corollae brevioribus. *Nepal.*

pag. 543.

† *Roxburghii* * 66. H. caule erecto ramoſo hirſuto, foliis ovato-oblongis, ſpicis terminalibus paniculatis ſecundis. *Ind. or.* (H. paniculatum Roxb.)

pag. 547.

Ad *Pulmonariam mollem* Wolf. (non Wulff.) Patria et *Bavaria et ager ſpadanus.* (P. ſaccharata Mill.)

pag. 548.

Onoſma eſt neutrum. *Περὶ ὀνόσματος* enim ſcribit Dioſc. 3, 147. Dioſma vero et Citroſma, ex *ὀσμὴ* compoſitae, feminae ſunt.

pag. 549.

Ad Onoſma.

Poſt n. 14. *macrocephalum* Don. 22. O. hiſpidiſſimum, racemis recurvatis aggregatis, caule aſcendente ſimplici, foliis lanceolatis acutis ſubtus mollibus 3nerviis, laciniis calycis linearibus plumoſis corollam ſuperantibus, ſtylo incluſo. *Nepal.* (O. bracteatum Wallich.)

Gmelini Ledeb. 23. O. foliis ſpathulato-lanceolatis tuberculato-hiſpidis, caule ſimplici, corymbo ſeſſili, corolla tubuloſa repando-dentata, genitalibus exſertis. *Imaus. Sibir. auſtr.* Gmel. ſib. 4. t. 40.

Emodi Wallich. 24. O. procumbens hiſpidum, foliis lanceolatis triplinerviis, racemis terminalibus ſolitariis, bracteis linearibus, corollae ventricoſae 5ſulcatae ore contracto, antheris filamenta ſuperantibus, ſtylo exſerto. *Nepal.* Roxb. fl. ind. 2. p. 11.

pag. 554.

Echium bonarienſe Poir. eſt idem ac *plantagineum* L., advena ex Europa. Hilar. pl. uſ. braſil. ad t. 25.

pag. 557.

Ad Myosotida.

Poſt n. 9. *robuſta* Don. 33. M. caule aſcendente ſimplici, foliis oblongis acutis ſeſſilibus utrinque piloſis, racemis conjugatis brevibus bracteatis, laciniis calycis obtuſis tubum corollae ſuperantibus. *Emodi montes.*

ovalifolia Wallich. 34. M. caule procumbente hirſutiusculo, foliis petiolatis ſubcordato-ovatis acutis hiſpidiusculis,

racemis terminalibus elongatis filiformibus, feminibus glaberrimis 3quetris. *Nepal.*

pag. 559.

Ad Borraginem.

ſpinuloſa Roxb. 7. B. foliis ſeſſilibus oblongis ſcabris, pedunculis oppoſitifoliis 1floris, caule debili dichotomo hiſpido. *Bengal.*

pag. 561.

Ad Anchuſam.

Poſt n. 24. *arvalis* Reichenb. 35. A. foliis lanceolatis denticulatis hiſpidis, ſpicis laxis elongatis, bracteis ovato-lanceolatis, calycibus demum erectis (floribus coeruleis). *German.* (A. anguſtifolia Roth, arvenſis Tauſch.)

pag. 563.

Ad Symphytum.

Poſt n. 5. *bulboſum* Schimper. 9. S. radice repente tuberifera, foliis oblongis decurrentibus, dentibus corollae erectis, fornicibus exſertis. *Palatinatus.* Reichenb. ic. t. 220.

pag. 564.

Ad Cynogloſſum.

Poſt n. 3. *furcatum* Wallich. 49. C. foliis elliptico-oblongis acutis ſemiamplexicaulibus utrinque ſericeis, racemis geminis erectis tenuifloris ſecundis, laciniis calycis obtuſiſſimis ſetoſis. *Ind. or.*

C. *caneſcens* W. (C. racemoſum Roxb.)

pag. 565.

Poſt n. 27. *proſtratum* Hamilt. 50. C. caule proſtrato foliisque hiſpidis, foliis radicalibus longe petiolatis obovatis, caulinis ſeſſilibus ellipticis, pedunculis abbreviatis ſubextraxillaribus. *Ind. or.* (C. marifolium Roxb.)

pag. 569.

Ad *Nemophilam phacelioidem* Bart. (N. Nuttallii Coll. app. ad hort. ripul.)

pag. 571.

Ad Lyſimachiam.

Poſt n. 6. *ſecunda* Don. 24. L. caule erecto glabro, foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis, racemis terminalibus ſpicatis ſecundis, floribus cernuis, calycibus corolla brevioribus. *Nepal.* (L. lobelioides Wallich.)

pag. 572.

Ad Lyſimachium.

Poſt n. 17. *alternifolia* Wallich. 25. L. caule erecto 4gono foliisque alternis petiolatis oblongis utrinque attenuatis pubeſcentibus, pedunculis capillaribus elongatis, calycibus corollam ſuperantibus. *Nepal.* (L. evalvis Wall., tetragona Don.)

pyramidalis Wallich. 26. L. caule erecto tereti, foliis oppoſitis, inferioribus ovato-lanceolatis ſuperioribus linearibus, pedunculis axillaribus abbreviatis, calycibus corollam ſuperantibus. *Nepal.* (L. heterophylla Don.)

Ad L *japonicam* Thunb. (L. debilis Wallich.) *Nepal.*

pag. 573.

Ad Dodecatheon.

frigidum Chamiſſ. Ledeb. 3. D. foliis ſubſpathulatis repando-dentatis, umbellis paucifloris, pedunculis divaricatis glandulosis, bracteis ſubulatis, antheris ſubſeſſilibus. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 574.

Ad Primulam.

Pr. *denticulata* Sm. patriam habet *Nepalam* Don. fl. nepal. p. 79., non Africam.

pag. 575.

Poſt n. 24. *altiſſima* Don. 52. Pr. foliis cordato-oblongis obtuſis inaequaliter dentatis rugoſis, petiolis longiſſimis ſimplicibus, umbella multiflora, foliolis involucri dentatis, lobis corollae obcordatis. *Emodi montes.* (Pr. reticulata Wallich.)

ſpecioſa Don. 53. Pr. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis eroſo-dentatis reticulato-venoſis, petiolis praelongis dilatatis, umbella multiflora, foliolis involucri lanceolatis integerrimis, laciniis calycis ellipticis, corollae oblongis 2fidis. *Emodi montes.*

Poſt n. 27. *rotundifolia* Wallich. 54. Pr. foliis cordato-ſubrotundis groſſe ſerratis ſubtus farinoſis, petiolis longiſſimis aequalibus, umbella pauciflora, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Emodi montes.*

macrophylla Don. 55. Pr. foliis oblongis argute ſerrulatis mucronatis ſupra glabris ſubtus farinoſis, umbella pauciflora, lobis corollae obcordatis. *Emodi montes.*

Stuartii Wallich. 56. Pr. foliis lanceolatis acutis ſerratis glabris ſubtus ſubtiliter farinoſis, umbella pauciflora, lobis corollae 4dentatis. *Emodi montes.*

longifolia Curt. n. 32. Pr. foliis oblongis obtuſis denticulatis glaberrimis, umbella erecta multiflora, involucris polyphyllis ſubulatis reflexis, laciniis calycis linearibus tubum corollae aequantibus. *Caucaſ.*

nivalis Pall. 57. Pr. foliis ſpathulato-lanceolatis repando-dentatis glabris, umbella multiflora erecta, foliolis

involucri lanceolatis baſi ſubconnatis, laciniis calycis lanceolatis tubo corollae brevioribus. *Sibir.*

pàg. 576.

Ad Pr. *ſibiricam* Jacqu. (Pr. intermedia Ledeb.)

Poſt n. 45. *anguſtifolia* Torr. 58. Pr. foliis ſubſpathulato-oblongis integerrimis membranaceis glabris eveniis, ſcapo 1floro, laciniis calycis ſubulatis, lobis corollae rotundatis integerrimis. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 3.

pag. 577.

Poſt n. 49. *tridentata* Don. 59. Pr. foliis radicalibus obovatis longe petiolatis eroſo-dentatis glabris reticulato-rugoſis, ſcapo 1floro foliis breviori, laciniis corollae acute 3dentatis. *Nepal.* (Pr. petiolaris et nana Wallich.)

Ad Androſacen.

Poſt n. 1. *primulina* * 27. A. foliis lanceolatis acutis pinnatifido-ferratis utrinque ſcapoque pubeſcentibus, umbella 3flora, laciniis calycis obtuſis, fauce corollae barbata, lobis 2fidis. *Nepal.* (A. primuloides Don., puſilla Wallich.)

pag. 578.

Poſt n. 14. *carinata* Torr. 28. A. foliis congeſtis ovato-lanceolatis acutis carinatis ciliatis, ſcapo villoſo, umbella pauciflora, calycibus obtuſis corolla brevioribus. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.* Ann. of the Lyc. of New-York, 1. t. 3. f. 1.

Poſt n. 16. *ſarmentoſa* Wallich. 29. A. ſarmentis elongatis radicantibus, foliis aggregatis ſpathulatis mucronatis integerrimis villoſiſſimis, umbella multiflora, lobis corollae integerrimis. *Emodi montes.* (A. lanuginoſa Wallich.)

Ad A. *rotundifoliam* Sm. (A. inciſa Wallich.)

Poſt n. 20. *arctica* Chamiſſ. 30. A. foliis oblongis rigidis margine revolutis ſupra denſe furcato-pubeſcentibus ſubtus glaberrimis, pedunculis folia aequantibus, calycibus glaberrimis. *Ora occid. Amer. arctic.*

pag. 579.

Ad Erythraeam.

deleantur E. *compreſſa* Heyn., *litoralis* Fries n. 3. et 5. quae pertinent ad E. *linarifoliam* Perſ. n. 10., cujus melior character hic eſt: E. caule apice ramoſo, foliis radicalibus ſpathulatis, caulinis linearibus, floribus terminalibus aggregatis. *German. Anglia. Gallia. Succia.* (E. conferta Perſ., uliginoſa Kit., aggregata Thouin., litoralis Fries., compreſſa Hayn., anguſtifolia Wallr.)

pag. 580.

deleatur *Sabbatia verticillata*, reducenda ad *Hippion* * p. 589.

pag. 581.

Ad Sabbatiam.

auſtralis Schlechtend. 11. S. caule erecto 4angulo ſubalato, foliis radicalibus obovatis, caulinis lineari-lanceolatis, pedunculis elongatis 1floris, calyce 5partito tubum ſubaequante, laciniis corollae acuminatis. *Ad fl. Platam.* Sello.

pag. 584.

Poſt *Allamandam:*

ASPIDOSPERMA Mart.

tomentoſum Mart. 1. A. foliis terminalibus faſciculatis ſubſeſſilibus oblongis repandis venoſis utrinque tomentoſis, cymis compoſitis aggregatis. *Braſil.*

macrocarpon Mart. 2. A. foliis ſubcordato-oblongis obtuſis petiolatis coriaceis ſubtus tomentoſis, cymis compoſitis aggregatis. *Braſil.*

refractum Mart. 3. A. ramulis dichotomis refractis, foliis ovatis acutis pubeſcentibus, cymis ſimplicibus paucifloris. *Braſil.*

bicolor Mart. 4. A. ramulis divaricatis, foliis petiolatis obovatis obtuſis ſupra glabris ſubtus incano-tomentoſis. *Braſil.*

pyrifolium Mart. 5. A. foliis petiolatis ovatis acutis utrinque glabris. *Braſil.*

COUMA Aubl.

guianenſis Aubl. *Guiana.* Arbor excelſa, foliis ternatis oblongis glabris, floribus paniculatis roſeis. (Cerbera triphylla Rudg.) Rich. in ann. de ſcienc. natur. 1. p. 56.

pag. 585.

Ad Spigeliam

Ad Sp. *hamellioidem* Kunth. (Sp. Humboldtiana Schlechtend.) *Braſil.* Laciniae calycis capſulam laevem ſubaequant. Sp. *Anthelmia* L. habet lacinias calycis capſula muricata breviores.

ſcabra Schlechtend. 6. Sp. herbacea perennis, foliis ovato-lanceolatis rigidiusculis ſubtus ſcabris, floralibus quaternis, ſtaminibus incluſis, laciniis calycis capſulam ſcabriusculam ſuperantibus. *Ad fl. Platam.* Sello.

Flemmingiana Schlechtend. 7. Sp. herbacea annua, foliis oblongo-lanceolatis, floralibus quaternis, ſtaminibus incluſis, dentibus calycis minimi baſin capſulae laevis ſubaequantibus. *Braſil.* Sello.

Beyrichiana Schlechtend. 8. Sp. herbacea perennis, foliis petiolatis ovatis, floralibus quaternis, ſtaminibus incluſis, laciniis calycis baſi capſulae laevis paullo longioribus. *Braſil.* Beyrich.

laurina Schlechtend. 9. Sp. fruticuloſa glaberrima, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis, floralibus quaternis, ſtaminibus incluſis, dentibus calycis minimis. *Braſil.* Sello.

Selloi * 10. Sp. fruticoſa ſtellato-tomentoſa, foliis ovatis acutis, genitalibus exſertis, laciniis corollae lanceolatis. *Braſil.* Sello. (Sp. Sellowiana Schlechtend.)

Olferſiana Schlechtend. 11. Sp. fruticoſa ſtellato-tomentoſa, foliis ſubcordato-ovatis acutis, ſtaminibus incluſis, laciniis corollae obtuſis. *Braſil.* Sello.

Loco *Ophiorrhizae* ponatur:

MITREOLA Rich.

ophiorrhizoides Rich. *Ind. occid. Carolina.* Herba ſimplex glabra, foliis ovato-oblongis, cyma terminali biſido-ramoſa, floribus 1lateralibus ſeſſilibus albis. (Ophiorrhiza Mitreola L.)

pag. 586.

Ad Liſianthum P. Br.

Poſt n. 19. *ſpecioſus* Schlechtend. 32. L. caule 4gono ſimplici, foliis ſeſſilibus ovatis obtuſis nervoſis marginatis, panicula trichotoma coarctata, floribus cernuis. *Braſil.* Sello.

pag. 587.

Poſt n. 28. *pedunculatus* Schlechtend. 33. L. caule ſimplici 4gono, foliis ſeſſilibus ovato-oblongis acutis, pedunculo terminali 1floro, calycis campanulati corollaeque laciniis acutis. *Braſil.* Sello.

pag. 588.

Ad Loganiam R. Br.

Poſt n. 9. *anguſtifolia* Sieb. 11. L. fruticoſa, foliis lineari-lanceolatis cuſpidatis ſubtus tomentoſis, ſtipulis obſoletis, floribus axillaribus corymboſis. *Nov. Holl.*

Ad Genioſtoma Forſt.

acuminatum Wallich. 6. G. ramis 4angulis ſubſcandentibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminato-cuſpidatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus ſtrigillofis, umbellis axillaribus petiolo brevioribus. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 589.

Ad Chironiam.

centauroides Roxb. 9. Ch. caule 4gono dichotomo, foliis oblongis 3nerviis, calycibus ſubſolitariis carinatis, ſtigmate 2lobo. *Bengal.*

Ad Hippion *.

controverſum * 4. H. caule ſimpliciſſimo ſtricto tereti, foliis verticillatis ſeſſilibus reflexis ovato-oblongis acutis 3nerviis, floribus corymboſo-paniculatis. *Braſil.* Sello. (Sabbatia verticillata Syſt. veg. 1. p. 580. Curtia gentianoides Schlechtend. Linnaea p. 210.)

pag. 590.

Ad Convolvulum.

Ad C. *pentaphyllum.* (C. hirſutus Roxb.)
Ad C. *pendulum* * (C. pedatus Roxb.)

pag. 591.

Ad C. *tenuifolium* Vahl. (C. digitatus Roxb.)

pag. 594.

Ad C. *acuminatum* Vahl. varietas: C. *pudibundus* Lindl. in Bot. reg. 999.

Poſt n. 60. *bignonioides* * 336. C. radice tuberoſa, foliis 3lobis dentatis, lobis poſticis ſibi incumbentibus, pedunculis ſub-3floris pendulis petiolo brevioribus, laciniis calycis ſubaequalibus obtuſiusculis, limbo corollae infundibuliformis criſpato. *Cayenna.* (Ipomoea Bot. mag. 2645.)

pag. 596.

Poſt n. 92. *gangeticus* Roxb. 337. C. foliis cordato-ſubrotundis obtuſis ſubtus villoſis punctatis parallele venoſis, pedunculis axillaribus petiolo brevioribus, laciniis calycis reniformibus demum auctis, germinibus 4locularibus. *Ind. or.*

pag. 597.

Ad C. *latiflorum* Desr. (Ipomoea noctiluca Herb. ad Bot. reg. 917.)

pag. 598.

Poſt n. 117. *ſemidigynus* Roxb. 338. C. foliis cordato-ovatis acutis villoſis, pedunculis petiolo brevioribus, corolla extus pubeſcente. *Ind. orient.*

Poſt n. 119. *Hardwickii* * 339. C. foliis cordatis acutis ſubpubeſcentibus, pedunculis 2-3floris demum nutantibus, laciniis calycis exterioribus ſagittatis ciliatis tubum gibbum corollae aequantibus. *Ind. or.* (C. calycinus Roxb.)

pag. 599.

Ad C. *coccineum* * (Ipomoea phoenicea Roxb.)

pag. 600.

Poſt n. 159. *Hamiltonii* * 340. C. foliis cordatis cuſpidatis pubeſcentibus, pedunculis multifloris folia ſuperantibus, laciniis calycis acutis piloſis. *Nepal.* (Ipomoea cuſpidata Don.)

Poſt n. 145. *pileatus* * 341. C. foliis profunde cordatis villoſis, involucro 4angulari peltato 4-6floro. *China.* (Ipomoea pileata Roxb.)

Ad C. *hiſpidum* Vahl. (C. piloſus Roxb.)

pag. 601.

Ad C. *repandum* Desr. (C. blandus Roxb.)

pag. 603.

Poſt n. 191. *davuricus* Sims. 342. C. foliis ſagittato-cordatis oblongis ſubtus pedunculisque 1floris tomentoſis, bracteis late ovatis acutis (floribus roſeis). *Sibir.* Bot. mag. 2609.

pag. 604.

Poſt n. 206. *Malcolmii* Roxb. 343. C. foliis ſagittatis glabris, auriculis angulato-dentatis, pedunculis petiolos ſuperantibus clavatis, laciniis calycis ovatis. *Perſia.*

pag. 605.

Poſt n. 221. *ſphaerocephalus* Roxb. 344. C. foliis ſagittato-cordatis oblongis utrinque villoſis, capitulis axillaribus ſeſſilibus (floribus parvis purpureis). *Ind. or. Nepal.* (C. atropurpureus Wall., Ipomoea ſphaerocephala Don.)

pag. 606.

Ad C. *Kleinii* * (C. laurifolius Roxb. fl. ind. 2. p. 50.)

Poſt n. 233. *Rottleri* * 345. C. foliis ovatis acutis longe petiolatis parallele venoſis ſubpubeſcentibus, pedunculis multifloris, bracteis lanceolatis calyces ſuperantibus. *Ind. or.*

pag. 608.

Poſt n. 255. *ſtipulaceus* Roxb. 346. C. foliis cordato-ſagittatis mucronatis glabris, auriculis repandis, pedunculis multifloris petiolos aequantibus, calycibus glabris, lobis corollae obcordatis. *Ind. or.*

pentagonus Roxb. 347. C. ramis 5gonis, foliis cordato-ſagittatis villoſis, auriculis ſubangulatis, pedunculis umbelliferis rigidis, calycibus glabris. *Inſ. Molucc.*

Poſt n. 257. *Wallichianus* * 348. C. caule proſtrato, foliis haſtato-trilobis obtuſis utrinque glabris, auriculis

emarginatis, pedunculis 1floris elongatis, bracteis cordatis calyces ſuperantibus. *Nepal.* (Calyſtegia hederacea Wallich.)

Clappertonii * 349. C. caule repente, foliis ſagittatis glaberrimis, auriculis acutiusculis integerrimis, pedunculis 1floris. *Afric. med.* (Ipomoea R. Br. ad Denham. it. p. 240.)

Ad C. *Beladambu* * (C. flagelliformis Roxb. fl. ind. 2. p. 68.)

pag. 609.

Ad C. *ebracteatum* Desr. adde patriam: *Rio grande do Sul Amer. auſtr.* Sello.

Ad C. *rugoſum* W. (C. reniformis Roxb.)

Ad C. *Pedem Caprae.* (C. bilobatus Roxb.)

pag. 610.

Poſt n. 285. *Rheedii* Wallich. 350. C. foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis, pedunculis ſub-3floris folia aequantibus, laciniis calycis exterioribus cordatis ſcarioſis interiores occultantibus. *Nepal. Ind. or.* (Ben-tirn-tali Rheed. mal. 2. t. 54.)

caeſpitoſus Roxb. 351. C. foliis lineari-lanceolatis glabris, pedunculis petiolos ſuperantibus bracteatis 1-4floris, calycibus glabris margine calloſis. *Ind. or.*

pag. 614.

Ad *Poranam racemoſam* Jacqu. adde patriam: *Ind. or. Nepal.*

grandiflora Wall. 5. P. volubilis piloſa, foliis cordato-ovatis acuminatis 7nerviis, racemis axillaribus paucifloris, corolla calycem multo ſuperante. *Nepal.*

pag. 615.

Ad *Nierembergiam pubeſcentem* * (N. viſcidula Kunth., graveolens Hilar.)

Ad Fabianam R. et P.

thymifolia Hilar. 2. F. ſuffruticoſa glanduloſo-pubeſcens, foliis ſparſis linearibus obtuſiusculis enerviis, floribus axillaribus ſolitariis pedunculatis nutantibus. *Rio grande Amer. auſtr.*

pag. 616.

Ad Nicotianam.

Poſt n. 7. *plumbaginifolia* W. 18. N. caule herbaceo diffuſe ramoſo tuberculato-aſpero, foliis ſeſſilibus, inferioribus obovatis, ſuperioribus ſemiamplexicaulibus lanceolatis undulatis, corollae tubo longiſſimo, limbo acutiusculo. *Rio grande.* (N. acutifolia Hilar.)

pag. 617.

Poſt n. 18. *nana* Lindl. 19. N. acaulis humillima, foliis lanceolatis integerrimis piloſis, pedunculis ſolitariis

axillaribus 1floris abbreviatis, calyce inflato viſcidulo tubum corollae aequante, limbo corollae obſolete 5lobo, lobis acutiusculis. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.* Bot. reg. 833.

Poſt *Lehmanniam:*

SIBTHORPIA.

retuſa Kunth. 1. S. foliis cordato-reniformibus lobatis, lobis retuſis, floribus 5andris. *Nov. Hiſpania.* Syſt. 2. p. 815.

europaea 2. S. foliis peltatis cordato-reniformibus lobato-crenatis, floribus 4andris. *Anglia. Luſitania.* Syſt. 2. p. 815.

pichinchenſis Kunth. 3. S. foliis cordatis ſub-7lobis, floribus 5andris. *Alp. Quito.* Syſt. 2. p. 815.

peregrina 4. S. foliis reniformibus orbiculatis crenatis, floribus 7andris. *Mauritania. Madera.* (Disandra proſtrata L. Syſt. 2. p. 166.)

pag. 618.

Ad Verbaſcum.

V. *thapſiforme* et *cuſpidatum* Schrad. ſpecie congruunt. Sed V. *nemoroſum* et *auſtrale* Schrad. potius varr. *phlomoidis* L.

Poſt n. 5. *candidiſſimum* Cand. 49. V. foliis oblongis utrinque attenuatis crenatis denſiſſime candide floccoſo-tomentoſis, inferioribus petiolatis, ſuperioribus decurrentibus, floribus remote verticillato-ſpicatis. *Ager monspel.*

pag. 619.

Ad V. *Lychnitidem*, V. *Weldenii* Morett. var.

pag. 621.

De V. *cisalpino* Birol., var. V. *phoenicei*, cf. Colla in act. acad. taurin. vol. 26. p. 507.

pag. 623.

Ad Cryptandram Sm.

auſtralis Sm. 2. Cr. foliis faſciculatis petiolatis lineari-filiformibus ramisque ſcabris, floribus capitatis extus ſetoſo-plumoſis. *Nov. Holl.* Sieb. n. 66.

amara Sm. 3. Cr. foliis confertis alternis minutis ſpathulato-ellipticis ſubſeſſilibus, floribus faſciculatis extus incanis. *Nov. Holl.* Sieb. n. 67.

obovata Sieb. 4. Cr. foliis ſparſis obovato-ſpathulatis petiolatis glabriusculis, ramis ſetoſo-ramentoſis, floribus aggregatis glabris. *Nov. Holl.* Sieb. n. 129.

ſpineſcens Sieb. 5. Cr. foliis confertis obovatis glabris, ramulis ſetoſis ſpineſcentibus, floribus ſubſolitariis incano-pubeſcentibus. *Nov. Holl.* Sieb. n. 68.

pag. 625.

Ad Cantuam Juſſ.

megapotamica *8. C. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis integerrimis ſupra nitidis, paniculis axillaribus. *Rio grande.* Sello.

pag. 626.

Ad Cobaeam Cav.

lutea Don. 2. C. foliolis oblongis acutis, laciniis calycis lineari-lanceolatis mucronatis, ſtaminibus longe exſertis. *Guayaquil.*

pag. 629.

Ad Epacrin Forſt.

ruſcifolia R. Br. 22. E. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis petiolatis, ramulis hirſutis, floribus ſparſis pendulis, tubo corollae calycem his ſuperante. *Nov. Holl.*

ſparſa R. Br. 23. E. foliis oblongo-lanceolatis mucronatis petiolatis eveniis, floribus ſparſis nutantibus, tubo corollae calycem acutum ſubaequante. *Nov. Holl.*

rivularis Sieb. 24. E. foliis ſubſeſſilibus ovatis acuminatis reflexo-patentibus, calycibus acutis corollam ſubaequantibus. *Nov. Holl.*

rigida Sieb. 25. E foliis ovato-oblongis obtuſiusculis ſubſeſſilibus cartilagineis ſubtus carinatis patulis, calycibus obtuſis tubum corollae aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 630.

Ad Lyſinema R. Br.

L. *pungens* R. Br. habet folia amplexicaulia. Proximum eſt:

ruſcifolium Sieb. 6. L. foliis ſemiamplexicaulibus ovato-oblongis cuſpidatis ciliatis laevibus, calyce ſubulato tubum corollae aequante. *Nov. Holl.*

L. *pentapetalum* R. Br. habet folia 3gona obtuſa glabra.

pag. 631.

Ad Echitem.

E. *longiflora* Desf. habet caulem erectum, non ſarmentoſum. Proximae ſunt *ſuffruticoſae erectae, corollae longiſſimae tomentoſae limbo criſpato:*

petraea Hilar. 53. E. foliis cordato-lincaribus acutis undulatis revolutis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis axillaribus. *Ad fl. Platam.*

Velame Hilar. 54. E. foliis ovato-oblongis cuſpidatis lanatis. *Braſil.* (E. guaranitica Hilar.)

cirefcens Hilar. 55. E. hirſuta, foliis ovato-oblongis acutis ſubtus tomentoſis. *Braſil.*

piniſolia Hilar. 56. E. hiſpida, foliis quaternis linearibus revolutis ſubtus incano-tomentoſis. *Braſil.*

pag.

pag. 633.

Poſt n. 39. *nutans* Anderſ. 57. E. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus rubro-venoſis villoſis, pedunculis nutantibus, corollae laciniis obtuſis criſpatis. *Inſ. Carib.* Bot. mag. 2473.

pag. 634.

Deleatur E. *grandiflora* Roxb.

pag. 635.

Ad Vallarim R. Br.

† *controverſa* * 8. V. caule volubili, foliis cordatis acuminatis 5nerviis, corymbis axillaribus ſubcapitatis. *Ind. or.* (Convolvulus binectariferus Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 47.)

Poſt *Ichnocarpum* R. Br.:

BEAUMONTIA Wallich.

grandiflora Wall. *Ind. or.* Frutex ſcandens, ramulis pubeſcentibus, foliis elliptico-oblongis mucronatis coriaceis glabris, floribus corymboſis amplis albis. (Echites grandiflora Roxb.) Bot. reg. 911.

pag. 636.

Ad Thenardiam Kunth.

ſcabra * 8. Th. foliis ovato-ellipticis undulatis ſubtus glauceſcentibus, cymis pedunculatis axillaribus 3fidis, corolla extus ſcabro-pubeſcente. *Nov. Caledon.* (Echites ſcabra Labill. nov. Caled. t. 31.)

Ad Alſtoniam R. Br.

Ad A. *ſcholarem* R. Br. (A. plumoſa Labill. nov. Caled. t. 32.)

neriifolia Wallich. 5. A. foliis verticillatis lanceolatis acuminatis parallele venoſis ſubtus villoſis, cymis terminalibus ſeſſilibus pubeſcentibus, fauce villoſa, limbi laciniis acutis tubo brevioribus. *Nepal.*

lucida Don. 6. A. foliis oppoſitis oblongis acuminatis glabris lucidis reticulatis, cymis terminalibus pedunculatis trichotomis, fauce barbata, limbi laciniis obtuſis tubum aequantibus. *Nepal.*

pag. 638.

Wrightia tinctoria R. Br. habet folia glaberrima. (Nerium tinctorium Roxb. non Rottl.)

Ad *Vincam majorem* L. V. media Delil., foliis laciniisque calycis haud ciliatis, ceterum non diverſa.

Ad *Tabernaemontanam macrophyllam* Poir. T. ceſtrifolia Nees. Mart. var.

pag. 642.

Ad *Cerberam Odallam* Hamilt. (Ochrosia elliptica Labill. nov. Cal. t. 30.)

pag. 645.

Ad Tournefortiam.

Post n. 27. *megapotamica* * 55. T. foliis oblongis obtusis glabris medio dentatis subtus flavicantibus, spicis axillaribus elongatis, calycibus verticillatis hirsutis. *Rio grande.* Sello.

viridiflora Wall. 56. T. foliis petiolatis ovatis acutis integerrimis subtus villosis, spicis compositis dichotomis recurvis. *Ind. orient.* (Heliotropium viridiflorum Lehm., Lithospermum Roxb.)

pag. 647.

Ad Beureriam Jacqu.

cestroides * 4. B. foliis oppositis lineari-lanceolatis integerrimis glabris, racemis paniculatis. *Amer. austr.* (Freylinia cestroides Coll.)

Ad Ehretiam.

Post n. 4. *pyrifolia* Don. 23. E. foliis ovatis acutis serratis glabris, floralibus oblongis, panicula terminali, floribus confertis. *Nepal.* (E. serrata Roxb.)

umbellulata Wallich. 24. E. arborea, foliis ovatis subretusis undulatis glaberrimis, umbellis sparsis pubescentibus, corolla subrotata, laciniis recurvis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 648.

Post n. 18. *macrophylla* Wallich. 25. E. arborea, ramis verrucosis, foliis ovato-oblongis argute serratis supra hispidulis subtus pubescentibus, panicula terminali. *Nepal.*

setosa Roxb. 26. E. foliis cordato-ovatis setoso-hispidis, spicis secundis recurvis dichotomis paniculatis. *Inf. ad Ind. orient.*

uniflora Roxb. 27. E. fruticosa, foliis subsessilibus oblongis integerrimis pilosis, floribus solitariis subsessilibus. *Inf. Molucc.*

pag. 650.

Ad Cordiam.

Post n. 16. *Muñeco* Kunth. 73. C. foliis cordato-elliptico-oblongis obtusiusculis remote dentatis supra strigillosis subtus fusco-villoso-tomentosis, cymis subaxillaribus subdichotomis divaricatis, floribus spicato-glomeratis, calycibus fusco-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.*

Post n. 20. *acuminata* Wallich. 74. C. arborea glaberrima, foliis ovato-oblongis acutis coriaceis integerrimis, co-

rymbis dichotomis ſubpubeſcentibus, laciniis calycis lanceolatis ciliatis tubo corollae breviori-bus. *Ind. or.*

pag. 655.

Styphelia triandra Andr. habet folia ſtriata cuſpidata.

St. *amplexicaulis* Rudg. — folia longe ciliata.

pag. 657.

Ad *Styphelium obovatam* Labill. (Cyathodes Tameiameiae Chamiſſ.) *Inſ. Sandwich.*

Poſt n. 43. *Cymbula* * 72. St. foliis petiolatis congeſtis lanceolatis concavis rufis, ſpicis axillaribus confertis erectis, bracteis ciliatis. *Nov. Caledon.* (Leucopogon Cymbulae Labill. nov. Caled. t. 39.)

pag. 658.

Poſt n. 46. *glauceſcens* Sieb. 73. St. foliis lanceolatis mucronatis integerrimis laevibus ſubtiliter ſtriatis glaucis, pedunculis abbreviatis ſtloris. *Nov. Holl.*

faſtigiata * 74. St. foliis lanceolatis cuſpidatis apice ſerrulatis erectis ſtriatis, calycibus axillaribus ſubſolitariis glaberrimis. *Nov. Holl.* (Leucopogon faſtigiatus Sieb.)

malaica * 75. St. foliis lanceolatis acutis integerrimis ſubtus glaucis punctatis, ſtipulis axillaribus erectis. *Peninſula Malacc.* (Leucopogon malayanus. Malayan miſcell. 1.)

Poſt n. 59. *denudata* * 76. St. foliis linearibus acutis erectis glabris integerrimis, floribus terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.* (Leucopogon denudatus Sieb.)

pag. 660.

Ad Nolanam.

paradoxa Lindl. 6. N. caule proſtrato foliisque ovatis obtuſis petiolatis hirſutis, limbo corollae 10lobo, nuculis cumulatis 1ſpermis. *Chili.* Bot. reg. 862.

pag. 662.

Ad Ardiſiam Sw.

A. *revoluta* Bonpl. (A. multiflora W. herb.)

Poſt n. 14. *propinqua* Kunth. 25. A. ramulis teretiusculis verrucoſis, foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris obſolete glanduloſo-punctatis, racemis terminalibus ſolitariis ſimplicibus, fructibus pedicellatis. *Ad Orinocum.*

ceſtrifolia Kunth. 26. A. ramis ſubangulatis, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis membranaceis glabris epunctatis, paniculis axillaribus terminalibusque ſeſſilibus, floribus racemoſis 4-5andris. *Alp. nov. Granat.*

durifolia Kunth. 27. A. ramis teretibus, foliis obovato-oblongis obtusis integerrimis coriaceis glabris subtus corymbisque terminalibus lepidotis, floribus 5andris. *Alp. nov. Granat.*

glandulosa Roxb. 28. A. foliis lanceolatis margine coloratis glandulosis glabris, umbellis terminalibus globosis longe pedunculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pauciflora Heyn. 29. A. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis lateralibus filiformibus 2-3floris. *Ind. or.*

anceps Wallich. 30. A. ramis scandentibus ancipitibus, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis subtus reticulato-venosis, paniculis terminalibus, pedunculis complanatis glabris. *Silhet, provinc. Ind. or.*

complanata Wallich. 31. A. ramis subscandentibus teretibus, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis subtus reticulato-venosis, paniculae ramis flexuoso-divaricatis complanatis villosis. *Inf. freti Malacc.*

tuberculata Wallich. 32. A. ramis compressis, foliis obovato-oblongis integerrimis coriaceis nitidis glandulosо-punctatis, racemis paniculatis foliosis, ramis teretibus tuberculosis. *Ind. or.*

Post n. 18. *punctata* Lindl. 33. A. foliis lanceolatis basi attenuatis coriaceis glandulosо-subcrenatis glabris, umbellis pedunculatis axillaribus pubescentibus, floribus cernuis punctatis. *China. Nepal.* Bot. reg. 827. (A. macrocarpa Wallich.) A. pedunculosa Wall. var.

villosa Roxb. 34. A. foliis lanceolatis crenulatis subtus ramisque villosis, umbellis terminalibus composítis villosissimis. *Inf. freti Malacc.*

hymenandra Wallich. 35. A. foliis obovatis acutis grosse crenatis glabris subtus reticulato-venosis, corymbis lateralibus foliatis, laciniis corollae acuminatis elongatis, antheris alatis apice caudatis in tubum coalitis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 663.

Ad Myrsinem.

† *Potama* Don. 27. M. foliis ellipticis mucronulatis serrulatis glabris nitidis, petiolis ramulisque pubescentibus, umbellis sessilibus, floribus 4fidis dioecis. *Nepal.* (M. bifaria Wallich.)

† *sessilis* Don. 28. M. foliis oblongis acuminatis nitidis apice denticulatis, umbellis sessilibus, floribus ♀ 4fidis, stigmate 2lobo. *Nepal.*

† *subspinosa* Don. 29. M. foliis lanceolatis acuminatis rigidis glabris spinuloso-serrulatis, umbellis sessilibus pubescentibus, floribus dioecis. *Nepal.*

semiserrata Wallich. 30. M. arborea, foliis confertis lanceolatis attenuatis antice argute serratis resinoso-punctatis, fasciculis pedunculatis, stigmate dimidiato laciniato-fimbriato. *Nepal.*

capitellata Wallich. 31. M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis, capitulis axillaribus ſeſſilibus, ſtigmate ſubintegro. *Nepal.*

pachysandra Wallich. 32. M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, faſciculis axillaribus aggregatis glandulofis, antheris triangularibus craſſis. *Inſ. freti Malacc.*

aurantiaca Wallich. 33. M. fruticoſa ſcandens glabra, foliis ovato-lanceolatis acutis integerrimis coriaceis ſupra nitidis, racemis axillaribus petiolos aequantibus, filamentis longiſſimis. *Ind. or.*

pag. 664.

Poſt *Myrſinem:*

EMBELIA Burm. Don.

floribunda Wallich. 1. E. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, racemis compoſitis, corollis revolutis glandulofo-pubeſcentibus. *Nepal.* (E. eſculenta Don.)

Nagaſhia Don. 2. E. foliis ellipticis crenulatis, racemis ſimplicibus, corollis concavis glabris. *Nepal.* (Myrſine undulata Wallich.?)

Ribes Burm. 3. E. fruticoſa ſcandens, foliis alternis petiolatis oblongis obtuſis, racemis paniculatis terminalibus hirſutis, corollis concavis piloſis. *Ind. or.* N. L. Burm. fl. ind. t. 23.

robuſta Roxb. 4. E. arborea, foliis ovali-oblongis integerrimis glabris, racemis axillaribus ſolitariis, corollis patulo-reflexis villoſis. *Ind. or.*

veſtita Roxb. 5. E. fruticoſa ſcandens, foliis oblongo-lanceolatis ſubſerrulatis, racemis axillaribus. *Ind. orient.*

villoſa Wallich. 6. E. fruticoſa ſcandens, ramis calloſo-maculatis villoſis, foliis ovato-oblongis utrinque attenuatis ſubtus piloſiusculis, racemis axillaribus faſciculatis. *Ind. or.*

nutans Wallich. 7. E. fruticoſa, ramis pendulis, foliis ſubbifariam approximatis lanceolatis acuminatis undulatis nitidis, racemis axillaribus abbreviatis faſciculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

caneſcens Jack. 8. E. fruticoſa ſcandens villoſa, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis ſubtus piloſiusculis, petiolis ſulcatis margine glandulofo-criſpatis, racemis paniculatis hirſutis, corollis villoſis. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 665.

Poſt *Bumeliam:*

HUNTERIA Roxb.

corymboſa Roxb. *Inſ. freti Malacc.* Arbor, foliis oppoſitis oblongis integerrimis glabris, corymbis terminalibus, floribus albis.

pag. 666.

Ad Sideroxylon.

Poſt n. 9. *grandifolium* Wallich. 10. S. foliis obovato-ellipticis coriaceis glabris integerrimis, pedunculis axillaribus confertis pubeſcentibus baſi ſquamatis, laciniis corollae obtuſis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 667.

Ad Chryſophyllum.

Poſt n. 14. *acuminatum* Roxb. 15. Chr. foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris recurvis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 669.

Ad Paederiam.

recurva Roxb. 6. P. erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis, corymbis terminalibus recurvis brachiatis villoſis. *Ind. or.*

Roxburghii * 7. P. erecta, foliis ſubſeſſilibus oblongis integerrimis glabris parallele venoſis, paniculis e dichotomia erectis. *Silhet, prov. Ind. or.* (P. erecta Roxb.)

ternata Wallich. 8. P. erecta, ramis trichotomis, foliis ternatis oblongo-lanceolatis integerrimis ſupra nitidis, pedunculis corymbiferis ramulisque triangularibus. *Ind. or.*

pag. 670.

Ad Leeam.

robuſta Roxb. Blum. 6. L. caule tereti 1ſulcato glabro, foliis bipinnatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus ſcabris, foliolis infimis ternatis. *Java. Ind. or.*

rubra Blum. 7. L. caule tereti ſulcato, foliis 2pinnatis ad venas ſubtus aſperis, foliolis infimis ternatis ovato-lanceolatis obtuſe ſerratis. *Java.*

javanica Blum. 8. L. caule tereti punctato ſcabro, foliis 2pinnatis glabris argute ſerratis. *Java.*

aculeata Blum. 9. L. caule teretiusculo ſulcato aculeato, foliis pinnatis glaberrimis groſſe ſerratis. *Java.*

Staphylea Roxb. 10. L. ramis teretibus, foliis ſupradecompoſitis glabris, foliolis lineari-oblongis acuminatis ſerrulatis. *Ind. or.* (Aquilicia Otillis Gärtn.)

integrifolia Roxb. 11. L. foliis ſupradecompoſitis ſubtus pubeſcentibus, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis. *Ind. or.*

Ad L. *aequatam.* (L. hirſuta Blum.)

pag. 671.

Ad Cariſſam.

C. *ovata* R. Br. (C. diffuſa Roxb.)

C. *hirſuta* Roth. (C. villoſa Roxb.)

axillaris Roxb. 10. C. ſpinis oppoſitis recurvis, foliis oblongis, corymbis multifloris. *Inſ. Molucc.*

pag. 672.

Ad Willughbeiam Scop.

Poſt n. 2. *volubilis* * 5. W. caule ſcandente, foliis obovatis acutis petiolatis, racemis terminalibus laxis compoſitis. *Sumatra.* (Fagraea volubilis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 36.)

racemoſa * 6. W. caule (?) erecto, foliis breviter petiolatis ovalibus utrinque rotundatis, racemis terminalibus, floribus faſciculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Fagraea racemoſa Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 38.)

auriculata * 7. W. caule (?) arboreo, foliis confertis elliptico-oblongis utrinque attenuatis coriaceis glabris, ſtipulis 2lobis, floribus axillaribus pedunculatis. *Sumatra.* (Fagraea auriculata Jack. in Roxb. fl. ind. 2. p. 34.)

obovata * 8. W. caule arboreo, foliis petiolatis obovatis carnoſis, pedunculis terminalibus 3floris. *Silhet, prov. Ind. orient.* (Fagraea obovata Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 33.)

† *elliptica* * 9. W. foliis ellipticis glabris coriaceis, paniculis corymboſis terminalibus. *Inſ. Molucc.* (Fagraea elliptica Roxb. fl. ind. 2. p. 32.)

fragrans * 10. W. caule arboreo, foliis lanceolatis obtuſiusculis glaberrimis, corymbis axillaribus, ſtaminibus aſcendentibus. *Inſ. freti Malacc.* (Fagraea fragrans Roxb. l. c.)

Ad Strychnon.

bicirroſa Leſchen. 12. Str. caule ſcandente, cirris 2fidis oppoſitifoliis, foliis oblongis cuſpidatis triplinerviis, fructibus 1ſpermis. *Ind. or.* Roxb. fl. ind. 2. p. 267.

pag. 675.

Ad Ceſtrum.

Poſt n. 35. *pendulinum* Jacqu. 39. C. ramis pendulis, foliis ovato-oblongis acuminatis membranaceis reticulato-venoſis ſubtus pubeſcentibus, floribus terminalibus ſeſſilibus aggregatis, laciniis corollae obtuſis inflexis. *Nov. Granat.*

pag. 679.

Ad Solanum.

Poſt n. 35. *Gilo* Tin. 275. S. foliis ovato-oblongis baſi cuneatis angulato-dentatis utrinque floccoſo-tomentoſis, pedunculis geminis 1floris. *Patria?*

pag. 681.

Poſt n. 56. *Pſeudochina* Hilar. 276. S. arboreum, foliis lanceolatis acutis ſupra glabris, axillis venarum ſubtus

barbatis, racemis extraxillaribus paucifloris divaricatis, calycibus glabris. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 21.

Poſt n. 60. *ſpirale* Roxb. 277. S. foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis glabris, racemis lateralibus, novellis ſpiralibus, laciniis calycis glandulofis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 686.

Ad S. *biflorum* Lour. (S. 10dentatum Roxb., lyſimachioides Wallich.) *Ind. or. Nepal.*

pachypetalon * 278. S. foliis oblongis repandis decurrentibus villoſis, faſciculis axillaribus, corolla glabra carnoſa. *Nepal.* (S. craſſipetalum Wallich.)

Poſt n. 139. *erianthon* Don. 279. S. fruticoſum, foliis ovato-oblongis acutis integerrimis utrinque ramisque ſtellato-tomentoſis, corymbis terminalibus lanatis, corolla campanulata. *Nepal.*

pag. 688.

S. *agreſte* Roth. (S. diffuſum Roxb.)

pag. 689.

Poſt n. 179. *platanifolium* Sims. 280. S. foliis 5lobis utrinque ſubtomentoſis, lobis acutis inciſo-dentatis, umbellis extraxillaribus nutantibus, fructibus variegatis. *Amer. auſtr.* Bot. mag. 2618.

pag. 691.

quadriloculare * 281. S. foliis cordato-ovatis angulato-lobatis ſubtus ſtellato-tomentoſis, aculeis caulinis confertis erectis, umbellis oppoſitifoliis paucifloris, calyce inermi, baccis hirſutis 4locularibus. *Ind. or.* (S. hirſutum Roxb.)

pag. 693.

Ad S. *bonarienſe.* S. guaraniticum Hilar. var.

pag. 694.

S. *eſculentum* Dun. (S. longum Roxb.)

pag. 696.

S. *giganteum* Jacqu. (S. farinoſum Wall.) *Ind. orient.*

pag. 698.

Ad Phyſalida.

Poſt n. 19. *divaricata* Don. 22. Ph. ramis divaricatis angulatis pubeſcentibus, foliis petiolatis ovatis acutis ſubintegerrimis, floribus ſolitariis axillaribus folio brevioribus. *Nepal.*

Ph. *chenopodifolia* Lam. (Ph. ſtramonifolia Wallich.)

pag. 702.

Ad Spermadictyon Roxb.

ſcabrum * 2. Sp. foliis ovato-lanceolatis utrinque ſcabris, laciniis calycis linearibus. *Nepal.* (Hamiltonia ſcabra Don.) Sp. ſuaveolens Roxb. habet lacinias calycis ſetaceas glanduliferas.

piloſum * 3. Sp. foliis lanceolatis integerrimis petiolatis ramisque hirſutis, faſciculis axillaribus bracteatis hirſutiſſimis. *Inſ. Molucc.* (Hamiltonia piloſa Roxb.)

pag. 703.

Ad Macrocnemum.

Poſt n. 8. *ſtipulaceum* Roxb. 9. M. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis glabris, ſtipulis ovalibus, paniculis terminalibus corymboſis. *Inſ. Molucc.*

parviflorum Roxb. 10. M. foliis ſubpetiolatis lanceolatis glabris, ſtipulis annularibus truncatis, pedunculis axillaribus multifloris. *Inſ. Molucc.*

pag. 704.

Ad Cinchonam.

thyrſiflora Roxb. 16. C. foliis petiolatis ovatis pubeſcentibus, ſtipulis oblongis glanduloſo-fimbriatis, panicula thyrſoidea nutante, calycibus villoſis. *Bengal.*

flaccida * 17. C. foliis ovato-ellipticis acuminatis coriaceis nitidis, ſtipulis ſpathulatis, racemis axillaribus pendulis. *Ind. or.* (Hymenodictyon flaccidum Wallich.)

obovata * 18. C. foliis obovatis acutis glabris ſubtus reticulatis, ſtipulis ovatis glanduloſo-ciliatis, racemis axillaribus erectis. *Ind. or.* (Hymenodictyon obovatum Wallich.)

pag. 706.

Ad Muſſaendam.

cubenſis * 8. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſupra nitidis, coſta media ſubtus hirſutiuscula, paniculae foliatae ramis trichotomis apice incraſſatis, bractea longe ſtipitata ſubrotunda. *Cuba.* (Bractearia duriſſima Pöppig.)

corymboſa Roxb. 9. M. foliis oblongis acutis integerrimis utrinque laevibus, corymbo terminali compoſito, bracteis longe petiolatis ovalibus acutis 5-7nerviis. *Ind. orient.*

macrophylla Wallich. 10. M. foliis ovatis acuminatis pubeſcentibus, corymbis terminalibus trichotomis hirſutis, bracteis petiolatis late ovatis 7nerviis villoſis. *Nepal.*

incana Wall. 11. M. foliis ovato-oblongis acuminatis utrinque villoſis ſubtus albidis, corymbo terminali faſciculato paucifloro, bracteis petiolatis ſubcordatis 5nerviis corollisque pubeſcentibus. *Nepal.*

Poſt *Danain:*

HYMENOPOGON Wall.

paraſiticus Wallich. Frutex paraſiticus in arboribus *Ind. or.*, foliis oppoſitis acuminatis villoſis, corymbis trichotomis.

LECANANTHUS Jack.

crubeſcens Jack. *Sumatra. Peninſ. Malacc.* Frutex 4angulus ramoſus, foliis ovato-lanceolatis glabris, ſtipulis ligulatis, capitulis involucratis.

PSILOBIUM Jack.

nutans Jack. *Sumatra.* Frutex erectus 4gonus, foliis lanceolatis acutis glabris, ſtipulis ovatis acuminatis, pedunculis nutantibus axillaribus 3-6floris. Altera ſpecies Pſ. *tomentoſum* Jack. nondum ſatis eſt definita. Malayan miſcell. 2.

pag. 707.

Ad Rondeletiam.

R. *ſtricta* Roth. (Macrocnemum ſtrictum Roxb. in Rees cyclop., Randia ſtricta Roxb. fl. ind. 2. p. 145.)

byrſophylla * 22. R. foliis lanceolatis acuminatis nitidis ramulisque glaberrimis, panicula pyramidata, dentibus corollae abbreviatis. *Nepal.* (R. coriacea Wall.)

paniculata Roxb. 23. R. arborea, foliis ſubſeſſilibus oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus villoſiusculis, ſtipulis ſubrotundis recurvatis, paniculae ramis brachiatis, pedicellis calycibusque villoſis. *Inſ. Molucc.*

tinctoria Roxb. 24. R. arboreſcens, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis glabris, ſtipulis 3angularibus cuſpidatis, paniculae ramis decuſſatis, floribus ternis. *Bengal.*

tetrandra Roxb. 25. R. fruticoſa, foliis ſeſſilibus lanceolatis glabris, ſtipulis pinnatifidis, floribus axillaribus glomeratis 4andris. *Inſ. freti Malacc.*

ſcandens Roxb. 26. R. fruticoſa ſcandens glabra, foliis petiolatis oblongis integerrimis, paniculis axillaribus brachiatis. *Inſ. Maſcaren.*

pendula Wallich. 27. R. fruticoſa, ramis pendulis 4angulis, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſupra glabris ſubtus ſcabriusculis, corymbis terminalibus paniculatis. *Ind. or.*

pag. 708.

Poſt n. 12. *longifolia* Wallich. 28. R. foliis lanceolatis acuminatis ſupra piloſis ſubtus ramulisque tomentoſis, panicula divaricata, dentibus calycis obtuſis. *Ind. or.*

proxima Don. 29. R. foliis oblongis acuminatis ſubtus ramulisque tomentoſis, panicula hirſutiſſima, dentibus calycis obtuſis. *Ind. or.*

cinerea Wallich. 30. R. arborea, ramis 4angulis, foliis lanceolatis ſupra villoſis ſubtus tomentoſis, ſtipulis oblongis recurvis, paniculis ſupradecompoſitis, floribus faſciculatis. *Nepal.*

ſpicata Wallich. 31. R. foliis ellipticis acuminatis ſubtus villoſis, ſtipulis acutis deciduis, panicula villoſa, floribus ſpicatis 4andris. *Inſ. freti Malacc.*

Poſt *Bertieram* Aubl.:

OPHIORRHIZA.

ſubumbellata Forſt. 1. O. fruticoſa, foliis lanceolatis acutis, umbellis axillaribus 3fidis. *Inſ. Societ.*

Mungos 2. O. herbacea, foliis ovato-lanceolatis laevibus, ſpicis corymboſis, laciniis calycis ovatis. *Ind. or.*

faſcicularis Don. 3. O. herbacea erecta ramoſa, foliis oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, floribus terminalibus faſciculatis, laciniis calycis ovatis. *Nepal.*

proſtrata Don. 4. O. herbacea proſtrata radicans, foliis ovato-oblongis pubeſcentibus, ſpicis corymboſis, laciniis calycis oblongis. *Ind. or. Nepal.*

rugoſa Wall. 5. O. herbacea villoſa, foliis lanceolatis rugoſis ſupra ſcabris, laciniis calycis minutis ſubulatis. *Nepal.*

heterophylla Jack. 6. O. herbacea tomentoſa, foliis ſubrotundo-ovatis ſubtus albidis, altero minuto, floribus cymoſis. *Sumatra.* Malayan miſc. 2. n. 7. 85.

tomentoſa Jack. 7. O. herbacea denſe villoſa, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis. *Sumatra.*

pag. 710.

Ad Lobeliam.

Poſt n. 22. *arguta* Lindl. 151. L. foliis lineari-lanceolatis ſerrulatis glaberrimis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus, calycibus glabris. *Chili.* Bot. reg. 973.

pag. 711.

Poſt n. 36. *megapotamica* * 152. L. caule erecto ramoſo foliisque linearibus anguſtiſſimis erecto-patulis glabris, floribus terminalibus corymboſis. *Rio grande.* Sello.

Poſt n. 40. *Senecionis* * 153. L. foliis omnibus ſeſſilibus pinnatifidis piloſiusculis, laciniis inaequalibus linearibus ſubdentatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris, corolla ſubregulari. *Nov. Holl.* (Iſotoma axillaris Lindl. in bot. reg. 964.)

pag. 713.

Poſt n. 64. *excelſa* Leſchen. 154. L. foliis petiolatis oblongo-lanceolatis denticulatis denſe villoſis, racemis terminalibus denſifloris bracteatis, laciniis calycis linearibus tubum aequantibus. *Ind. orient.* Roxb. fl. ind. 2. p. 114.

pag. 714.

Ad Lobeliam.

Poſt n. 75. *trialata* Hamilt. 155. L. caule erecto exacte triquetro glabro, foliis ſubrotundis repando-dentatis ſubpetiolatis, pedunculis 1floris folio longioribus, capſula obovata. *Nepal.* (L. micrantha Hook.)

pag. 715.

Ad L. *ſtipularem* Roth. (L. trigona Roxb.)

pag. 716.

Ad *Lobeliam irriguam* R. Br. forte *Pratia repens* Gaudich. ex *Inſ. Falkland.*

pag. 717.

Poſt n. 115. *roſea* Wallich. 156. L. caule erecto villoſo glaucescente, foliis lanceolato-enſiformibus acuminatis denticulatis, racemis terminalibus paniculatis, pedicellis nutantibus ſecundis bracteatis. *Nepal.*

Deleatur L. *micrantha* Hook.

pag. 719.

Ad *Lyſipoma reniforme* Kunth. (Viola algida W. herb.)

pag. 720.

Ad Goodeniam Sm.

Poſt n. 5. *armerifolia* Sieb. 34. G. caule ſtricto glabro paucifolio, foliis linearibus abbreviatis integerrimis, calycibus breviter pedunculatis villoſis, corollis barbatis. *Nov. Holl.*

Poſt n. 11. †*pubeſcens* Sieb. 35. G. foliis obovatis inciſo-dentatis glabriusculis, ramulis pubeſcentibus, floribus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.*

pag. 724.

Ad Phyteuma.

Ad Ph. *Sieberii* * (Ph. ſerratum Viv.) *Corſica.*

Poſt n. 17. *begoniſolium* Roxb. 25. Ph. caule repente dichotomo villoſo, foliis alternis petiolatis ſemicordatis ſpinuloſo-ſerratis ſubtus villoſiusculis, racemis axillaribus ſecundis ſubſpicatis. *Inſ. freti Malacc.* Jack in Malayan miſcell. 1, 5.

pag. 725.

Ad Campanulam.

Poſt n. 6. *ariſtata* Wallich. 172. C. caule filiformi ſimpliciſſimo, foliis ſeſſilibus linearibus glanduloſo-denticulatis, flore ſolitario erecto, laciniis calycis ſubulatis corollam ſuperantibus. *Ind. or.*

pag. 726.

Campanulae Scheuchzeri Vill. var. C. carnica Schied., linifolia Scop.

Poſt n. 15. *lancifolia* Roxb. 173. C. caule ſimplici ſub-3floro, foliis petiolatis lanceolatis ſerratis, floribus nutantibus, laciniis calycis lanceolatis inciſis. *Ind. or.*

pag. 729.

Poſt n. 53. *Morettiana* Reichenb. 174. C. foliis cordato-ovatis crenatis, caule filiformi, flore erecto. *Italia ſuper.* (C. filiformis Morett.)

Poſt n. 58. *integerrima* Hamilt. 175. C. caule erecto ramoſo foliisque ſeſſilibus linearibus acutis elongatis integerrimis hiſpidis, laciniis calycis linearibus rectis corollam ſubaequantibus. *Nepal.* C. agreſtis Wallich. var.

pag. 730.

Ad C. *rapunculoidem.* (C. infundibuliformis Bot. mag. 2632.)

Poſt n. 68. *ramuloſa* Wallich. 176. C. caule ramoſo, foliis lanceolatis ſinuato-dentatis utrinque hirſutis, pedunculis nutantibus paniculatis bracteatis, laciniis calycis 3angularibus dentatis corolla brevioribus. *Nepal.*

cana Wallich. 177. C. caule ramoſo foliisque confertis lanceolatis dentatis utrinque incano-villoſo-tomentoſis, floribus racemoſis, laciniis calycis lanceolatis dentatis corolla brevioribus. *Nepal.*

colorata Wallich. 178. C. caule erecto foliisque lanceolatis acutis crenato-repandis incano-villoſis, pedunculis elongatis, laciniis calycis 3angularibus integerrimis corolla brevioribus. *Ind. or.*

pag. 732.

Poſt n. 86. *fulgens* Wallich. 179. C. caule ſimplici foliisque breviter petiolatis lanceolatis acutis cuſpidato-ſerratis utrinque hirſutis, floribus faſciculato-racemoſis bracteatis, laciniis calycis linearibus corollam aequantibus. *Nepal.*

pag. 734.

Poſt n. 118. *iſophylla* Morett. 180. C. foliis cordato-reniformibus dentatis glabris, floribus corymboſis, corolla ſubrotata. *Italia ſuper.*

pag. 735.

Poſt n. 136. *Fiſcheriana* * 181. C. foliis radicalibus cordatis ſerratis, caulinis lanceolato-linearibus ſubintegerrimis, floribus paniculatis pendulis, laciniis calycis reflexis integerrimis. *Sibir.* (Adenophora coronopifolia Fiſch.)

thalictrifolia * 182. C. caule baſi ſurculoſo foliisque parvis orbiculatis integerrimis piloſis, pedunculis 1floris glau-

dulofo-pilofis cernuis, capfula 5loculari. *Emodi montes.* (Codonopfis ? thalictrifolia Wallich., Glofocomia tenera Don.)

Poft n. 141. *ovata* * 183. C. caule erecto ramofo glabro, foliis petiolatis ovatis acutis repando-dentatis pubefcentibus, pedunculis axillaribus erectis, laciniis calycis lanceolatis acutis. *Nepal.* (Wahlenbergia ovata Don.)

pag. 736.

Poft n. 145. *viridis* * 184. C. caule fcandente ramofo, foliis cordato-oblongis acuminatis obfolete crenatis fubtus glaucis villofis, pedunculis nutantibus, laciniis calycis linearibus denticulatis recurvis, corolla virefcente intus purpureo-maculata. *Nepal.* (Codonopfis viridis Wallich. in Roxb. fl. ind. 2. p. 103.)

purpurea * 185. C. caule erecto ramofo foliisque oppofitis ovato-oblongis fubintegerrimis fubtus glaucis glaberrimis, floribus erectis, laciniis calycis 3angularibus patulis. *Nepal.* (Codonopfis purpurea Wallich. l. c. p. 105.)

pag. 737.

Poft n. 160. *carnofa* Wallich. 186. C. caule procumbente, foliis ovatis argute ferratis pellucido-punctatis carnofis glaberrimis, pedunculis axillaribus capillaribus, corolla fubbilabiata, filamentis planiusculis bafi aequalibus. *Nepal.*

pag. 738.

Ad *Schöpfiam* Schreb.

fragrans Wallich. 2. Sch. foliis alternis ellipticis integerrimis glabris, racemis axlliaribus multifloris. *Nepal.*

pag. 741.

Ad *Pfychotriam.*

Poft n. 12. *noxia* Hilar. 96. Pf. fruticofa, ramis bifariam pubefcentibus, foliis breviffime petiolatis lanceolatis acuminatis glaberrimis, ftipulis 2partitis, floribus fafciculatis terminalibus. *Brafil.*

pag. 742.

Poft n. 33. *fphaerocarpa* Wallich. 97. Pf. foliis ovato-ellipticis acutis coriaceis glabris fubtus parallele venofis, ftipulis 2fidis, corymbis terminalibus compactis, fructibus fphaericis glabris ecoftatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

truncata Wallich. 98. Pf. foliis ovato-ellipticis utrinque attenuatis coriaceis glabris fubtus parallele venofis, corymbi terminalis ramulis carnofis bracteatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*

connata Wallich. 99. Pf. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis acuminatis coriaceis glabris, ſtipulis ovatis acutis, corymbis terminalibus trichotomis, bracteis connatis infundibuliformibus ſublobatis, floribus ſeſſilibus ternatis, calycibus truncatis. *Ind. or.*

adenophylla Wallich. 100. Pf. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus parallele venoſis, axillis venarum glandulofis, ſtipulis ovatis obtuſis, racemis terminalibus cylindricis. *Silhet, prov. Ind. or.*

curviflora Wallich. 101. Pf. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis membranaceis longe petiolatis, ſtipulis ovatis obtuſis, racemis terminalibus compactis, limbo corollae incurvo. *Inſ. freti Malacc.*

ophioxyloides Wallich. 102. Pf. caule fruticoſo ſcandente dichotomo, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, ſtipulis ovatis acuminatis, corymbo terminali, limbo corollae incurvo. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 744.

Pf. *hirſuta* Sw. Ad hanc ut varietas accedit: Pf. *loniceroides* Sieb. *Nov. Holl.*

Pf. *aſiatica.* (Pf. collina Labill. nov. Caledon. t. 47.)

pag. 745.

Poſt n. 66. *Wallichiana* * 103. Pf. foliis ovatis acuminatis ſerrulatis nervoſis glabris, paniculis terminalibus glomeratis, dentibus calycibus rotundatis. *Nepal.* (Pf. nervoſa Don.)

Poſt n. 70. *Marcgravii* * 104. Pf. foliis ovato-oblongis acuminatis venoſis, ſtipulis 3fidis, cymis pedunculatis croceis, corolla baſi gibba papilloſo-tomentoſa. *Braſil.* (Palicourea Hilar., Galvania 2. Velloz.)

ſtipulacea Wallich. 105. Pf. foliis ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis acuminatis nervoſis coriaceis glabris, ſtipulis triangularibus apice foliaceis, panicula terminali trichotoma, bracteis 3fidis. *Inſ. freti Malacc.*

Reeveſii Wallich. 106. Pf. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis laevibus glaucis, ſtipulis obtuſis appreſſis, panicula terminali ſubſeſſili, calycibus truncatis. *China.*

aurantiaca Wallich. 107. Pf. foliis lanceolatis acuminatis glabris ſupra lucidis ſubtus minute punctatis parallele venoſis, ſtipulis ovatis cuſpidatis, paniculae ramis verticillatis, floribus ternis, calycibus truncatis. *Inſ. freti Malacc.*

denticulata Wallich. 108. Pf. caule ſuffruticoſo baſi repente aſcendente, foliis ovatis acutis coriaceis ſubtus reticulatis, ſtipulis ovatis argute dentatis, panicula terminali cymoſa, dentibus calycis ſubulatis. *Nepal.*

pag. 747.

Bartlingia ſcoparia Reichenb. delenda reducitor ad *Plocamam pendulam* Ait. p. 760.

pag. 749.

Ad *Morindam.*

Poſt n. 2. *phillyreoides* Labill. 17. M. fruticoſa, foliis lanceolatis ſupra badiis ſubtus ſulfureis, ſtipulis ovatis acutis, capitulis globoſis axillaribus ſubſeſſilibus, floribus 4andris. *Nov. Caledon.*

tinctoria Roxb. 18. M. foliis ſubſeſſilibus oblongis utrinque glabris opacis, fructibus unitis. *Ind. or.*

exſerta Roxb. 19. M. foliis ovatis acutis nitidis, ſtaminibus exſertis. *Bengal.*

pag. 750.

Ad *Naucleam.*

Poſt n. 6. *undulata* Roxb. 12. N. arborea, ramis brachiatis, foliis petiolatis ovato-oblongis undulatis nitidis, ſtipulis ellipticis petiolos aequantibus, pedunculis terminalibus nutantibus. *Inſ. Molucc.*

macrophylla Roxb. 13. N. arborea procera, ramis decuſſatis, foliis amplexicaulibus elliptico-oblongis obtuſis baſi attenuatis ſubtus villoſiusculis, ſtipulis lanceolatis, pedunculis terminalibus ſolitariis, antheris ſeſſilibus. *Amboina. Ind. or.* (N. ſeſſilifolia Roxb.)

Cadamba Roxb. 14. N. arborea, ramis horizontalibus, foliis petiolatis ovatis glabris, ſtipulis 3angularibus, pedunculis terminalibus, laciniis calycis linearibus. *Ind. or.*

cordata Roxb. 15. N. arborea, ramis horizontalibus, foliis petiolatis cordato-ovatis obtuſis coriaceis glaberrimis, ſtipulis obovatis, pedunculis terminalibus ſolitariis, laciniis calycis clavatis carnoſis. *Ceylon.* (N. coadunata Sm. in Rees cyclop.)

glabra Roxb. 16. N. foliis ellipticis glabris, ſtipulis linearibus, pedunculis ternis, laciniis calycis 3angularibus. *Inſ. Molucc.*

rotundifolia Roxb. 17. N. foliis petiolatis ovalibus obtuſis, ſtipulis oblongis obtuſis multinerviis, pedunculis paniculatis, capſulis diſtinctis. *Ind. or.*

Poſt n. 7. *Adina* Sm. 18. N. ſuffruticoſa, foliis lanceolatis acuminatis glaberrimis, ſtipulis patulis 2fidis, capitulis globoſis folia ſubaequantibus, dentibus calycis obtuſis, ſtaminibus longe exſertis, fructu membranaceo. *China.* (Adina globiflora Salisb. parad. t. 115.) Bot. reg. 895.

adinoides Lindl. 19. N. fruticoſa, foliis ſpathulatis glabris, capitulis folia ſuperantibus, fructibus membranaceis. *China.*

pag. 751.

Poſt n. 8. *ovalifolia* * 20. N. foliis petiolatis obovatis glabris, pedunculis axillaribus terminalibusque compoſitis, receptaculo capſulisque villoſis. *Inſ. freti Malacc.* (Uncaria Roxb.)

Ad N. *longiflora* Poir. (Uncaria pedicellata Roxb., cirriflora Jack.?)

Poſt

Poſt n. 11. *ſeſſilis* * 21. N. cirris ſpiralibus, foliis oblongis ſupra glabris molliusculis, pedunculis axillaribus pauci-terminalibus multifloris. *Ind. or.* (Uncaria ſeſſilifructus Roxb.)

piloſa * 22. N. cirris ſpiralibus, ramis 4gonis foliisque ovato-oblongis acuminatis piloſis, ſtipulis 2partitis, pedunculis axillaribus 1floris. *Ind. or. Inſ. Molucc.* (Uncaria piloſa Roxb., ſcandens Sm.)

Wallichiana * 23. N. ramis 4angulis foliisque lanceolatis acuminatis ſubtus ferrugineo-villoſis, ſtipulis diphyllis ovatis membranaceis recurvis, pedunculis abbreviatis demum uncinatis, capſulis longe pedicellatis. *Inſ. freti Malacc.* (Uncaria lanoſa Wallich.)

grandifolia * 24. N. ramis 4angulis, foliis late ovatis acuminatis coriaceis ſupra nitidis ſubtus villoſis reticulato-venoſis, capitulis grandibus tomentoſis. *Ind. or.* (Uncaria macrophylla Wallich.)

Ad *Nonateliam* Aubl.

Poſt n. 4. †*hiſpida* Wallich. 9. N. caule fruticoſo, foliis inaequaliter oblongis acuminatis integerrimis coriaceis ſupra glabris ſubtus ſcabris, junioribus ſtipulisque lineari-lanceolatis hiſpidis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſubverticillatis, involucro polyphyllo, bracteis lanceolatis 3nerviis hiſpidis. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 753.

Ad *Scaevolam.*

Poſt n. 22. *montana* Labill. 23. Sc. fruticoſa, foliis obovato-oblongis coriaceis repandis glabris, cymis axillaribus pedunculatis piloſis, floribus ſeſſilibus. *Nov. Caledon.*

oppoſitifolia Roxb. 24. Sc. foliis oppoſitis breviter petiolatis ellipticis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus paucifloris. *Inſ. Molucc.*

pag. 754.

Poſt *Rytideam* Cand.:

ZUCCARINIA *.

ornata * *Inſ. freti Malacc.* Arbor procera, ramis 4angulis, foliis amplis obovato-oblongis cuſpidatis ſupra nitidis ſubtus villoſis, ſtipulis infundibuliformibus fimbriatis, paniculis axillaribus pendulis, floribus albis. (Jackia ornata Wallich.)

ARGOSTEMMA Wallich.

ſarmentoſum Wallich. 1. A. caule baſi repente ſarmentoſo pubeſcente, foliis quaternis ſubſeſſilibus ovalibus obtuſis, floribus umbellatis 4andris. *Nepal.*

verticillatum Wallich. 2. A. caeſpitoſum erectum, foliis quaternis lineari-lanceolatis ſubfalcatis, pedunculis ſubgeminatis pauciſloris, floribus 4-5andris. *Nepal.*

roſtratum Wallich. 3. A. erectum glabrum, foliis oppoſitis petiolatis lanceolatis glaberrimis, ſtipulis ovalibus recurvis, umbella terminali multiflora. *Silhet, prov. Ind. or.*

pictum Wallich. 4. A. humile glabrum, foliis ſubcordato-ovatis acutis albo-reticulatis, umbella multiflora. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 756.

Ad *Canthium* Lam.

anguſtifolium Roxb. 4. C. fruticoſum, ſpinis axillaribus, foliis ſubfaſciculatis lanceolatis acuminatis lucidis, ſtipulis enſiformibus, floribus axillaribus aggregatis. *Ind. or.*

parvifolium Roxb. 5. C. fruticoſum ſpinoſum piloſum, foliis ovalibus integerrimis, floribus axillaribus faſciculatis, tubo corollae globoſo. *Ind. or.*

pag. 757.

Poſt *Canthium* Lam.:

GEOPHILA Don.

reniformis Don. *Ind. or.* Herba reptans; foliis reniformibus pubeſcentibus, ſtipulis integris, pedunculis 2floris folio brevioribus. (Pſychotria herbacea L. non Jacqu.)

Ad *Trioſteum.*

hirſutum Roxb. 4. Tr. fruticoſum hirſutum, foliis breviter petiolatis lanceolatis acuminatis, floribus axillaribus ſeſſilibus, bracteis numeroſis lanceolatis flores ſuperantibus. *Ind. or.*

Emodorum * 5. Tr. herbaceum villoſo-hirtum, foliis baſi connatis obovatis acutis, racemis terminalibus verticillatis. *Emodi montes.* (Tr. himaluyanum Wallich.)

pag. 758.

Ad *Loniceram.*

Poſt n. 14. *macrantha* * 31. L. ſcandens, ramulis teretibus petiolisque piloſis, foliis cordato-ovalibus cuſpidatis ſubtus tomentoſis, corollis piloſis. *Nepal.* (Caprifolium macranthum Don.)

pag. 759.

Poſt n. 18. *liguſtrina* Wallich. 32. L. foliis ellipticis integerrimis ciliatis, ſupremis lanceolatis, ramulis piloſis. *Nepal.*

Ad L. *Xyloſteum.* L. acuminata et diverſifolia Wallich. varr.

Poſt n. 24. *glabrata* Wallich. 33. L. ſcandens glabra, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus glaucis, floribus geminatis in faſciculis axillaribus terminalibusque, bracteis ovatis, tubo corollae brevinsculo, (baccis nigris). *Ind. orient.* (L. nigra Thunb. japon.)

lanceolata Wallich. 34. L. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis pubeſcentibus ſubtus glaucis piloſis, pedunculis axillaribus elongatis villoſis, (baccis nigris). *Nepal.*

Leſchenaultii Wallich. 35. L. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſubtus villoſis, pedunculis abbreviatis 2floris faſciculatis, involucro 6phyllo. *Ind. or.*

punicea Sims. 36. L. foliis ſubcordato-ovatis glabris nitidis, corollae tubo gracili baſi ſubgibbo. *Patria?* Bot. mag. 2469.

Ad *Weberam.*

auriculata Wallich. 4. W. arboreſcens, foliis ſubſeſſilibus baſi 2lobis oblongis emarginatis, axillis venarum ſubtus glanduloſis, floribus paniculatis, ſtigmate 2lobo. *Inſ. freti Malacc.*

denſiflora Wallich. 5. W. ſubarboreſcens, foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis, paniculis ſubſeſſilibus trichotomis, ſtigmate integro. *Inſ. freti Malacc.*

oppoſitifolia Roxb. 6. W. fruticoſa erecta, foliis oblongo-lanceolatis nitidis, ſpicis paniculatis oppoſitifoliis, ſtigmate clavato. *Ind. or.*

odorata Roxb. 7. W. fruticoſa erecta, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis nitidis, corymbis terminalibus. *Ind. or.*

macrophylla Roxb. 8. W. fruticoſa erecta, foliis ovato-lanceolatis acuminatis, panicula terminali villoſa. *Inſ. freti Malacc.*

ſcandens Roxb. 9. W. ſcandens, foliis oblongis acuminatis ramulisque lucidis, cymis axillaribus, ſtigmate bilamellato. *Silhet, prov. Ind. or.*

truncata Wall. 10. W. volubilis, foliis ovatis acutis coriaceis ſupra nitidis, paniculae terminalis ramis complanatis, ſtigmate clavato bilobo. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 760.

Ad *Vangueriam edulem* Vahl. V. *ſpinoſa* Roxb. fl. ind. 2. p. 172. eadem videtur. Spinarum enim praeſentia in ſpeciminibus ſiccis, quae Vahlius viderat, conſpici nequivit.

Ad *Bacobotryn* Forſt.

lanceolata * 4. B. foliis lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque ramulisque glabris, racemis ſubgeminis multifloris. *Nepal.* (Maeſa Don.)

tomentoſa Hamilt. 5. B. foliis oblongis acuminatis ſerratis utrinque ramulisque incano-tomentoſis, racemis multiflo-

ris paniculatis. *Nepal.* (B. macrophylla Wallich., Maesa tomentosa Don.)

Ad B. *indicam* Roxb. (Maesa Chisia Don.)

ramentacea Roxb. 6. B. foliis lanceolatis acutis integerrimis glabris, paniculis ramentosis. *Silhet, prov. Ind. or.*

argentea Wall. 7. B. foliis ovatis acuminatis argute sinnato-dentatis pubescentibus subtus argenteis, racemis axillaribus abbreviatis, floribus fasciculatis. *Ind. orient.*

pag. 761.

Ad *Gardeniam.*

Post n. 2. *propinqua* Lindl. 35. G. spinis infraxillaribus rectis quaternis, foliis cordato-ovatis acuminatis undulatis pubescentibus. floribus terminalibus fasciculatis. *Patria?* Bot. reg. 975.

pag. 762.

Ad *Gardeniam esculentam* * (Randia triflora Don.) *Nepal.*

Ad G. *spinosam* Thunb. (Posoqueria rigida Wallich.)

Ad G. *multiflorum* W. (Posoqueria longiflora Roxb.)

montana Roxb. 36. G. arborea, spinis axillaribus oppositis abbreviatis, foliis oblongis obtusis supra nitidis subtus subpubescentibus, floribus aggregatis terminalibus, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*

campanulata Roxb. 37. G. fruticosa, spinis solitariis subterminalibus, foliis lato-lanceolatis utrinque laevibus, floribus fasciculatis, dentibus calycis abbreviatis, corolla campanulata. *Ind. or.*

turgida Roxb. 38. G. arborescens, cortice spongioso, spinis oppositis rectis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, dentibus calycis abbreviatis. *Butan.*

densa Wallich. 39. G. fruticosa, ramis decussatis 4gonis spinosis, foliis confertis obovatis mucronatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis subulatis. *Nepal.*

nutans * 40. G. fruticosa, ramis pendulis, spinis axillaribus oppositis horizontalibus, foliis fasciculatis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis elongatis. *Ind. or.* (Posoqueria nutans Roxb.)

longispina * 41. G. arborea, ramis deflexis, spinis decussatis horizontalibus elongatis, foliis obovatis glabris, floribus solitariis, laciniis calycis cordato-ovatis persistentibus. *Ora Coromandel.* (Posoqueria longispina Roxb.)

fasciculata * 42. G. fruticosa, spinis axillaribus patentibus, foliis ovato-oblongis laevibus, floribus axillaribus fasciculatis, calycis hirsuti laciniis subulatis. *Silhet, prov. Ind. orient.* (Posoqueria fasciculata Roxb.)

floribunda * 43. G. arborescens, spinis axillaribus, foliis confertis obovatis glabris, floribus fasciculatis, laciniis calycis lanceolatis elongatis. *Ora Coromandel.* (Posoqueria floribunda Roxb.)

pag. 763.

Poſt n. 19. *rigida* Hamilt. 44. G. caule ramoſiſſimo, foliis cuneatis retuſis mucronulatis glabris, laciniis calycis ſubulatis, lobis corollae acutiusculis. *Nepal.*

lucida Roxb. 45. G. arboreſcens, gemmis reſinoſis, foliis oblongis lucidis parallele venoſis, pedunculis ſolitariis clavatis, laciniis calycis ſubulatis. *Ind. or.*

carinata Wallich. 46. G. arboreſcens, gemmis reſinoſis, foliis obovatis ſubtus villoſis, floribus ſolitariis, calyce truncato carinato. *Inſ. freti Malacc.* (G. tubifera Wallich.)

aniſophylla Jack. 47. G. arboreſcens, foliis oblongis villoſis, altero minori, corymbis axillaribus, dentibus calycis abbreviatis. *Inſ. freti Malacc.*

G. *grandiflora* Lour. (G. calyculata Roxb.)

G. *reſinifera* Roth. (G. coſtata Roxb.)

pag. 764.

Ad *Stylocorynam* Cav.

corymboſa Labill. 2. St. foliis obovato-oblongis coriaceis glabris ſubtus discoloribus, floribus corymboſis, baccis 4locularibus. *Nov. Caledon.* St. racemoſa Cav. habet baccas 2loculares.

Ad *Burchelliam* R. Br.

parviflora Lindl. 2. B. foliis ſubcordato-oblongis acutis glabriusculis ſubtus ad venas pubeſcentibus, floribus capitatis flavis. *Afric. auſtr.* Bot. reg. 891.

pag. 765.

Ad *Schwenkfeldiam* Sw.

malaccenſis * 9. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſupra glabris ſubtus villoſis, ſtipulis petiolos ſuperantibus oblongis acutis, capitulis axillaribus pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Urophyllum villoſum Wallich.)

glabra * 10. Schw. foliis oblongo-lanceolatis acutis glabris, ſtipulis linearibus elongatis villoſis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Urophyllum Wallich.)

Poſt *Hameliam*:

LEYCESTERIA Wallich.

formoſa Wall. *Emodi montes.* Frutex ramoſus, foliis oppoſitis cordato-lanceolatis acuminatis glabris ſubtus glaucis, racemis terminalibus, bracteis grandibus purpureis ciliatis venoſis, floribus albido-roſeis.

pag. 766.

Ad *Hirtellam.*

Ad H. *Cofmibuenam* Lam. (H. mollicoma Kunth.) *Nov. Granat.* H. peruviana Perf. eadem. Sed H. pendula Lam. diverfa. -

pendula Lam. 6. H. racemis terminalibus compofitis tomentofis, floribus 3andris, foliis cordato-oblongis fubtus pubefcentibus. *Amer. auftr.?*

hexandra W. herb. 7. H. racemis terminalibus ternis fimplicibus pilofis, floribus 6andris, foliis oblongis obtufis bafi attenuatis coriaceis glabris fupra nitidis, coffa media fubtus pubefcente. *Ad fl. Orinocum.*

polyandra Kunth. 8. H. paniculis terminalibus ramofiffimis tomentofis, floribus polyandris, foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis fupra nitidis fubtus albo-tomentofis. *Mexico.*

Opilia odorata * deleatur. *Aglaia odorata* Lour. reftituetur fyft. 3. p. 48.

pag. 767.

Ad *Rhamnum.*

Poft n. 1. *trigyna* Don. 48. Rh. foliis ovatis acuminatis ferrulatis lucidis, petiolis ramulisque pubefcentibus, fpicis interruptis paniculatis. *Nepal.* (Zizyphus hamofa et oppofitifolia Wallich.)

lucida Roxb. 49. Rh. arborefcens, fpinis recurvis validis, foliis oppofitis fubrotundo-oblongis emarginatis integerrimis nitidis, pedunculis axillaribus pauciforis abbreviatis. *Inf. Mafcaren.*

Rh. *tinctoria* Kit. habet folia *venofa* potius quam nervofa.

Poft n. 8. *virgata* Roxb. 50. Rh foliis oblongis utrinque attenuatis membranaceis crenulatis glabris, pedunculis 1floris aggregatis. *Nepal.*

Poft n. 13. *incana* Roxb. 51. Rh. foliis ovato-oblongis integerrimis fupra glabris fubtus albido-pilofis, ftipulis filiformibus, corymbis axillaribus. *Inf. Molucc.*

pag. 769.

Poft n. 39. † *Nerija* * 52. Rh. foliis petiolatis ovali-oblongis ferrato-crenatis glabris, paniculis axillaribus compactis. *Ora Coromandel.* (Nerija dichotoma Roxb.)

pag. 770.

Ad *Zizyphum* Tourn.

Poft n. 6. *incurva* Roxb. 22. Z. aculeo altero incurvo, foliis ovatis acutis bafi obliquis crenulatis 5nerviis, petiolis nervisque pubefcentibus, cymis 2fidis pedunculatis, floribus femidigynis. *Ind. or.*

rotundata Cand. 23. Z. aculeo altero recurvo, foliis oblique ovatis obtufis fubcrenulatis fubtus ramulisque villofis, corymbis axillaribus, fructibus ovatis obtufis glabris. *Inf. Mafcaren.*

oxycarpa Cand. 24. Z. aculeo altero recurvo, foliis oblique ovatis utrinque attenuatis argute ferrulatis subtus ramulisque villosis, corymbis axillaribus, fructibus oblongis acuminatis. *Inf. Molucc.*

latifolia Roxb. 25. Z. arborea, aculeis recurvis, foliis ovalibus ferratis subtus pubescentibus, panicula terminali, fructibus turbinatis. *Ind. or.*

Caracutta Hamilt. 26. Z. arborea, aculeo altero recurvo altero recto, foliis subrotundis ferrulatis glabriusculis, pedunculis axillaribus multifloris abbreviatis, fructibus ovalibus. *Ind. or.*

microphylla Roxb. 27. Z. fruticosa, ramis 2fariis flexuosis, aculeo altero recurvo altero recto, foliis ovatis ferrulatis subtus lanatis, floribus fasciculatis. *Ora Coromandel.* (Rhamnus nummularia Burm. ind. p. 61.)

flexuosa Wall. 28. Z. fruticosa, aculeo altero recurvo altero elongato recto, foliis lanceolatis obtusis crenatis nitidis, floribus axillaribus subsolitariis. *Emodi montes.*

Z. *vulgaris* Lam. (Z nitida Roxb.)

Z. *horrida* Roth. (Z. elliptica Roxb.)

Z. *Napeca* Lam. (Z. glabra Roxb.)

pag. 771.

Z. *Oenoplia* Mill. (Z. albens Roxb.)

Z. *Xylopyrus* W. (Z. tomentosa Roxb.)

Post n. 19. *calophylla* Wallich. 29. Z. fruticosa, aculeis recurvis, foliis ovato-oblongis crenulatis glaberrimis lucidis, corymbis paniculatis terminalibus. *Inf. freti Malacc.*

elegans Wall. 30. Z. fruticosa, aculeis minutis deciduis, ramis pubescentibus filiformibus, foliis 2fariis lanceolatis ferrulatis subtus pubescentibus. *Peninsul. Malacc.*

Post n. 21. *floribunda* Wall. 31. Z. caule subscandente, foliis ovatis acutis subintegerrimis coriaceis supra nitidis subtus glaucis nervosis, floribus racemoso-paniculatis, fructibus subcylindricis. *Nepal.*

flavescens Wall. 32. Z. caule scandente, foliis ovato-oblongis subintegerrimis supra opacis subtus glaucis nervosis, floribus fasciculato-racemosis. *Emodi montes.*

trinervia Roxb. 33. Z. arborescens, foliis ovato-oblongis 3nerviis obtuse ferratis glabris nitidis, floribus axillaribus fasciculatis, fructibus globosis. *Ind. or.*

Post *Zizyphum:*

PERROTTETIA Kunth.

quinduensis Kunth. *Nov. Granat.* Frutex foliis alternis petiolatis oblongis acuminatis remote denticulatis membranaceis subtus tomentosis, stipulis petiolaribus geminis lanceolatis, racemis erectis axillaribus compositis folio brevioribus, floribus rubris minutis.

pag. 772.

Ad *Ceanothum.*

C. *paniculatus* Roth. (C. napalenſis Wallich.)
triqueter Wall. 21. C. fruticoſus, foliis ovato-oblongis acuminatis ferrulatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, fructibus 3quetris. *Nepal.*

pag. 773.

Ad *Hoveniam dulcem* Thunb. adde patriam: *Nepal.*

Ad *Celaſtrum.*

Poſt n. 7. *rufa* Wallich. 49. C. arborea glabra, aculeis axillaribus rectis, foliis lanceolatis acuminatis ferrulatis glaberrimis, pedunculis corymbiferis capillaribus, capſula 3ſperma. *Nepal.*
rigida Wallich. 50. C. fruticoſa erecta, ramis flexuoſis ſpinoſis, foliis obovatis coriaceis argute ſerratis, ſpinis corymbiferis. *Ind. or.*

pag. 774.

Poſt n. 19. † *Hänkea* * 51. C. fruticoſa, ramis flexuoſis, foliis alternis petiolatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis, racemis axillaribus folia ſuperantibus, floribus bracteatis. *Peru.* (Hänkea flexuoſa R. et P. fl. peruv. 3. t. 231. Etiamſi ibi corolla 1petala urceolata et drupa indicentur, auctores dein ipſi ad Celaſtrum ablegarunt.)
verticillata Roxb. 52. C arborea, foliis ſubverticillatis oblongo-lanceolatis undulatis integerrimis glabris, pedunculis umbelliferis terminalibus, capſulis oligoſpermis. *Nepal.*
robuſta Roxb. 53. C. arborea, foliis alternis lanceolatis integerrimis nitidis, racemis axillaribus folia aequantibus, capſulis 2ſpermis. *Silhet, prov. Ind. or.*
oppoſita Wall. 54. C. fruticoſa, ramulis 4gonis, foliis oppoſitis lanceolatis obtuſis integerrimis, pedunculis axillaribus 3floris. *Ind. or.*
bivalvis Jacqu. 55. C. fruticoſa, foliis oppoſitis lanceolatis acuminatis integerrimis glaberrimis, pedunculis lateralibus paucifloris, floribus apetalis, capſula 1ſperma. *Inſ. freti Malacc.*

pag. 775.

Poſt n. 27. *alniſolia* Don. 56. C. foliis ovatis acuminatis ſerratis nervoſis glabris opacis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis 1floris. *Nepal.*
microcarpa Don. 57. C. foliis ovatis crenatis utrinque ramulisque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris. *Nepal.*
Poſt n. 40. *quadrangulata* Schrad. 58. C. ramulis quadrangulis, foliis alternis oblongis ſpinoſo-dentatis nitidis, pedunculis axillaribus confertis. *Braſil.* (Ilex acutangula Nees.)

ilicifolia Schrad. 59. C. foliis alternis oblongis truncatis ſubſinuato-ſpinoſis ſupra lucidis ſubtus discoloribus, pedunculis axillaribus. *Braſil.* (Ilex truncata Nees.)

ilicinus Burch. 60. C. foliis alternis ovato-ſubrhombeis groſſe ſerratis ſubtus pallidis, pedunculis axillaribus ſſloris infra medium articulatis. *Afric. auſtr.*

dependens Wallich. 61. C. fruticoſa ſcandens, foliis alternis pendulis oblongis acuminatis ſerratis glabris, paniculis terminalibus, glandulis nectariferis reniformibus ſtamina interſtinguentibus, capſula 3ſperma. *Nepal.* (C. multiflora Roxb.)

nutans Roxb. 62. C. fruticoſa ſcandens, foliis alternis obovato-oblongis obtuſe ſerratis glabris, paniculis racemoſis terminalibus, capſulis oligoſpermis. *Ind. orient.*

monoſperma Roxb. 63. C. fruticoſa ſcandens, foliis obovato-oblongis ſerrulatis nitidis, paniculis axillaribus terminalibusque elongatis, capſulis ſſpermis. *Ind. or.*

†*pauciflora* Wallich. 64. C. fruticoſa erecta, foliis lanceolatis acuminatis ſubſerratis glaberrimis, pedunculis 6-8floris, capſula 3valvi 6ſperma. *Inſ. freti Malacc.*

ſtyloſa Wall. 65. C. fruticoſa ſcandens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerrulatis, pedunculis racemoſis paucifloris, capſula globoſa ſtylo elongato coronata. *Nepal.*

pag. 776.

Ad C. *orbicularem* Humb. (Maytenus uliginoſus Kunth. Humb. nov. gen. 7. p. 65.)

Ad *Pomaderrin* Labill.

Poſt n. 1. *phillyreoides* Sieb. 6. P. foliis elliptico-oblongis integerrimis coriaceis ſubtus albido-tomentoſis, cymis corymboſis confertis, calycibus villoſis. *Nov. Holl.*

Ad P. *lanigeram* Sims. (P. obſcura, ferruginea et viridirufa Sieb.)

P. *acuminata* Link. potius dicenda P. *discolor* Vent. malmaiſ. t. 58. prior. Ad hanc P. malifolia et discolor Sieb.

intermedia Sieb. 7. P. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſupra glabris ſubtus incano-villoſis, cymis corymboſo-paniculatis, calycibus villoſis. *Nov. Holl.*

aſpera Sieb. 8. P. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſupra ſcabris ſubtus floccoſo-tomentoſis, paniculis axillaribus terminalibusque racemoſis elongatis tomentoſis, floribus apetalis. *Nov. Holl.*

liguſtrina Sieb. 9. P. foliis lanceolatis integerrimis ſupra glabris ſubtus ferruginco-villoſis, paniculis terminalibus, calycibus ſericeo-villoſis. *Nov. Holl.*

pag. 777.

Ad *Vitem.*

Ad *Vitem indicam.* V. ſylveſtris Blum. var.

Poſt n. 8. *Purani* Hamilt. Don. 27. V. foliis cordatis dentato-ſerratis acuminatis coriaceis ſubtus petiolisque

villoſis, thyrſis oppoſitifoliis ſpicatis brevibus. *Nepal.*

truncata Blum. 28. V. foliis baſi truncatis ovatis acuminatis obtuſe glanduloſo-ſerratis, venis ſubtus pubeſcentibus, paniculis oppoſitifoliis. *Java.*

cymoſa Blum. 29. V. foliis cordatis acuminatis ſetoſo-ſerrulatis ſubtus tomentoſis, cymis pedunculatis 3fidis folio brevioribus. *Java.*

glaberrima Wallich. 30. V. caule carnoſo 4gono, foliis ſubcordato-oblongis obtuſiusculis mucronato-dentatis 3nerviis laevibus, umbellis corymboſis. *Inſ. freti Malacc.*

gracilis Wallich. 31. V. caule filiformi, foliis cordato-ovatis acuminatis argute dentatis ſupra pubeſcentibus ſubtus ramulisque ferrugineo-villoſis, ſpicis filiformibus cirriferis. *Peninſul. Malacc.*

pag. 778.

Ad V. *glabratam* Roth. (V. latifolia Roxb. Don.)

V. *heterophylla* Thunb. creſcit et in *Java.*

V. *triloba* Roth. (V. lanata Roxb.)

V. *capenſis* Thunb. (V. rugoſa Wallich.)

Poſt n. 14. *parvifolia* Roxb. 32. V. foliis cordatis ſub-3lobis crenato-ſerratis glabris, thyrſis oppoſitifoliis. *Bengal.*

barbata Wall. 33. V. ramis cylindricis glanduloſo-ſetoſis, foliis cordato-ſubrotundis 3lobis ſinuato-dentatis 5nerviis glabriusculis, glomerulis cirriferis, floribus 4fidis. *Silhet, prov. Ind. or.*

glanduloſa Wall. 34. V. ramis villoſis, foliis cordato-ovatis 3lobis ſubtus villoſis, axillis venarum foveolatis, corymbis dichotomis. *Nepal.*

Poſt n. 19. *javanica* * 35. V. foliis ſimplicibus ternatisque cordatis crenato-ſerratis glabris, corymbis dichotomis. *Java.* (Ampelopſis heterophylla Blum.)

V. *ternata* Roth. (V. cinnamomea Wallich.)

ſemicordata Wallich. 36. V. foliis ternatis ſubtus villoſis, foliolis acuminatis argute ſerratis, lateralibus ſemicordatis, cymis oblongis. *Nepal.*

† *bracteolata* Wall. 37. V. foliis ternatis ſubtus ſubpubeſcentibus, foliolis acuminatis argute ſerrulatis, lateralibus ſemiovatis, cymis diffuſis, bracteis oblongis deciduis, floribus 4andris. *Ind. or.*

† *molliſſima* Wall. 38. V. foliis ternatis villoſiſſimis, foliolis acuminatis inaequaliter crenatis, cymis divaricatis, floribus 4andris *Inſ. freti Malacc.*

Poſt n. 22. *caprifolia* Don. 39. V. foliis quinatis oblongis acuminatis ſetaceo-dentatis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, umbellis 4radiatis folio brevioribus. *Nepal.*

rubifolia Wall. 40. V. foliis pinnatis 5jugis ſubtus glaucis pubeſcentibus, foliolis ſubcordato-oblongis acuminatis argute ſerratis, ramis corymbisque villoſis. *Bengal.*

pag. 779.

Ad *Scopoliam* Sm.

Poſt n. 4. *megapotamica* * 6. Sc. foliolis lanceolatis abrupte acuminatis integerrimis opacis glabris, paniculis axillaribus divaricatis, floribus 5fidis. *Rio grande.* Sello.

venoſa * 7. Sc. foliolis ſpathulato-lanceolatis mucronatis glaberrimis ſupra lucidis ſubtus parallele venoſis, ramis verrucoſis, ramulis glabris, racemis axillaribus. *Rio grande.* Sello.

Poſt *Huerteam* R. et P.:

ICACINA Adr. Juſſ.

ſenegalenſis Adr. Juſſ. *Senegambia.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis integerrimis glabris, floribus paniculatis terminalibus.

Ad *Sabiam* Colebr.

parviflora Wallich. 2. S. foliis ovato-lanceolatis cuſpidatis margine membranaceis undulatis, ramulis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus paucifloris, floribus digynis. *Nepal.*

campanulata Wallich. 3. S. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis margine membranaceis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis concavis. *Nepal.*

pag. 780.

Bonplandia W. mutetur in *Galipeam* Aubl.

Poſt n. 1. *aromatica* * 10. G. foliolis lanceolatis acutis glabris integerrimis pellucido-punctatis, racemis ſpicatis axillaribus, ſtaminibus 3 ſterilibus. *Guiana.* (Raputia Aubl., Sciuris Vahl. Syſt. veg. 1. p. 38.)

corymboſa * 11. G. foliolis lanceolatis acuminatis glabris, petiolo communi marginato, floribus corymboſis, ſtaminibus 4, 2 ſterilibus. *Guiana.* (Galipea trifoliata Aubl., Sciuris corymboſa Syſt. veg. 1. 38.)

pag. 781.

Poſt n. 8. *macrophylla* Hilar. 12. G. foliis oblongis, racemis extraxillaribus, ſtaminibus 3 ſterilibus. *Braſil.* (Conchocarpus macrophyllus Mik., Sciuris ſimplicifolia Syſt. veg. 1. 39.)

Gaudichaudiana Hilar. 13. G. foliis ſpathulatis mucronatis pellucido-punctatis, pedicellis pubeſcentibus, ſtaminibus 3-4 ſterilibus. *Braſil.*

Martiana Hilar. 14. G. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis, racemo ſimplici, ſtaminibus 3 ſterilibus *Braſil.*

Ad G. *cuneifoliam* Hilar. dele *Hortiam* Vandell.

Poſt *Melicytum* Forſt.:

EUTHEMIS Jack.

leucocarpa Jack. 1. E. foliis petiolatis lanceolatis ſpinuloſo-ſerratis glaberrimis nitidis, racemis erectis ramoſis, (ramis apice gemmiferis corniculatis). *Peninſul. Malacc.*

minor Jack. 2. E foliis anguſte lanceolatis obſolete ſerratis glaberrimis venoſo-ſtriatis, racemis ſimplicibus, fructibus acuminatis angulatis. *Peninſul. Malacc.*

† *elegantiſſima* Wallich. 3. E. foliis elliptico-lanceolatis acuminatis ſubtiliſſime ſerrulatis, venis reticulatis ad marginem confluentibus. *Peninſ. Malacc.*

SYNDESMIS Wallich.

elegans Wall. *Inſ. freti Malacc.* Arbuscula, foliis ſparſis lanceolatis coriaceis, corymbis terminalibus, calycibus coccineis, corolla candida.

HARPULLIA Roxb.

cupanioides Roxb. *Ind. or.* Arbuscula, foliis abrupte pinnatis glabris, foliolis 4-6jugis oblongis acutis integerrimis, paniculis axillaribus, floribus ſulfureis.

pag. 788.

Ad *Evonymum.*

micranthus Don. 9. E. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis glabris lucidis, pedunculis 3fidis multifloris folio brevioribus. *Nepal.* (E. glaber Roxb.)

lacer Don. 10. E. foliis obovatis ſerrulatis glabris, pedunculis axillaribus trichotomis folia ſuperantibus. *Nepal.* (E frigidus Wallich.)

lucidus Don. 11. E. foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis glabris lucidis, umbellis lateralibus oppoſitis pedunculatis. *Nepal.* (E. grandiflora Wallich.)

tingens Wall. 12. E. arboreus, foliis ſubdecuſſatis ovato-lanceolatis ſerrulatis ſupra rugoſis coriaceis, pedunculis dichotomis, bracteis fimbriatis, capſula 5ſperma. *Ind. or.*

fimbriatus Wall. 13. E. foliis oppoſitis ovato-lanceolatis acuminatis argute ſerrulato-fimbriatis, pedunculis umbelliferis, capſula late alata. *Peninſ. Malacc.*

† *groſſus* Wall. 14. E. foliis ſuboppoſitis longe petiolatis ovatis acutis ſerratis coriaceis nitidis, pedunculis filiformibus dichotomis. *Ind. or.*

vagans Wall. 15. E. fruticoſus ſcandens, foliis ovato-lanceolatis ſerratis, pedunculis filiformibus dichotomis, capſula globulari. *Nepal.*

echinatus Wall. 16. E. ſcandens radicans, foliis ovato-lanceolatis ſerratis glaberrimis, pedunculis filiformibus dichotomis, capſula echinata. *Nepal.*

† *dichotomus* Heyn. 17. E. ramis dichotomis, foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis glabris, pedunculis faſciculatis dichotomis, capſula clavata. *Ind. or.*

† *indicus* Heyn. 18. E. ramulis ſub-4angulis, foliis lanceolatis acuminatis integerrimis coriaceis ſupra nitidis, pedunculis ſub-3floris, capſula clavata apice 5alata. *Ind. or.*

† *garcinifolius* Roxb. 19. E. ramulis teretibus, foliis oppoſitis lanceolatis acuminatis integerrimis laevibus, pedunculis 3floris, capſula 2valvi 1ſperma. *Silhet, provinc. Ind. or.*

pag. 789.

Ad *Büttneram.*

Poſt n. 3. 4. *celtoides* Hilar. 19. B. foliis ſubcordato-oblongis acuminatis ſerratis ſupra aſperis ſubtus pubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Braſil.*

ſagittaefolia Hilar. 20. B. ſuffruticoſa erecta, ramis angulatis breviſſime aculeatis, petiolis 3quetris, foliis ſagittatis apice dentatis, racemis ſpicatis, ligulis petalorum erectis elongatis ſubulatis. *Braſil.*

pag. 790.

Ad B. *tereticaulem* Lam. (B. auſtralis Hilar.) *Braſil.*

Ad B. *pannoſam* Cand. (B. auſtralis Sieb.)

Poſt n. 13. *aſpera* Colebr. 21. B. fruticoſa, ramis teretibus pubeſcentibus, foliis late cordatis obtuſiusculis integerrimis ſubtus piloſiusculis 5nerviis, umbellis axillaribus corymboſis, fructibus grandibus valide armatis. *Ind. or.*

piloſa Roxb. 22. B. fruticoſa volubilis, ramis ſulcatis, foliis 3-5angulis dentatis acutis ſubtus 7nerviis, glandula in medio nervo, umbellis axillaribus proliferis. *Ind. or.*

Jackiana Wall. 23. B. fruticoſa ſcandens, ramis teretibus ferrugineis, foliis oblongis acutis integerrimis ſtellato-piloſis ſubtus 5nerviis, corymbis axillaribus longe pedunculatis. *Inſ. freti Malacc.*

melaſtomaefolia Hilar. 24. B. foliis ovato-ellipticis glabris integerrimis triplinerviis, panicula ſpicata elongata. *Braſil.*

Gayana Hilar. 25. B. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis glabriusculis, umbellis axillaribus pedunculatis. *Braſil.*

ſidaefolia Hilar. 26. B. foliis cordatis acuminatis integerrimis ſubtus pubeſcentibus, corymbis ſublateralibus. *Braſil.*

pag. 792.

Ad *Hydnocarpum* Vahl.

moluccanus * 2. H. foliis alternis lanceolatis acutis integerrimis glabris, pedunculis axillaribus multifloris. *Inſ. Molucc.* (Vareca moluccana Roxb.)

lanceolatus * 3. H. foliis alternis lanceolatis glaberrimis parallele venoſis, floribus axillaribus corymboſo-faſciculatis. *Inſ. freti Malacc.* (Vareca lanceolata Roxb.)

heteroclitus * 4. H. foliis alternis lanceolatis crenatis glabris, axillis venarum ſubtus glandulofo-foveolatis, ſtipulis enſiformibus, floribus axillaribus glomeratis ſeſſilibus. *Ind. or.* (Vareca heteroclita Roxb.)

BREXIA Noronh.

madagaſcarenſis Ker. 1. Br. foliis oblongis obtuſis integerrimis, coſta ſubtus purpurea, pedunculis umbelliferis. *Madagaſcar.* (Venana Lam.)

ſpinoſa Lindl. 2. Br. foliis lanceolatis elongatis rigidis marginatis ſpinoſis, pedunculis ſubumbelliferis. *Madagaſcar.* (Theophraſta ferratifolia Hortul.)

pag. 793.

Ad *Eſcallonium* Mutis.

Poſt n. 12. *megapotamica* * 15. E. foliis ſpathulatis longe mucronatis argute ferratis ſubtus punctatis venuloſis glutinoſis, ſerraturis incurvis glandulofis, paniculo corymboſa ſubfoliata. *Rio grande.* Sello.

chlorophylla Schlechtend. 16. E. foliis obovatis mucronatis integerrimis ſubtus caeſio-pulverulentis, racemis terminalibus. *Braſil.*

pag. 794.

Ad *Iteam.*

umbellata Roxb. 2. I. foliis alternis oblongis integerrimis glabris, umbellis paniculatis. *Inſ. Malaïc.*

macrophylla Wall. 3. I. foliis alternis elliptico-oblongis acuminatis uncinato-ſerrulatis coriaceis nitidis, racemis axillaribus faſciculatis. *Silhet, prov. Ind. or.*

Poſt *Calodendron* Thunb.:

HORTIA Vandell.

braſiliana Vand. *Braſil.* Suffrutex glaberrimus, foliis alternis ſpathulatis punctato-pellucidis, floribus cymoſis roſeis. Hilar. pl. uſ. braſil. t. 17.

METRODOREA Hilar.

nigra Hilar. *Braſil.* Frutex ramis divaricatis, foliis oblongis utrinque attenuatis repandis, floribus paniculatis atropurpureis.

DICTYOLOMA Adr. Juſſ.

Vandellianum Adr. Juſſ. *Braſil.* Arbor foliis pinnatis margine glandulofis, corymbis lateralibus dichotomis, floribus tomentoſis. Mém. du muſ. 12. t. 24.

pag. 795.

Ad *Cedrelam* P. Br.

febrifuga Blum. S. C. foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acuminatis integerrimis, venis ſubtus concoloribus. *Java.*

pag. 796.

SAUVAGESIA.

racemoſa Hilar. 1. S. ſuffruticoſa, foliis ovato-oblongis crenatis parallele venoſis, ſtipulis criſpo-ciliatis, racemo ſimplici terminali, calycibus acutiusculis. *Braſil.* (S. ovata Mart.)

Sprengelii Hilar. 2. S. ſuffruticoſa ramoſa, foliis lanceolatis ſubſerratis, ſtipulis plumoſo-ciliatis, racemo terminali, calycibus obtuſis. *Ind. or. Guiana. Braſil.* (S. ſerpyllifolia Mart., erecta *.)

rubiginoſa Hilar. 3. S. ſuffruticoſa ramoſiſſima, foliis lineari-lanceolatis acutis ſerrulatis, ſtipulis confertiſſimis plumoſo-ciliatis, racemis ſpicatis terminalibus bracteatis, calycibus acutis. *Braſil.* (S. laxa Mart.)

erecta 4. S. ſuffruticoſa aſcendens, foliis lanceolatis acutis ſerratis, ſtipulis ciliatis, pedunculis ſubgeminis axillaribus, calycibus acutis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (S. erecta et Adima Aubl., nutans Perſ.)

linearifolia Hilar. 5. S. ſuffruticoſa ramoſa, foliis linearibus acutis obſolete ſerratis, ſtipulis 2fidis ciliatis, pedunculis axillaribus ſolitariis, calycibus acutis apice barbatis. *Braſil.* (S. fruticoſa Mart.)

tenella Lam. 6. S. herbacea erecta, foliis confertis linearibus ſubintegerrimis, ſtipulis abbreviatis ciliatis, pedunculis axillaribus 1floris, calycibus acutis. *Guiana. Braſil.* (S. puſilla Mart.)

Ad *Lavradiam* Vandell.

L. *montana* Mart. (L. glanduloſa Hilar.)

L. *alpeſtris* Mart. (L. ericoides Hilar.)

elegantiſſima Hilar. 3. L. ſuffruticoſa ſimpliciuscula, foliis minutis imbricatis ſeſſilibus ovatis obtuſis glabris, ſtipulis piloſis, racemis terminalibus laxis. *Braſil.* (Sauvageſia elegantiſſima Hilar. mém. du muſ. 9. ſyſt. veg. 1. 796.)

Vellozii Hilar. 4. L. ſuffruticoſa ſimpliciuscula, foliis alternis lanceolatis utrinque attenuatis mucronatis calloſo-ſerratis, ſtipulis plumoſis, floribus racemoſis, calycibus acutis 5nerviis. *Braſil.*

capillaris Hilar. 5. L. ſuffruticoſa ramoſiſſima, foliis lanceolatis glanduloſo-ſerratis venoſo-lineatis, pedunculis terminalibus pauciforis capillaribus divaricatis. *Braſil.*

pag. 797.

Ad *Violam.*

Poſt n. 16. *palmaris* Hamilt. 96. V. foliis longe petiolatis cordatis acuminatis crenatis piloſiusculis, calycibus acutis, petalis barbatis, calcari ſaccato. *Nepal.*

pag. 798.

Poſt n. 31. *Sieberiana* * 97. V. foliis longe petiolatis obovato-ſubrotundis dentatis glabris, ſcapo gracili 2bracteato, flore nutante, calcari breviſſimo. *Nov. Holl.* (V. ſpathulata Sieb.)

acuta Bigel. 98. V. foliis ovato-lanceolatis obtuſiusculis obſolete crenulatis baſi ſubdecurrentibus, ſtipulis lineari-lanceolatis, petalis acutis imberbibus, calcari breviſſimo. *Maſſachuſetts Amer. bor.*

caeſpitoſa Don. 99. V. foliis oblongis utrinque rotundatis glabris crenulatis, petiolis marginatis, ſcapis folia ſuperantibus, calycibus acutis, petalis obovatis integris, lateralibus barbatis. *Nepal.* (V. Patrinii γ. Cand.)

pag. 800.

Poſt n. 55. *Riviniana* Reichenb. 100. V. caule erecto ramoſo, foliis profunde cordato-ovatis crenatis ſupra pubeſcentibus, ſtipulis linearibus fimbriatis, pedunculis elongatis, appendicibus calycis ſuperioribus angulatis perſiſtentibus, fructibus acutis. *In nemoribus Europ.* (V. canina auctorum variorum.) V. cânina L. vel maxime differt ſtipulis dentato-ſerratis, foliis minus cordatis et fructibus obtuſis. V. ſylveſtris Kit. minus ad V. caninam L. quam ad Rivinianam pertinet. Cf. Reichenb. ic. t. 75. 94. 95.

Poſt n. 56. *gracillima* Hilar. 101. V. caule filiformi erecto glaberrimo, foliis late cordatis obſolete dentatis ſubtus farinoſis, ſtipulis parvis ſubulatis, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Braſil.*

ſubdimidiata Hilar. 102. V. caulеſcens glaberrima, foliis cordato-ovatis dentatis, ſtipulis oblongo-lanceolatis inciſis ciliatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis, petalis imberbibus. *Braſil.*

ceraſifolia Hilar. 103. V. caulеſcens glaberrima, foliis lanceolatis acutis dentatis, ſtipulis oblongo-lanceolatis inciſis ciliatis baſi auriculatis, pedunculis folio brevioribus, calycibus acuminatis. *Braſil.* V. conferta Hilar. var.?

Hamiltoniana Don. 104. V. repens glaberrima, foliis reniformibus crenulatis, ſtipulis lanceolatis acutis dentatis, pedunculis folia ſubaequantibus, calycibus acutis, calcari abbreviato. *Nepal.* (V. glandulifera Wallich.)

arcuata Blum. 105. V. decumbens glabra, foliis reniformi-orbiculatis acutiuſculis ſerratis, venis pubeſcentibus, ſtipulis ovato-oblongis ciliatis 3nerviis baſi ſubſerratis. *Java.*

106.

pilosa Blum. 106. V. caule stolonifero, foliis cordatis crenulatis pilosiusculis, stipulis setaceo-incisis ciliatis. *Java.*

Ad V. *perfoliatam* Roth. (V. pratensis Mert. et Koch.)

Ad V. *Wallichianam* Ging. (V. reniformis Wall.)

pag. 802.

Ad V. *rubellam* Cav. (V. Chamissoniana Ging. in Linnaea p. 408.)

† *trachelifolia* Ging. 107. V. suffruticosa glabra, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis acuminatis argute serratis, stipulis lanceolatis integerrimis. *Insul. Sandwich.* Chamisso.

pag. 803.

Ad *Soleam* *.

Foliis alternis.

Post n. 6. 7. *sylvatica* * 24. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis ovatis acuminatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis solitariis, calycibus acuminatis, labello subrhombeo mucronato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

bicolor * 25. S. suffruticosa villosa, foliis alternis lanceolatis dentatis, stipulis linearibus integerrimis, floribus racemosis, labello rotundato mucronato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

lanata * 26. S. suffruticosa lanata, foliis alternis ellipticis obtusis integerrimis mucronatis, stipulis scariosis, labello late obcordato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

Poaya * 27. S. suffruticosa hirsutissima, foliis alternis subsessilibus subcordato-ovatis obsolete dentatis, stipulis scariosis, labello maximo obcordato. *Brasil.* (Ionidium Hilar. pl. us. brasil. t. 9.)

scariosa * 28. S. suffruticosa hirsuta, foliis alternis lanceolatis acuminatis serratis, stipulis lanceolatis scariosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello orbiculari. *Brasil.* (Ionidium Hilar.) I. villosissimum Hilar. var.

alba * 29. S. suffruticosa pubescens, foliis alternis lanceolatis serrato-ciliatis, stipulis scariosis, calycibus ciliatis pilosis, labello rotundato. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

setigera * 30. S. suffruticosa, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis dentatis, stipulis multipartitis ciliato-setosis, laciniis calycis pinnatifidis, labello oblongo concavo 3nervio. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

communis * 31. S. suffruticosa herbacea pubescens ramosa, foliis alternis lanceolatis dentatis glabris, stipulis linearibus integerrimis, pedunculis subracemosis, labello ovato 3nervio. *Brasil.* (Ionidium Hilar.)

nana * 32. S. ſuffruticoſa pubeſcens, foliis alternis lanceolatis dentatis, ſtipulis linearibus, calycibus acuminatis, labello complicato obcordato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

guaranitica * 33. S. ſuffruticoſa glabra, foliis alternis lanceolatis dentatis, ſtipulis linearibus, floribus pendulis, calycibus acuminatis, labello orbiculari crenulato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

Foliis oppoſitis.

atropurpurea * 34. S. ſuffruticoſa, foliis oppoſitis ovato-lanceolatis acutis obſolete ſerratis, ſtipulis caducis, floribus racemoſis, labello obcordato. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

bigibboſa * 35. S. fruticoſa pubeſcens, foliis oppoſitis oblongo-lanceolatis acuminatis obſolete dentatis, calycibus acuminatis ciliatis, labello ſpathulato baſi bigibbo. *Braſil.* (Ionidium Hilar.)

Herbaceae.

urticaefolia * 36. S. ramoſa viſcoſo-pubeſcens, foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-ovatis acutis ſerratis glabris, pedunculis paucifloris, calyce integerrimo, labello quadrato. *Braſil.* (Ionidium Mart.)

brevicaulis * 37. S. ſimplex, foliis petiolatis obovatis crenatis piloſiusculis, ſtipulis lanceolatis nervoſis, pedunculis axillaribus erectis, labello orbiculari. *Braſil.* (Ionidium Mart.)

pag. 804.

Ad *Soleam anomalam* * (Ionidium racemoſum Mart.)

Soleam Ipecacuanham *, laciniis calycis ſerrato-pinnatifidis, eamdem cenſet Hilarius ac Violam Itoubou Aubl. (Soleam n. 23.) Hilar. pl. uſ. braſil. t. 11.

pag. 805.

Ad *Noiſettiam* Humb.

galeopſifolia Hilar. 5. N. caule herbaceo glaberrimo ſubalato, foliis lanceolatis acutis ſerratis, floribus racemoſo-faſciculatis, petalo infero cucullato cuſpidato, calcari acutiusculo. *Braſil.* (N. longifolia Nees.)

Exſulet N. *pyrifolia* Mart., quae

ANCHIETEA Hilar.,

ad quam *ſalutaris* Hilar. 2. A. fruticoſa erecta, foliis ovatis ſubdentatis glabris ſubtus reſinoſo-punctatis, ſtipulis ſcarioſis ciliatis, pedunculis aggregatis axillaribus nutantibus 1floris. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 19.

† *Roquefeuillana* * 3. A. fruticoſa ſcandens, foliis oblongo-lanceolatis acutis crenato-ſerratis, pedunculis ſubracemoſis, labello ſubrhombeo obtuſo. *Braſil.* (Noiſettia ? Roquefeuillana Hilar.)

pag. 806.

Ad *Gloſſarrhenem floribundum* Mart. (Schweiggeria fruticoſa * N. E. 2. 167., floribunda Hilar. mém. du muſ. 11. t. 22. B.)

pag. 807.

Ad *Alſodeam* Thuars.

Poſt n. 12. 13. *caſtaneaefolia* * 17. A. foliis alternis oblongo-lanceolatis argute ſerratis mucronatis, racemis ſimplicibus, pedicellis pubeſcentibus. *Braſil.* (Conohoria Hilar.)

†*Cuſpa* * 18. A. arborea excelſa, foliis elliptico-oblongis obtuſis integerrimis glabris ſupra nitidis, ſummis oppoſitis, pedunculis ſimplicibus bracteatis. *Nov. Granat.* (Cuſpa Humb., Conoria Cuſpa Kunth.)

†*megapotamica* * 19. A. foliis elliptico-oblongis integerrimis venoſo-reticulatis ſubtus ſubpubeſcentibus, pedunculis cymiferis axillaribus 2fidis, filamentis dorſo barbatis. *Rio grande.* Sello.

Ad A. *phyſiphoram* Mart. (Conohoria Lobolobo Hilar.)

Ad A. *Rinoream* * (A. paniculata Mart., Conohoria Rinorea Hilar.)

Poſt *Alſodeam:*

AMPHIRRHOX *.

longifolia * *Braſil.* Frutex foliis oblongo-lanceolatis ſubdentatis glabris, floribus racemoſis albidis. (Spathularia longifolia Hilar. mém. du muſ. 11. t. 24.) Spathulariae genus jam adeſt vol. 4. p. 495.

Ad *Impatientem.*

Ad I. *faſciculatam* Lam. proxime accedit I. *ſetacea* Colebr. (Balſamina Hook. exot. fl. t. 137.) et I. *heterophylla* Wallich.

Ad I. *latifoliam* L. I. *mollis* Wallich. var.

pag. 808.

Poſt n. 18. *trilobata* Colebr. 24. I. pedunculis ſub-4floris patulis folia ſubaequantibus, foliis oblongo-lanceolatis ſerratis glabris, calcari conico acuminato incurvo. *Silhet, prov. Ind. or.*

Ad I. *ſcabridam* Wall. (I. Hamiltoniana Don.)

criſtata Wall. 25. I. pedunculis ſub-3floris petiolos aequantibus, foliis lanceolatis acuminatis ſetaceo-ſerratis pubeſcentibus, calcari incurvo pedicellum aequante. *Ad terminos Mongoliae.*

urticaefolia Wall. 26. I. pedunculis ſub-4floris filiformibus folia ſubaequantibus, foliis ovatis acuminatis glanduloſo-crenatis ſparſe piloſis nitidis, calcari amplo conico pedicellum aequante. *Emodi montes.*

calycina Wall. 27. I. pedunculis ſub-2floris, foliis alternis ovatis acuminatis argute ſerratis utrinque pubeſcenti-

bus, calycibus amplis villoſis, calcari aſcendente conico pedicellos ſuperante. *Nepal.*

grandis Heyn. 28. I. pedunculis 3floris, floribus maximis, calcari longiſſimo, foliis longe petiolatis ovatis acuminatis ſerratis. *Ind. or.*

Poſt n. 22. *fulcata* Wallich. 29. I. pedunculis oppoſitis multifloris folio brevioribus, foliis oppoſitis ovato-oblongis argute ſerratis, calcari incurvo, caule glabro profunde ſulcato. *Emodi montes.*

bicornuta Wall. 30. I. pedunculis elongatis corymbiferis, floribus faſciculatis bracteatis, nectarii ore appendicula cornuta, calcari conico apice filiformi, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis ſupra pubeſcentibus. *Nepal.*

umbellata Heyn. 31. I. pedunculis apice umbelliferis, calcari longiſſimo, foliis ovatis obtuſe acuminatis crenatis. *Ind. or.*

odorata Don. 32. I. racemis corymboſis folio brevioribus, calcari pedicellos aequante, petalis lateralibus 2appendiculatis, foliis lineari-lanceolatis ſerratis glabris. *Nepal.*

Ad I. *leptoceras* Wall. (I. micrantha Don., longicornu Wallich.)

fimbriata Hook. 33. I. racemo terminali capitato, bracteis purpureo-fimbriatis, calcari ſubulato incurvo florem excedente, foliis oblongis acuminatis ſerrato-ciliatis. *Silhet, prov. Ind. or.* Hook. exot. fl. t. 146. (I. bracteata Colebr. in Roxb. fl. ind. 2. 459.)

ſcapiflora Heyn. 34. I. ſcapo corymbifero, calcari longiſſimo, foliis radicalibus cordato-ſubrotundis obtuſis multinerviis integerrimis. *Ind. or.*

pag. 810.

Ad *Argophyllum* Forſt.

ellipticum Labill. 2. A. foliis ellipticis obtuſis integerrimis margine revolutis ſubtus rufo-tomentoſis, floribus cymoſis. *Noo. Caledon.* A. *nitidum* Forſt. habet folia ſubſerrata.

pag. 811.

Ad *Ribes.*

Poſt n. 22. *mexicanum* * 40. R. foliis ſubcordatis ſub-5lobis ſubtus pubeſcentibus, lobis ovatis duplicato-ſerratis, petiolis baſi glandulofo-ciliatis, racemis terminalibus bracteatis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. multiflorum Kunth.)

affine Kunth. 41. R. foliis cordatis ſub-5lobis ſubtus hirſutis, lobis obtuſis duplicato-crenatis, racemis ſolitariis pendulis, calycibus campanulatis. *Mexico.* (R. campanulatum W. herb.)

xorullenſe Kunth. 42. R. foliis cordatis 5lobis ſubtus pubeſcentibus, lobis acutis duplicato-ſerratis, ramulis racemisque ſolitariis glandulofis, bracteis deciduis. *Mexico.* (R. ciliatum W. herb.)

frigidum Kunth. 43. R. foliis cordatis ſubrotundis 3lobis glanduloſo-piloſis, lobis inciſo-ſerratis, racemis reflexis, bracteis dentato-ciliatis, calycibus campanulatis, fructibus hiſpidis. *Quito.* (R. hirtum W. herb.)

glaciale Wall. 44. R. foliis cordato-ſubrotundis 5lobis ſparſe piloſiusculis, lobis acuminatis inciſo-ſerratis, ramulis argenteo-nitidis, racemis erectis glanduloſo-pubeſcentibus, bracteis ciliatis flores aequantibus, ſtylo elongato, fructibus glabris. *Emodi montes.*

villoſum Wall. 45. R. foliis ſubcordato-ſubrotundis 3lobis obtuſis reſinoſis piloſis, lobis ſerratis glanduloſo-ciliatis, racemis erectis, bracteis flores ſuperantibus, ramis fructibusque villoſis. *Emodi montes.*

pag. 812.

Poſt n. 32. *microphyllum* Kunth. 46. R. ſpinis ſubſolitariis rectis, foliis parvis ſubreniformibus 5fidis ſupra pubeſcentibus ſubtus glabriusculis, pedunculis breviſſimis 2floris, calycibus campanulatis. *Mexico.*

pag. 813.

Poſt *Strumpfiam:*

SPHAEROCARYA Wallich.

edulis Wall. *Nepal.* Arbor foliis alternis oblongis acuminatis ſubcarnoſis ſupra nitidis ſubtus reticulatis, floribus racemoſis, fructibus edulibus.

Ad *Gouaniam.*

G. *tiliaefolia* Lam. (G. nepalenſis Wallich.)

ſtriata Rich. 7. G. foliis ovatis glabris nervoſis crenatis emarginatis, ramis rhachibusque ſtriatis. *Guiana.* (G. domingenſis Aubl.?)

ſmilacina Sm. 8. G. foliis cordatis acutis ſerrulatis glabriusculis, ſtipulis ſubulatis, pedunculis umbellatis folia ſubaequantibus. *Braſil.?*

cordifolia Radd. 9. G. foliis cordato-ovatis ſerrulatis piloſiusculis, ſtipulis minutis, capitulis axillaribus terminalibusque hirtis. *Braſil.*

corylifolia Radd. 10. G. foliis ſubcordato-ovatis acutis ſubdenticulato-glanduloſis ſubtus pubeſcentibus, racemis axillaribus terminalibusque longiſſimis. *Braſil.*

† *caneſcens* Rich. 11. G. foliis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus incanis, racemis axillaribus terminalibusque. *Guiana.*

ſtipularis Cand. 12. G. foliis ſubcordato-ovatis acuminatis ſerratis glabriusculis, ſtipulis maximis ſemiſagittatis acuminatis, fructibus 3alatis. *Mexico.*

cyclocarpa Sm. 13. G. foliis elliptico-oblongis acutis obſolete ſerratis, junioribus ferrugineo-ſericeis, fructus alis anguſtis orbiculatis. *Ind. occ.?*

aptera Cand. 14. G. foliis ſubcordato-ovatis acutiusculis groſſe dentato-ſerratis utrinque villoſis, racemis axil-

laribus terminalibusque, fructibus ſubovatis apteris. *Amer. tropic.*

denticulata Sm. 15. G. foliis ovatis acuminatis apice denticulatis ſubtus hirſutis, racemis axillaribus, cirris terminalibus. *Ind. or.*

Retinaria Cand. 16. G. foliis ovatis acutiuſculis ſubferratis ſubpubeſcentibus, racemis folia longe ſuperantibus, fructibus triquetro-alatis. *Inſ. Maſcaren.* (Retinaria ſcandens Gärtn.) G. microcarpa Cand. var.

Poſt *Carpodetum* Forſt.:

CRUMENARIA Mart.

decumbens Mart. *Braſil.* Planta annua, foliis ſubcordato-ovatis trinerviis, ſtipulis ciliatis, floribus axillaribus pedunculatis minutiſſimis.

Ad *Hederam.*

Hainla Don. 6. H. caule arboreo aculeato, foliis cordatis 5lobis dentatis coriaceis glabris, umbellis globoſis racemoſo-paniculatis. *Nepal.*

fragrans Don. 7. H. foliis ternatis glabris ſubtus glaucis, foliolis ovatis ſetacco-ſerratis, umbellis compoſitis multiradiatis glabris. *Nepal.*

tomentoſa Don. 8. H. foliis ſeptenatis coriaceis ſubtus denſe tomentoſis, foliolis lanceolatis acuminatis integerrimis, umbellis racemoſis, caule arboreo inermi. *Nepal.*

aculeata Don. 9. H. foliis ſeptenatis ſubtus pubeſcentibus, foliolis oblongis acuminatis ſerratis, umbellis racemoſis tomentoſis, caule arboreo aculeato. *Nepal.*

paraſitica Don. 10. H. foliis pinnatis 2jugis coriaceis glabris ſubtus glaucis, foliolis oblongis acutis integerrimis, umbellis racemoſis glabris, caule radicante ſubparaſitico. *Nepal.*

Ad H. *terebinthaceam* Vahl. (H. elata Don.)

pag. 814.

Ad *Celoſiam.*

Poſt n. 9. *muricata* * 15. C. fruticoſa ramoſa glabra, foliis ovatis acutis, ſpicis paniculatis, calycibus glomeratis baſi ſetoſis. *Ind. orient.* (Achyranthes muricata L., Deſmochaeta Cand., Cladoſtachys frutescens Don.)

longifolia Mart. 16. C. ſuffruticoſa erecta, foliis lanceolatis acuminatis glabris, floribus glomerato-capitatis, ſtigmatibus 4, 5. *Braſil.*

pag. 817.

Ad *Achyranthem.*

Poſt n. 12. *violacea* * 13. A. foliis lanceolato-linearibus pubeſcentibus, corymbo laxo. *Nov. Holland.* (Aylmeria Mart.)

rosea * 14. A. foliis verticillatis linearibus subulatis, corymbis terminalibus compactis bracteatis. *Nov. Holl.* (Aylmeria Mart.)

linearifolia Sw. 15. A. caule diffuso glabrato, foliis linearibus integerrimis, capitulis oblongis axillaribus terminalibusque, floribus extus villosis. *Inf. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 428.

pag. 818.

Ad *Desmochaetam achyranthoidem* Kunth. (Pupalia densiflora Mart. nov. gen. t. 156.) *Brasil.*

Ad *Illecebrum.*

I. *iresinoides* * deleatur, rediturum ut *Psilia iresinoides* *.

Post n. 3. *pulverulentum* * 22. I. suffruticosum albido-tomentosum, foliis ovato-oblongis obtusis supra pulverulentis, floribus paniculatis, calycibus lanatis. *Peru.* (Trommsdorffia Mart.)

pag. 819.

I. *flavescens* * delendum, cum ad *Mogiphanem* Mart. pertineat.

Post n. 13. *maritimum* * 23. I. caule diffuso radicante, foliis spathulatis mucronatis glabris, floribus lateralibus aggregatis, calycibus acutis, squamulis stamina intercedentibus sub-3fidis. *Brasil.* (Bucholzia Mart.)

pag. 820.

Post n. 18. *triandrum* Hamilt. 24. I. caule repente 4gono laevi, axillis barbatis, foliis lanceolatis obtusis denticulatis glabris. *Nepal.* (Alternanthera prostrata Don.)

Ad I. *polygonoides.* (Bucholzia polygonoides Mart.)

Post *Illecebrum*:

GUILLEMINEA Kunth.

Illecebrum * *Quito.* Herba diffusa ramosissima, foliis oppositis (altero minore) spathulatis acutis glabris, petiolis vaginantibus, stipulis nullis, capitulis axillaribus subsessilibus. (Gu. illecebroides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 518. Illecebrum densum W. herb.)

Ad *Iresinem.*

I. *elatior* Rich. (Rosea elatior Mart. nov. gen. t. 155.) *Brasil.*

angustifolia Euphras. 9. I. herbacea erecta glabra, foliis lineari-lanceolatis denticulatis utrinque attenuatis, panicula ramosissima, spicis oblongis. *Inf. Bartholom. in Caribaeis.*

paniculata * 10. I. herbacea glabra ramosissima, geniculis barbatis, foliis oblongis integerrimis utrinque attenuatis laevibus, spicis paniculatis, calycibus trinerviis longissime lanatis. *Brasil.* (Hebanthe Mart.)

ſpicata * 11. I. herbacea ramoſa ſuperne ferrugineo-pubeſcens, foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſubtus denſe hirſutis, ſpicis ſubternis pedunculatis, calycibus 5nerviis longiſſime lanatis. *Braſil.* (Hebanthe Mart.)

virgata * 12. I. ſuffruticoſa erecta ramoſa, foliis ovato-oblongis acuminatis ſubtus ferrugineo-ſtrigilloſis, calycibus 3-5nerviis lanatis. *Braſil.* (Hebanthe Mart.)

dysdicta * 13. I. herbacea erecta ramoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, floribus ſpicato-paniculatis, calycibus 3nerviis fulvo-villoſis. *Braſil.* (Tromsdorffia aurata Mart.)

pag. 823.

Ad *Gomphrenam.*

G. *gnaphaloides* Vahl. deleatur, redux *Pfaffia* Mart.
G. *braſilienſis* eſt *Mogiphanes* Mart.
G. *ſericea* *, *tuberoſa* * et *ſtenophylla* * ſunt *Pfaffiae* Mart.

Poſt n. 9. *macrocephala* Hilar. 27. G. hirſutiſſima, caule aſcendente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis rufo-hirſutis, capitulo maximo terminali hemiſphaerico polyphyllo, foliolis longiſſimis, bracteis dentato-criſtatis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 32.

deſertorum Mart. 28. G. caule erecto 2fido foliisque lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis elongatis, capitulis 2phyllis, bractearum carina demum criſtata. *Braſil.*

leucocephala Mart. 29. G. caule erecto tenero dichotomo, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, capitulo 4phyllo, bracteis carina ſerrulatis, calycibus denſe lanatis. *Braſil.*

eriophylla Mart. 30. G. caule erecto ſimplici foliisque ovatis acutis denſiſſime tomentoſis, capitulis ſeſſilibus globoſis diphyllis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

Schlechtendalii Mart. 31. G. caule erecto hirſutiſſimo, foliis ovalibus obtuſis mucronulatis, capitulis ſeſſilibus, bracteis calycibusque ſerratis. *Braſil.*

Hänkeana Mart. 32. G. caule aſcendente ramoſo foliisque lanceolatis acutis villoſiusculis, pedunculis elongatis ſolitariis, capitulis diphyllis. *Peru.*

celoſioides Mart. 33. G. caule aſcendente brachiato foliisque ovato-lanceolatis hirſutis, pedunculis terminalibus elongatis, ſpicis cylindricis 2phyllis. *Ad fl. Platam.*

pulchella Mart. 34. G. caule ramoſo aſcendente foliisque lanceolatis acutis ſtrigoſis, pedunculis elongatis, capitulis globoſis 2phyllis, bracteis calyce triplo brevioribus. *Monte Video.*

villoſa Mart. 35. G. caule ſimplici, foliis ovato-lanceolatis mucronulatis villoſis, capitulis globoſis 2phyllis, bracteis calyce brevioribus. *Monte Video.*

Selloi * 36. G. caule erecto ſimplici foliato foliisque oblongis hirſutis, pedunculis elongatis, capitulo maximo 2-4phyllo, bracteis calycibusque ſerratis. *Monte Video.*

agreſtis Mart. 37. G. caule erecto ſimpliciusculo foliisque lanceolatis ſtrigoſo-villoſis, capitulis ſubdiphyllis lateralibus terminalibusque, bracteis calycem ſubaequantibus. *Braſil.*

nigricans Mart. 38. G. caule ſimpliciusculo foliisque lanceolatis ſubtus villoſo-lanatis, pedunculis elongatis ſtrigoſis, capitulis 2phyllis, bracteis calycem aequantibus. *Braſil.*

ſcapigera Mart. 39. G. hirſutiſſima, caule ſimplici erecto, ſuperne aphyllo, foliis radicalibus lanceolatis, capitulis globoſis 3-5phyllis, bracteis ſubcriſtatis calycem aequantibus. *Braſil.*

Poſt n. 11. *macrorrhiza* Mart. 40. G. radice napiformi, caule dichotomo, foliis lanceolatis ſubtus villoſis, capitulis pedunculatis globoſis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

debilis Mart. 41. G. caule erecto baſi diviſo, foliis lineari-lanceolatis ſubtus villoſis, pedunculis elongatis filiformibus, capitulis globoſis, bracteis foliaceis, calyce tomentoſo brevioribus. *Braſil.*

ſericantha Mart. 42. G. radice lignoſa, caule erecto ſubſimplici, foliis lanceolatis ſubtus denſiſſime tomentoſis, ſummis verticillatis, pedunculis elongatis, calycibus ſericeis. *Braſil.*

mollis Mart. 43. G. caule erecto diviſo, foliis lanceolatis acutis incano-villoſis ſubſericeis, bracteis ovatis calyce brevioribus. *Braſil.*

rupeſtris Nees. 44. G. caule erecto diviſo, foliis linearibus acutis albo-villoſis, pedunculis elongatis, capitulis globoſis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.* (G. Schulteſia Mart.)

virgata Mart. 45. G. caule ramoſo virgato pubeſcente, foliis linearibus acutis glabris, capitulis ſpicatis alternis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

vaga Mart. 46. G. caule erecto dichotomo, foliis petiolatis ovato-oblongis acutis ſubtus arachnoideo-villoſis, capitulis pedunculatis ſubternis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

elegans Mart. 47. G. caule erecto dichotomo ferrugineo-pubeſcente, foliis petiolatis oblongis ſubtus venoſis flavido-villoſis, capitulis pedunculatis globoſis, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

incana Mart. 48. G. caule erecto ſimpliciusculo ſuperne aphyllo, foliis radicalibus oblongo-lanceolatis incano-villoſis, capitulis axillaribus terminalibusque, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.*

† *anguſtiflora* Mart. 49. G. glabra, caule gracili erecto ramoſo angulato, foliis linearibus anguſtiſſimis glaucis, ſpicis ſub-4ſtichis aphyllis laxis, bracteis breviſſimis, calyce corollino tubuloſo elongato. *Braſil.* Mart. nov. gen. t. 121.

pag. 824.

Poſt n. 21. *bicolor* Mart. 50. G. caule proſtrato ſtrigoſo, ramulis fuſcis, foliis lanceolatis utrinque attenuatis, capitulis hemiſphaericis ſeſſilibus, foliis floralibus

apice ſphacclatis, bracteis denticulato-alatis. *Braſil.*

proſtrata Mart. 51. G. caule ramoſo, foliis ſubcordato-ovatis acutis ſubtus villoſis, capitulis globoſis pedunculatis, bracteis foliaceis calyce brevioribus. *Braſil.*

demiſſa Mart. 52. G. caule procumbente 2fido foliisque lanceolatis acutis ſubtus pubeſcentibus, capitulis 2phyllis, bracteis criſtatis calyces aequantibus. *Braſil.*

G. *interrupta* habet ſtigma bilobum ſ. bifidum: ergo manet.

Poſt *Gomphrenam:*

PFAFFIA Mart.

* *Capitulis ſubſolitariis.*

gnaphalioides Mart. 1. Pf. caule fruticoſo foliisque ovato-oblongis mucronatis lanatis, capitulo globoſo 2phyllo terminali. *Braſil. Monte Video.* (Celoſia gnaphaloides L., Gomphrena gnaphaloides Vahl., lanata Poir.)

puberula * 2. Pf. caule erecto ramoſo foliisque oblongis acuminatis ſubpubeſcentibus, capitulis ovatis aphyllis longe pedunculatis, calycibus pubeſcentibus. *Braſil. Nov. Granat.* (Brandeſia puberula Mart., Achyranthes capituliflora Coll. hort. ripul. t. 18.)

velutina Mart. 3. Pf. caule ſimplici foliisque ſubrotundo-ovatis obtuſis fulvo-villoſiſſimis, capitulis ovatis pedunculatis ſubſolitariis. *Braſil.*

tomentoſa Mart. 4. Pf. caule foliisque ovatis acutis ſubrepando-dentatis ſubtus albo-tomentoſis, pedunculis ſimplicibus terminalibus elongatis, capitulis ſubglobooſis. *Ad fl. Platam.* Sello.

jubata Mart. 5. Pf. villoſiſſima, foliis lineari-lanceolatis, pedunculis ſimplicibus terminalibus, capitulis ſubglobooſis. *Braſil.*

glabrata Mart. 6. Pf. caule ramoſo glabro, nodis villoſis, foliis lanceolatis acuminatis elongatis, pedunculis ſimplicibus axillaribus, capitulis ovato-globoſis. *Braſil.*

** *Capitulis ſpicisve aggregatis.*

villoſa * 7. Pf. caule erecto dichotomo foliisque ſeſſilibus ovato-oblongis acutis ſubtus albo-villoſis, capitulis ſubternis diphyllis, calycibus glabriusculis. *Braſil.* (Brandeſia villoſa Mart.)

ireſinoides * 8. Pf. caule ſuffruticoſo ramoſo ferrugineo-hirſuto, foliis ovato-oblongis ſubtus fuſco-ſericeis, pedunculis ternis, capitulis ovatis minutis, calycibus longiſſime lanatis. *Nov. Granat.* (Alternanthera Kunth., Illecebrum ireſinoides Syſt. veg. 1. 818., Sertürnera Mart.)

rufa * 9. Pf. caule ramoſo rufo-hirſuto, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acutis hirſutis, pedunculis 8fidis, ſpicis ternis aphyllis oblongis. *Braſil.* (Brandeſia rufa Mart.)

ſericea Mart. 10. Pf. radice tuberoſa, caule ſimpliciusculo ſuperne nudo, foliis lanceolatis ſericeis, pedunculis

3fidis ſubcorymboſis, capitulis globoſis. *Braſil.* (Gomphrena ſericea et tuberoſa Syſt. veg. 1. 823.)

hirtula Mart. 11. Pf. pubeſcens, foliis linearibus, pedunculis terminalibus ſubternis, capitulis globoſis. *Braſil.*

glauca * 12. Pf. caule ramoſiſſimo foliisque lanceolatis glaucis glabriusculis, pedunculis trichotomis paniculatis, capitulis minutis ovatis, floribus polygamis. *Braſil.* (Gomphrena ſtenophylla Syſt. veg. 1. 823., Ireſine glomerata N. Entd. 2. p. 110., Sertürnera glauca Mart.)

MOGIPHANES Mart.

diffuſa Mart. 1. M. caule erecto ramoſiſſimo foliisque ovato-lanceolatis glabriusculis, pedunculis 3fidis, ſpicis cylindricis, bracteis calycibusque ariſtatis. *Braſil.*

ramoſiſſima Mart. 2. M. caule erecto ramoſiſſimo, ramis patulis foliisque lanceolatis acuminatis pubeſcentibus, capitulis oblongis pedunculatis ſolitariis aphyllis. *Braſil.*

braſilienſis Mart. 3. M. caule erecto ramoſo rufo-villoſo, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis pubeſcentibus, capitulis pedunculatis ovatis terminalibus. *Braſil.* (Gomphrena braſilienſis Jacqu., Philoxerus R. Br.) M. villoſa Mart. var.

ſtraminea Mart. 4. M. caule erecto ramoſo foliisque oblongis acuminatis pubeſcentibus, capitulis pedunculatis ovatis, ſepalis 3nerviis. *Braſil.* (Gomphrena braſilienſis L., patula Wendl.)

multicaulis Mart. 5. M. caule aſcendente ramoſiſſimo foliisque lanceolatis acutis ſubtus ſtrigilloſis, pedunculis ſubternis, capitulis oblongis baſi foliatis. *Braſil.*

hirtula Mart. 6. M. caule aſcendente diviſo foliisque ovatis acutis ſtrigilloſis, pedunculis ſolitariis elongatis, capitulis oblongis aphyllis. *Braſil. Monte Video.*

flaveſcens Mart. 7. M. caule ſubſcandente foliisque obovatis glabris, capitulis globoſis pedunculatis ſubſolitariis, calycibus glabris. *Nov. Granat.* (Alternanthera Kunth., Illecebrum Syſt. veg. 1. 819.)

HOPLOTHECA Nutt.

lanata Mart. 1. H. caule erecto ſubramoſo, foliis oblongo-lanceolatis ſubtus ramisque ſericeo-villoſis, pedunculis elongatis, capitulis ſubrotundis ſeſſilibus. *Amer. auſtr.* (Gomphrena lanata Kunth., Humboldtiana R. et Sch.)

lactea Mart. 2. H. caule ſuffruticoſo erecto, foliis ovatis pubeſcentibus ſubtus albidis, ſpicis numeroſis paniculatis. *Amer. tropic.* (Gomphrena lactea Cand.)

floridana Nutt. 3. H. caule erecto ſimplici glanduloſo, foliis ſeſſilibus lanceolatis acutis ſupra papilloſo-ſcabris ſubtus denſe ſericeo-lanatis, panicula virgata,

ſpicis ſeſſilibus. *Florida.* (Gomphrena Syſt. veg. 1. 824.)

tomentoſa Mart. 4. H. caule erecto villoſo, foliis ſubrotundis obtuſis ſubtus tomentoſo-lanatis, ſpicis pedunculatis oppoſitis. *Ad fl. Platam.* Sello.

ſericea Mart. 5. H. caule erecto foliisque lineari-lanceolatis acutis ſericeo-villoſis, ſpicis oppoſitis pedunculatis. *Braſil.* (Gomphrena ſericea Hofmannsegg.)

Poſt *Anrederam:*

BOUSSINGAULTIA Humb.

baſelloides Kunth. *Quito.* Frutex volubilis, foliis alternis ovalibus carnoſis integerrimis, floribus racemoſis albidis. Humb. nov. gen. 7. t. 645. b.

pag. 825.

Ad *Condaliam* Cav.

ſpinoſa * 3. C. ſpicis axillaribus oppoſitis, foliis confertis ſubſpathulato-linearibus glabris, pedunculis aggregatis nutantibus. *Rio grande.* Sello.

Poſt *Flüggeam* W.:

LICANIA Aubl.

incana Aubl. *Guiana.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ſubtus incanis, ſtipulis linearibus acuminatis, floribus ſpicatis albis. (Hedycrea Schreb. W.)

pag. 827.

Ad *Phylicam.*

Poſt n. 9. *ſquarroſa* Vent. 30. Ph. foliis lineari-lanceolatis patulis villoſis ſubtus incanis, floralibus longioribus, capitulis florum ſubrotundis, laciniis calycis erectis acuminatis. *C. B. S.*

pag. 828.

Poſt n. 22. *elliptica* Roxb. 31. Ph. foliis oppoſitis ellipticis rigidis ſubtus incano-villoſis concavis, ſtipulis ovatis, capitulis pedunculatis axillaribus villoſis. *Inf. Helenae.*

ramoſiſſima Cand. 32. Ph foliis alternis lanceolatis acutis ſuperne lucidis ſubtus incano-villoſis revolutis, ſtipulis ſubulatis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Inf. Helenae.* (Ph. rosmarinifolia Roxb.)

Ad Ph. *plumoſam.* (Ph. horizontalis Vent.)

pag. 829.

Ad *Theſium.*

Poſt n. 4. †*divaricatum* Jan. 26. Th. caule ramoſiſſimo, ramis fructiferis divaricatis, foliis linearibus, bracteis

ternis carnoſo-triquetris ſubulatis, fructibus ſubrotundis. *Ora maris adriatici. Hiſpan. auſtr.*

roſtratum Mert. Koch. 27. Th. caule ſimplici, foliis linearibus inerviis, racemis ſimplicibus demum comoſis, bracteis ſolitariis, fructibus ſubgloboſis calyce duplo brevioribus. *Bavaria auſtr.*

pag. 831.

Ad *Leptomeriam* R. Br.

Poſt n. 2. *xiphoclada* Sieb. 9. L. ramis angulatis compreſſis eſquamatis, floribus glomeratis, bracteis caducis, laciniis calycis linearibus revolutis. *Nov. Holl.*

Ad *Hamiltoniam ſarmentoſam* * (Comandra livida Richardſ., non ſarmentoſa.)

pag. 833.

Ad *Muſam.*

M. *roſacea* Jacqu. (M. ornata Roxb.)
M. *glauca* Roxb. (M. nepalenſis Wallich.)

pag. 834.

Ad *Heliconiam.*

braſilienſis Hook. 5. H. foliis cordato-oblongis acutis glabris, ſcapo erecto, nectarii folio ſuperiore convoluto. *Braſil.*

buccinata Roxb. 6. H. aculis, foliis lanceolatis lucidis, ſpadice centrali flexuoſo pubeſcente, ſpathis bifariis divergentibus, nectario acuto. *Inſ. Molucc.*

Ad *Rauwolfiam.*

ſumatrana Jack. 12. R. foliis verticillatis petiolatis elliptico-oblongis integerrimis glaberrimis, pedunculis terminalibus umbelliferis, fauce corollae villis clauſa. *Sumatra.* Malayan miſc. 1. n. 2. 22.

pag. 835.

Ad *Alyxiam* Banks.

A. *obtuſifolia* R. Br. (A. lucida Wallich.) *Ind. or.*
A. *ſtellata* R. et Sch. habitat et in *Inſ. Molucc.*
A. *ſcandens* R. et Sch. (A. coriacea Wallich.) *Inſ. freti Malacc.*

†*glauceſcens* Wallich. 8. A. foliis oppoſitis oblongis coriaceis ſupra nitidis ſubtus glaucis, corymbis axillaribus multifloris, fauce corollae coronata. *Inſ. freti Malacc.*

Ad *Melodinum* Forſt.

phillyreoides Labill. 2. M. erectus, foliis oblongis obtuſiusculis coriaceis, pedunculis trichotomis ſubcorymboſis folia ſuperantibus. *Nov. Caledon.*

monogynus Carey. 3. M. ſcandens, foliis oblongo-lanceolatis elongatis glaberrimis, paniculae ramis oppoſitis, floribus 1gynis. *Silhet, prov. Ind. or.* Bot. reg. 834.

pag. 843.

Ad *Hoyam* R. Br.

Poſt n. 1. †*pallida* Lindl. 7. H. foliis ovato-lanceolatis acuminatis carnoſis venoſis, umbella compacta, laciniis corollae obtuſiusculis. *Patria?* Bot. reg. 951.

†*lanceolata* Wall. 8. H. foliis lanceolatis acuminatis, umbellis paucifloris, laminis gynoſtegii lineari-oblongis obtuſis ſubtus ſulcatis. *Nepal.*

†*linearis* Wall. 9. H. foliis linearibus obtuſis carnoſis utrinque cauleque filiformi denſe piloſis. *Nepal.*

Ad *Pergulariam.*

Poſt n. 4. *ſanguinolenta* Lindl. 14. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glaberrimis, cymis multifloris folio brevioribus, calycibus tubum corollae intus glabrae aequantibus. *Senegambia.* Bot. mag. 2532.

pag. 846.

Ad *Gonolobum* Mx.

Poſt n. 22. *floccoſus* Bertol. 26. G. foliis cordatis acuminatis ſubtus tomentoſis, floribus glomeratis, folliculis echinatis. *Guadalupa.*

pag. 848.

Ad *Aſclepiadem.*

Poſt n. 24. *melliodora* Hilar. 39. A. caule ſimplici erecto, foliis petiolatis linearibus elongatis acutis ſubtus pubeſcentibus, umbellis lateralibus multifloris. *Rio grande.*

pag. 851.

Ad *Macroſcepim longifloram* * (Schubertia longiflora Mart.) *Braſil.*

Ad *Cynanchum.*

Poſt n. 2. *longifolium* Martens. 33. C. herbaceum volubile, foliis cordatis acuminatis nervoſis, laciniis corollae acutis, coronae exterioribus denis alternatim lanceolatis acutis et ſubcrenatis obtuſis. *Ager venetus.*

pag. 852.

Poſt n. 22. *multiflorum* * 34. C. volubile hirſutum, foliis cordato-oblongis acutis utrinque pubeſcentibus, umbellis multifloris, laciniis coronae cum antheris appendiculatis ope calli cohaerentibus. *Braſil.* (Schubertia multiflora Mart.)

pag. 853.

Poſt *Cynanchum*:

DITASSA R. Br.

* *Erectae.*

decuſſata Mart. 1. D. foliis adnatis confertis cordato-ovatis revolutis rugoſis hirtis, pedunculis multifloris ſubcymoſis. *Braſil.* D. paſſerinoides Mart. var.

acerosa Mart. 2. D. foliis oppoſitis verticillatisque linearibus ſubulatis villoſis, floribus umbellatis. *Braſil.*

laevis Mart. 3. D. ſuberecta, ramis laxis, foliis breviter petiolatis lineari-lanceolatis mucronatis utrinque glabris, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus. *Braſil.*

** *Volubiles.*

obcordata Mart. 4. D. foliis petiolatis obcordato-ſubrotundis mucronatis reflexo-complicatis, floribus ſubſolitariis. *Braſil.*

mucronata Mart. 5. D. foliis breviter petiolatis oppoſitis ovato-lanceolatis mucronatis revolutis pubeſcentibus, floribus umbellatis. *Braſil.*

retuſa Mart. 6. D. foliis petiolatis obovatis retuſis mucronatis glabris margine planis, floribus umbellatis. *Braſil.*

linearis Mart. 7. D. foliis breviter petiolatis linearibus mucronatis planis glabris, umbellis paucifloris, pedicellis flores aequantibus. *Braſil.*

pag. 854.

Ad *Oxypetalum* R. Br.

* *Volubilia.*

riparium Kunth. 1.
Gothofreda R. et Sch. 2. } v. p. 854.

Bankſii R. et Sch. 3. O. foliis cordato-ovatis acutis pubeſcentibus, pedunculis multifloris, laciniis corollae reflexis, retinaculis antherarum apice nudis. *Braſil.* Mart. nov. gen. t. 29.

appendiculatum Mart. 4. O. foliis cordato-oblongis acutis pubeſcentibus, cymis ſub-4floris, laciniis corollae erecto-patentibus, retinaculis antherarum apice membranaceo-appendiculatis. *Braſil.*

megapotamicum * 5. O. foliis cordato-lanceolatis acuminatis laevibus, pedunculis cymoſis incano-pubeſcentibus. *Rio grande.*

Berterianum * 6. (n. 3. ſyſt.)

montanum Mart. 7. O. foliis lanceolatis acutis, pedunculis multifloris, laciniis corollae ſurſum reflexis, foliolis coronae acutis, retinaculis apice ſagittato-dilatatis. *Braſil.*

** *Erecta herbacea.*

folioſum Mart. 8. O. foliis cordato-ovatis ſubſeſſilibus confertis, pedunculis multifloris, laciniis corollae erectis, foliolis coronae bilobis. *Braſil.*

erectum Mart. 9. O. foliis cordato-ovatis acutis pubeſcentibus, pedunculis 1floris, laciniis corollae patentibus, foliolis coronae 2dentatis. *Braſil.*

ſtrictum Mart. 10. O. foliis cordato-lanceolatis ſubſeſſilibus, pedunculis 1floris, foliolis coronae 3fidis, antherarum membrana elongata. *Braſil.*

capitatum Mart. 11. O. foliis lanceolatis acutis villoſis, floribus in umbellam globoſam congeſtis, foliolis coronae bifidis. *Braſil.*

pag. 855.

Poſt *Araujam* Brot.:

PHYSIANTHUS Mart.

albens Mart. 1. Ph. volubilis pubeſcens, foliis baſi truncata oblongis ſubtus albo-pruinoſis, cymis dichotomis, lobis coronae integerrimis. *Braſil.*

megapotamicus * 2. Ph. volubilis glaber, foliis ſagittato-cordatis acuminatis, pedunculis 1floris, lobis coronae denticulatis. *Rio grande.* Sello.

Ad *Aſtephanum cubenſem* Kunth. (Periploca parviflora W. herb., Humboldtiana R. et Sch.)

pag. 856.

Ad *Gentianam.*

Poſt n. 4. *volubilis* Don. 70. G. volubilis, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis 3nerviis, floribus axillaribus ſolitariis, laciniis calycis lineari-ſubulatis, corollae campanulatae ovatis acutis, antheris ovalibus. *Nepal.*

capitata Hamilt. 71. G. erecta ſimplex, foliis ovali-oblongis mucronatis enerviis, floribus terminalibus ſeſſilibus aggregatis bracteatis, laciniis calycis membranaceis ovatis acutis, corollae tubuloſae rotundatis. *Nepal.*

G. *unalaſcenſis* Ledeb. hinc ad p. 859. poſt n. 56. eſt transferenda.

pag. 857.

Poſt n. 23. *depreſſa* Don. 72. G. acaulis, foliis confertis elliptico-oblongis acutis cartilagineo-ferratis, flore ſolitario ſeſſili, laciniis calycis corollaeque campanulatae ovatis mucronatis. *Nepal.*

pag. 858.

Poſt n. 43. *Gebleri* Ledeb. 73. G. caule ſimplici erecto, foliis lineari-lanceolatis elongatis, floribus aggregatis terminalibus, corolla campanulata ſulcata. *Imaus.* Reichenb. ic. t. 271.

pag. 859.

Poſt n. 52. *decemfida* Don. 74. G. caule ramoſo diffuſo, foliis radicalibus elliptico-oblongis mucronatis, caulinis

linis minimis lineari-lanceolatis carinatis apice reflexis, floribus terminalibus ſubſolitariis, laciniis calycis lanceolatis recurvato-mucronatis, corollae alternis craſſioribus ariſtatis. *Nepal.*

Poſt n. 56. *plebeja* Ledeb. 75. G. caule ſimplici teretiusculo, foliis ovatis acutiusculis ſub-5nerviis, laciniis calycis latitudine inaequalibus, corollae erectis. *Sibir.*

aleutica Chamiſſ. 76. G. caule 4gono ſubramoſo, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floralibus elongatis, laciniis corollae hypocrateriformis 4-(ſub-5-)fidae lanceolatis apice denticulatis. *Inſ. Aleut.* (G. unalaſcenſis Ledeb. Syſt. veg. 1. p. 856.)

Rurikiana Chamiſſ. 77. G. caule 4gono ramoſo, foliis lanceolatis ſub-3nerviis, floribus longe pedunculatis, laciniis calycis inaequalibus, corollae ſetaceo-acuminatis. *Ad oras freti Bering. Aſiae et Amer. arctic.*

pag. 860.

Poſt n. 64. *floribunda* Don. 78. G. caule erecto tereti ramoſo, foliis connatis lanceolatis acutis pubeſcentibus, floribus racemoſis, corollae villoſae laciniis ovatis acutis. *Nepal.*

Ad G. *Amarellam.* G. lancifolia Perſ., obtuſifolia Reichenb., ſpathulata Bartl., montana Nees. varr.

pag. 861.

Ad *Swertiam.*

Poſt n. 6. †*anguſtifolia* Don. 17. Sw. caule erecto 4gono ramoſiſſimo, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus pedunculatis, laciniis calycis linearibus acutis corolla longioribus. *Nepal.*

multicaulis Don. 18. Sw. caulibus caeſpitoſis, foliis ſpathulato-lanceolatis, pedunculis 1floris, laciniis calycis ovalibus obtuſis corolla brevioribus. *Emodi montes.*

pag. 862.

Ad *Evolvulum hirſutum.* E. *heterophyllus* Labill. t. 29. *Nov. Caledon.* var.

pag. 863.

Poſt *Reinwardtiam:*

NEUROPELTIS Wallich.

racemoſa Wall. *Inſ. freti Malacc.* Frutex diffuſus, foliis petiolatis ternatis ovatis acutis carnoſis, floribus racemoſis, bracteis orbiculatis membranaceis reticulato-venoſis.

pag. 864.

Ad *Cuscutam.*

Ante n. 1. *Epilinum* Weih. 22. C. caule simplici, glomerulis florum ebracteatis, corolla urceolata, dentibus abbreviatis, squamis appressis, staminibus inclusis. *Ad Linum in Germania.*

Ad C. *monogynam* Vahl. dele patriam *Europ.* et syn. C. Epilinum Weih.

pag. 865.

Ad *Hydrolcam.*

Post n. 3. *megapotamica* * 7. H. caule herbaceo glandulose-villoso, foliis lanceolatis utrinque attenuatis hirsutis, corymbis terminalibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 866.

Banisya Baumg. delenda, redit syst. 2. 373., *Gouffeia* vero Cand. cum *Brachystemmate* Don. syst. 2. 399.

pag. 867.

Ad *Panacem.*

Post n. 6. *glabratus* Kunth. 10. P. arboreus, foliis quinatis glabris, foliolis oblongis utrinque attenuatis integerrimis, umbellulis sub-3carpis racemoso-paniculatis. *Nov. Granat.*

P. *splendens* Kunth. neutiquam ad P. *speciosum* pertinet, cum foliola habeat argute duplicato-dentata supra hispidula subtus argenteo-sericea, sed dubia species, cum nec flores nec fructus affuerint.

vinosus Schlechtend. 11. P. arboreus, foliis subseptenatis subtus racemisque ferrugineo-sericeis, foliolis obovato-oblongis mucronatis revolutis integerrimis, umbellis paniculatis. *Brasil.* Sello.

macrocarpus Schlechtend. 12. P. arboreus, foliis subseptenatis subtus ochraceo-tomentosis, foliolis obovato-ellipticis integerrimis revolutis, umbellis paniculatis. *Brasil.* Sello.

Post *Picramniam* Sw.:

MENISCOSTA Blum.

scandens Blum. *Java.* Frutex scandens glaber, foliis oblongis mucronatis, floribus paniculatis axillaribus.

pag. 868.

XANTHOSIA Rudg.

pilosa Rudg. 1. X. foliis lanceolatis sinuato-dentatis subtus dense stellato-tomentosis, ramis hirtis. *Nov. Holl.*

montana Sieb. 2. X. foliis 3fidis supra hispidiusculis subtus stellato-tomentosis, ramis hispidiusculis flexuosis. *Nov. Holl.*

DULONGIA Kunth.

acuminata Kunth. *Popayan in Columbia.* Arbuscula foliis membranaceis oblongis acutis apice serratis, e quorum nervo medio pagina superiore racemuli florum nascuntur. Humb. nov. gen. 7. t. 623. (Phyllonoma rufcifolia W. herb.)

pag. 869.

Ad *Eryngium*.

Poſt n. 11. *pandanifolium* Schlechtend. 56. E. foliis linearibus obſolete denticulato-ſpinuloſis, caule paniculato polycephalo, capitulis ovatis coloratis inermibus, paleis ovatis acuminatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam.* Sello.

Priſtis Schlechtend. 57. E. foliis linearibus anguſtiſſimis ſtrictiſſimis duplicato-ſpinoſo-ciliatis, caule paniculato polycephalo, paleis ſubulato-ſpineſcentibus calycibusque ſcabris. *Rio grande.* Sello.

canaliculatum Schlechtend. 58. E. foliis linearibus canaliculatis nitidis horizontaliter ſpinoſo-ciliatis, caule paniculato polycephalo, capitulis globoſis ſubinermibus, involucris connatis, bracteis calycibusque laevibus. *Braſil.* Sello.

Sanguiſorba Schlechtend. 59. E. foliis enſiformi-linearibus obtuſiusculis retrorſum ciliatis, capitulis paucis coloratis, paleis ſubulatis rigidis calycibusque laevibus. *Rio grande.* Sello.

luzulaefolium Schlechtend. 60. E. foliis linearibus acutis denticulatis baſi ſetoſo-ciliatis, capitulis paucis inermibus globuloſis, paleis calycibusque ſcabriusculis. *Braſil.* Sello.

junceum Schlechtend. 61. E. foliis linearibus anguſtiſſimis acutis canaliculatis ſubdenticulatis, capitulis paucis globoſis ſubinermibus, involucris connatis, paleis calycibusque laevibus. *Braſil.* Sello.

eriophorum Schlechtend. 62. E. foliis linearibus inermibus integerrimis obtuſis baſi villoſo-fimbriatis, capitulis paucis ovato-globoſis inermibus coloratis, paleis elongatis calycibusque laevibus. *Ad fl. Platam et magnum Amer. auſtr.* Sello.

pag. 871.

Poſt n. 26. *floribundum* Schlechtend. 63. E. foliis enſiformibus acuminatis ſpinuloſo-ſerratis ciliatis, caule polycephalo, paleis ſubulatis ſcabris. *Braſil.* Sello.

Serra Schlechtend. 64. E. foliis enſiformibus ſpinoſo-ſerratis ciliatis, caule polycephalo, involucris ſpinoſo-dentatis, paleis ſubulatis laevibus. *Monte Video.* Sello.

uncinatum Schlechtend. 65. E. foliis ſpathulato-lanceolatis recurvo-ſpinoſo-dentatis, capitulis paucis, involucris ſpinoſo-pinnatifidis, paleis tricuſpidatis ſcabris. *Braſil.* Sello.

elegans Schlechtend. 66. E. radice globoſa, foliis lineari-lanceolatis tricuſpidatis ſpinoſo-ciliatis, caule polycephalo, involucris paleisque tricuſpidatis. *Monte Video. Rio grande.* Sello.

ciliatum Schlechtend. 67. E. radice craſſa, foliis obovato-lanceolatis pectinato-fimbriato-ciliatis, capitulis pauciſſimis ovalibus coloratis, paleis ſubulatis laevibus. *Rio grande.* Sello.

pag. 874.

Ad *Saniculam.*

S. *maritandica.* (S. liberta Schlechtend.)

†*hermaphrodita* Don. 4. S. foliis ternatis glabris, foliolis ovatis utrinque attenuatis lobatis ſerratisque, umbella 3fida ſub-5flora, floribus omnibus ſeſſilibus. *Nepal.*

elata Don. 5. S. foliis ternatis tripartitisve glabris, foliolis late ovatis acutis baſi cuneatis lobatis ſerratisque, umbellis 3fidis, floribus ♂ pedicellatis. *Nepal.*

Ad *Bazoam coriaceam* Lag. (Afteriſcium chilenſe Chamiſſ. in Linnaea p. 354. l. 254.) *Chili.*

pag. 875.

Ad *Hydrocotylen.*

H. *umbellata.* (H. modeſta Schlechtend.)

Poſt n. 10. *Barbaroſſa* Schlechtend. 61. H. foliis orbiculatis 8lobis crenatis rufo-hirſutis, umbellis longe pedunculatis multifloris, caule radicante. *Braſil.*

Aſterias Schlechtend. 62. H. foliis petiolatis 3-5lobis piloſiusculis, lobis lanceolatis duplicato-ſerratis, umbellis longe pedunculatis multifloris, fructibus tuberculatis, caule decumbente. *Braſil.*

Ad H. *aſiaticam.* (H. Thunbergiana * n. 22.)

pag. 876.

Poſt n. 19. *leucocephala* Schlechtend. 63. H. foliis reniformi-orbiculatis ſub-9nerviis duplicato-dentatis utrinque piloſiusculis, umbellis globoſis multifloris, fructibus laevibus, caule radicante. *Braſil.*

Ad H. *capitatam* Thuars. (H. hiſpida Hamilt. Don.)

pag. 877.

Ad H. *macrodontem* * H. calliodus Schlechtend. var. glabra.

Poſt n. 36. *Chamaemorus* Schlechtend. 64. H. foliis reniformibus ſub-7lobis nervoſis duplicato-crenatis glabris, pedunculis brevibus petiolisque retrorſum hiſpidis, umbellis capitatis multifloris, fructibus reſinoſo-punctatis, caule repente. *Chili.* Chamiſſo.

Ad H. *ſibthorpioidem* Lam. (H. tenella Don.) *Nepal.*

pag. 878.

Ad H. *plantaginem* * (H. montana Schlechtend.)

pag. 879.

Ad *Trachymenem* Rudg.

ericoides Sieb. 6. Tr. foliis linearibus acutis ſubcarnoſis patentibus, ramulis flexuoſis hirſutiusculis, umbellis paucifloris ſubcompoſitis. *Nov. Holl.*

buxifolia Sieb. 7. Tr. foliis ſubcordato-ovatis 3nerviis ſubſeſſilibus, umbella decompoſita, caule fruticoſo. *Nov. Holl.*

pag. 880.

Ad *Bowleſiam* R. et P.

geraniifolia Schlechtend. 6. B. ſtellato-pubeſcens cinerea, foliis cordato-reniformibus 7lobis, lobis obtuſis 3dentatis, pedunculis abbreviatis trifloris, caule erecto. *Chili.*

Ad *Bupleurum.*

B. *arboreſcens* L. (Heteromorpha arboreſcens Schlechtend.)

pag. 881.

Poſt n. 7. *Mundtii* Schlechtend. 34. B. ſuffruticoſum ramoſiſſimum, foliis linearibus-ſetaceis elongatis, umbellis 2-3radiatis, involucellis 5phyllis umbellulas aequantibus, fructibus laevibus. *Afric. auſtr.*

pag. 882.

Odontites 26. B. caule ramoſo, ramis divaricatis, foliis linearibus 3nerviis, involucellis lanceolatis cuſpidatis elongatis pellucidis nervoſo-venoſis. *Sicilia. Neapol. Gallia auſtr.* (B. divaricatum *α.* Lam., veronenſe Turr., Gerardi Pollin.)

ariſtatum Bartl. Reichenb. 35. B. caule erecto ramoſo, ramis patulis, foliis linearibus-lanceolatis 3nerviis, involucellis ovato-lanceolatis ariſtatis opacis 3nerviis ſubvenoſis. *Europ. auſtr.* (E. baldenſe Turr.)

glumaceum Sibth. Sm. 36. B. caule gracili erecto ramoſo, foliis linearibus anguſtiſſimis, involucellis ovatis pellucidis cuſpidatis 3nerviis eveniis. *Graecia. Creta.* (B. gracile Urv.)

junceum 37. B. caule ramoſo paniculato, foliis amplexicaulibus linearibus-lanceolatis acuminatis ſtriatis, involucris umbellae pauciradiatae inaequalibus, involucellis lineari-ſubulatis pedicellisque fructu brevioribus, coſtis acutis. *Ad mare adriatic. Gallia. Italia.*

Gerardi Jacqu. 38. B. caule ramoſo paniculato, foliis amplexicaulibus linearibus 3-5nerviis, umbellae radiis quinis inaequalibus, involucellis linearibus cuſpidatis ſubaequalibus umbellulas ſuperantibus, pedicellis fructus aequantibus, coſtis acutiusculis. *Gallia. Italia. Auſtria.*

baldenſe Hoſt. 39. B. caule ramoſo, foliis linearibus-lanceolatis acuminatis 5nerviis, involucellis linearibus cuſpidatis pedicellisque fructus ſubaequantibus, coſtis ſubalatis, valleculis ſtriatis. *Auſtria. Hungaria. Transſylvan. Tauria.*

pag. 883.

Ad B. *tenuiſſimum*. (B. junceum Pollich., Pollichii Gmel.)

† *tenue* Hamilt. Don. 40. B. caule gracili ramoſo, foliis linearibus mucronatis 5nerviis, ſupremis lanceolatis, umbellis ſub-4fidis, involucellis ellipticis mucronatis fructus ſubaequantibus. *Nepal.*

Ad *Hermanda*.

rudiſſima Reichenb. 6. H. foliis radicalibus obovato-oblongis lobata ſpinuloſo-ciliatis venoſis ſubtus aſperis, petiolis craſſis vaginantibus, umbellis compoſitis longe pedunculatis. C. B. S. (Lichtenſteinia lacera Schlechtend. in Linnaea, 1. p. 394.)

pag. 884.

Ad *Seſeli varium* Trevir. patria *Auſtria*.

pag. 885.

Ad *Seſeli dubium* Schk. (Selinum lineare Schum., Cnidium venoſum Koch.)

pag. 886.

Ad *Siſonem*.

Poſt n. 4. † *trinervius* Hamilt. Don. 16. S. caule erecto tereti nudiusculo, foliis radicalibus pinnatis glabris, foliolis lanceolatis acutis integerrimis 3nerviis, involucro 5phyllo, involucellis lanceolatis ariſtatis. *Nepal.*

pag. 887.

Poſt n. 9. † *Guſſonii* * 17. S. caule ſimpliciusculo, foliis oppoſitis ſeſſilibus 3partitis glabris, laciniis oblongis acutis mucronato-dentatis, pedunculis 2fidis, involucro 2phyllo exili, floſculis ♂ pluribus, umbella pauciflora. *Patria?*

pag. 888.

Ad *Cnidium* Guſſon.

Ad Cn. *Silaum* * (Silaus pratenſis Beſſ. Koch.)

Poſt n. 10. *ſuffruticoſum* Schlechtend. 11. Cn. caule ſuffruticoſo ramoſo, ramis rigidis teretibus, foliis petiolatis 2pinnatis ſucculentis glabris, foliolis oblongis obtuſiusculis inciſis, involucris ſub-3phyllis, fructibus ovalibus laevibus 5alatis. *C. B. S.* (Conium ſuffruticoſum Berg.)

pag. 890.

Ad *Oenanthem interruptam* Thunb. (Anneſorrhiza capenſis Schlechtend.)

Ad *Oenanthem inebriantem* Thunb. (Lichtenſteinia pyrethrifolia Schlechtend.)

Ad *Oenanthem obscuram* * (Lichtensteinia? 5fida Schlechtend.)
Ad *Meum heterophyllum* Mönch. (Critamus heterophyllus Koch.)

pag. 891.

Ad *Meum inundatum* * (Helosciadium inundatum Koch.)

pag. 892.

Ad *Cachrys alatam* M. B. Affinis est Prangos pabularia Lindl. ex India septentrionali, diversa foliis glabris. Quarterly journ. of scienc. vol. 18. n. 37.

pag. 895.

Ad *Thysselium palustre* Hofm. (Pencedanum paluſtre Mönch. Koch.)
Ad *Caucalin grandiflorum*. (Orlaya Hofm., Platyspermum Koch.)

pag. 898.

Ad *Daucum*.

montevidensis Link. 17. D. caule erecto foliisque decompositis hirsutis, foliolis linearibus abbreviatis, involucro foliaceo decomposito umbellam superante, partialibus 5fidis, floribus exiguis albidulis, setis fructuum glochidatis. *Monte Video.*

† *depressus* * 18. D. acaulis, foliis radicalibus 2pinnatis pubescentibus, foliolis multipartitis tenuissimis, laciniis linearibus mucronatis, scapis caespitosis filiformibus villosis folia superantibus, involucro sub-5phyllo pinnatifido. *Emodi montes.* (Athamanta depressa Don.)

Ad *Torilin* Gärtn.

† *elata* * 10. T. caule elato ramoso tereti retrorsum hispido, foliis longe petiolatis decompositis, foliolis lanceolatis pinnatifidis, extremis elongatis, involucro polyphyllo, fructibus ovatis setosis. *Nepal* (Caucalis elata Don.)

pag. 899.

Ad *Athamantam*.

gigantea Don. 9. A. caule elato sulcato ramoso, foliis supradecompositis glabris, foliolis ovatis inciso-serratis aristatis, involucro polyphyllo, fructibus ovatis pubescentibus. *Nepal.*

Ad A. *Libanotida*. (Seseli Libanotis Koch.) (Ligusticum Gmelini Chamiss. Gmel. sib. 1. t. 44. olim L. vaginatum mihi, est varietas polymorphae hujus speciei.)

Ad A. *Matthioli* Wulf. (Pimpinella anethifolia Don.) *Nepal.*

Post n. 5. † *teres* Don. 10. A. caule simplici stricto tereti laevi, foliis bipinnatis glabris, foliolis pinnatifidis, laciniis linearibus acutis canaliculatis, involucro 5phyllo brevi, involucellis polyphyllis radios aequantibus. *Nepal.*

pag. 900.

Ad *Athamantam tortuosam* * (Bubon aphyllus Schlechtend.) *C. B. S.*

pag. 901.

Ad *Scandicem.*

brachycarpa Guſſon. 7. Sc. caule humili ramoſo, ramis divaricatis, foliis ternato-decompoſitis glabris, foliolis linearibus obtuſiusculis ciliatis, fructibus ſubcylindricis, ſtylis convergentibus. *Sicil.*

pag. 902.

Ad *Myrrhida.*

Poſt n. 10. *longiſtylis* Torr. 23. M. caule erecto laevi, foliis 2ternatis, foliolis ovatis inciſo-lobatis dentatis, umbella 3-4radiata, involucro ſub-3phyllo, fructibus hiſpidis baſi attenuatis, ſtylis ſtrictis elongatis. *Nov. Caeſar.*

pag. 903.

Poſt n. 20. *gracilis* * 24. M. caule laevi ramoſo, foliis triplicato-pinnatifidis, foliolis lanceolato-linearibus acutis, involucellis 5phyllis, fructibus ovato-oblongis acutangulis. *Patria?* (Chaerophyllum Cyminum Fiſch., gracile Beſſ. Trevir.)

pag. 905.

Ad *Sium.*

S. *lancifolium* M. B. habet ramos ſulcatos.

Ad S. *anguſtifolium.* (Berula anguſtifolia Koch.)

Ad S. *nodiflorum* et *repens.* (Heloſciadium Koch.)

craſſipes * 26. S. caule baſi radicante aſcendente, foliis pinnatis, foliolis ovatis dentatis, umbellis 3fidis, pedicellis demum baſi incraſſatis connatis. *Corſica.* (Heloſciadium Koch. Reichenb. ic. t. 218.)

Ad S. *Falcariam.* (Critamus agreſtis Beſſ. Koch.)

pag. 906.

Ad S. *Bulbocaſtanum* * (Carum Bulbocaſtanum Koch.)

pag. 907.

Ad *Conium.*

Arracacha Hook. 3. C. caule tereti ſtriato glabro, foliis impari-pinnatis amplis laevibus, foliolis bijugis late ovato-oblongis pinnatifidis inciſo-ferratis, involucro nullo, involucellis oligophyllis, flosculis centralibus ſeſſilibus abortientibus. *Ad Bogotam Nov. Granat.* Hook. exot. fl. t. 152.

Ad *Liguſticum.*

Poſt n. 4. †*nepalenſe* Don. 22. L. caule erecto ſimplici, foliis pinnatis, foliolis ovatis utrinque attenuatis inciſo-

ferratis nervosis, infimis 3partitis, involucellis polyphyllis. *Nepal.*

Ad L. *peloponnesiacum* Scop. (Molopospermum Koch.)

Ad L. *Cervariam* * (Peucedanum Lapeyr. Koch.)

pag. 909.

Ad *Selinum.*

Ad S. *australiacum* Jacqu. et *Oreoselinum* Scop. (Peucedanum Koch.)

S. *lineare* Schum. huc non pertinet sed ad *Seseli dubium* Schk. p. 885. Hujus loco ponendum S. *rablense* * (Peucedanum Koch.)

pag. 910.

Post n. 14. †*stellatum* Don. 17. S. caule erecto ramoso, foliis pinnatis glabris, foliolis ovatis mucronatis 3lobis inciso-dentatis, involucro sub-2phyllo, radiis umbellae pubescentibus, involucellis maximis coloratis. *Nepal.*

pag. 911.

Ad *Peucedanum.*

Post n. 12. †*virgatum* Schlechtend. 18. P. caule fruticoso ramoso, foliis pinnatis glabris subcoriaceis, foliolis lanceolatis integerrimis margine revolutis mucronatis, involucris abbreviatis polyphyllis. *C. B. S.*

pag. 912.

Ad *Heracleum.*

H. *asperum* M. B. in *alpibus bavaricis* inventum fertur.

Post n. 8. *nepalense* Don. 18. H. caule elato sulcato hirsuto, foliis 2jugis villosis, foliolis lobatis obtusis serratis, floribus flavidis aequalibus. *Emodi montes.*

pag. 913.

Ad *Pastinacam.*

Post n. 5. *ambigua* Torr. 11. P. caule elato subangulato, foliis pinnatis glabris, foliolis linearibus subintegerrimis rigidis subtus glaucis, umbella terminali subsolitaria, involucellis subulatis. *Nov. Caesar.* (Oenanthe ambigua Nuttall.)

pag. 916.

Ad *Angelicam pratensem* M. B. (Ostericum palustre Besser. Koch.)

Ad *Imperatoriam verticillarem* Cand. (Peucedanum verticillare Koch.)

Ad *Imper. Chabraei* * (Peucedanum Carvifolia Vill. Koch., Selinum podolicum Besser.)

pag. 917.

Ad *Thapſiam garganicam.* (Ferula neapolitana Tenor.)

pag. 920.

Ad *Chenopodium.*

Poſt n. 23. *giganteum* Don. 55. Ch. caule elato angulato ramoſo, foliis inferioribus ovatis dentatis, ſuperioribus oblongis obtuſis mucronatis ſubintegerrimis, ſpicis racemoſis foliоſis axillaribus. *Nepal.*

pag. 928.

Ad *Amarantum curvifolium* * Patria: *Caucaſus.*

pag. 930.

Ad *Microtecam debilem* Sw. (Galenia celoſioides *, Aphananthe celoſioides Link.)

pag. 931.

Ad *Chailletiam* Cand.

toxicaria Don. 5. Ch. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis undulatis integerrimis glabris coriaceis, racemis paniculatis, fructibus pubeſcentibus. *Afric. occ.*

erecta Don. 6. Ch. foliis oblongo-lanceolatis obtuſis emarginatis glabris coriaceis integerrimis, floribus axillaribus, fructibus pubeſcentibus. *Afric. occ.*

pag. 933.

Ad *Viburnum.*

Poſt n. 6. *cotinifolium* Don. 33. V. foliis ovato-oblongis integerrimis utrinque ſtellato-tomentoſis ſubtus ramulisque cinereis, cymis terminalibus lanatis. *Nepal.*

cylindricum Hamilt. 34. V. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis integerrimis ſubtus ramulisque pubeſcentibus, cymis compoſitis tomentoſis, corollae tubuloſae limbo breviſſimo 5dentato. *Nepal.*

punctatum Hamilt. 35. V. foliis ovato-oblongis mucronatis integerrimis utrinque glabris, cyma terminali ſeſſili patente. *Nepal.*

pag. 934.

Poſt n. 16. *Mullaha* Hamilt. 36. V. foliis ovatis acuminatis remote ſerratis ſubtus ramisque denſe tomentoſis, cymis compoſitis patentiſſimis, dentibus calycis abbreviatis. *Nepal.*

nervoſum Don. 37. V. foliis cordatis acuminatis ſerratis nervoſis ſubtus ramulisque ſtellato-tomentoſis, pedunculis terminalibus ternis cymoſis paucifloris. *Nepal.*

pag. 936.

Ad *Rhoëm.*

Ad Rh. *Vernicem* del. patria *Japonia.* (Rh. venenata Cand.)

Poſt n. 5. *juglandifolia* Humb. 50. Rh. foliolis ſub-6jugis baſi inaequaliter ovato-oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, petiolo teretiusculo ſubtomentoſo, panicula ramoſiſſima bracteata, calycibus glabris. *Nov. Granat.*

vernicifera Cand. 51. Rh. foliolis 5jugis ſeſſilibus oblongis acutis utrinque tomentoſis, petiolo teretiusculo, panicula terminali. *Japonia. Nepal.* (Rh. Vernix Thunb., juglandifolium Wall. Don.)

†*perniciosa* Kunth. 52. Rh. foliolis 7-8jugis longiſſime petiolatis rhombeo-ovatis membranaceis glabris reticulato-venoſis, petiolo teretiusculo. *Nov. Hiſpan.* Nec flores nec fructus viſi.

acuminata Cand. 53. Rh. foliolis 3-4jugis oblongis acuminatis ramulisque glabris ſubtus parallele venoſis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Nepal.*

pag. 937.

Ad Rh. *javanicam.* (Rh. *Amela* Don.) *Nepal.*

fraxinifolia Don. 54. Rh. foliolis 7jugis oblique lanceolatis acuminatis ſerratis glabris lucidis, petiolo teretiusculo, panicula ramoſiſſima villoſa. *Nepal.*

Poſt n. 20. *pyroides* Burch. 55. Rh. foliolis obovato-oblongis integerrimis mucronatis, petiolis ramulisque pubeſcentibus, racemis axillaribus folio brevioribus, terminalibus paniculatis. *Afric. auſtr.*

Poſt n. 25. †*tridactyla* Burch. 56. Rh. foliolis ſpathulato-linearibus obtuſiſſimis glabris, ramulis rigidis inermibus. *Afric. auſtr.*

pag. 938.

Poſt n. 40. *paviflora* Roxb. 57. Rh. foliolis obovatis crenato-dentatis utrinque ramisque villoſis, panicula terminali. *Nepal.*

ferraefolia Burch. 58. Rh. foliolis linearibus acuminatis elongatis ſerratis glabris, panicula terminali. *Afric. auſtr.*

Ad Rh. *cuneifoliam.* (Rh. grandidentata Burch.)

pag. 939.

Ad *Caſſinem.*

excelſa Wall. 10. C. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubcarnoſis glabris, umbellis axillaribus rotundatis, ſtigmatibus 5. *Nepal.*

discolor Wall. 11. C. arborea, foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus ſubargenteis coriaceis, faſciculis axillaribus dichotomis, ſtigmatibus 4. *Silhet, prov. Ind. or.*

pag. 940.

Ad *Paliurum* Lam.

cirgatus Don. 3. P. foliis oblique cordatis acutis 3nerviis lucidis, aculeis ſtipularibus geminis recto falcatoque, fructus alis integerrimis. *Nepal.* Bot. mag. 2535.

Ad *Turneram.*

Poſt n. 1. *mollis* Kunth. 23. T. foliis ovato-oblongis groſſe crenato-ſerratis utrinque ſericeo-piloſis ſubtus caneſcentibus, calycibus bracteatis. *Nov. Granat.*

Ad T. *acutam* W. (T. carpinifolia Kunth.)

Ad T. *peruvianam* W. (T. ſericea Kunth.)

pag. 941.

Poſt n. 7. *hexandra* * 24. T. fruticoſa, foliis oblongis inaequaliter crenato-ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus incano-tomentoſis, calycibus bracteatis, floribus 6andris. *Nov. Granat.* (T. tomentoſa Kunth.)

Ad T. *tomentoſam* W. (Piriqueta tomentoſa Kunth.) Stylos habet 2partitos.

pag. 942.

Ad *Drymariam* W.

Poſt n. 1. *diandra* Blum. 6. Dr. caule decumbente diffuſo pubeſcente, foliis ſubrotundo-ovatis mucronatis, pedunculis 2fidis, floribus diandris, calyce corollam ſuperante, capſula ſub-1ſperma. *Java.*

Poſt *Drymariam:*

MERCKIA Fiſch.

phyſodes Fiſch. *Orae maritimae Aſiae et Amer. arctic.* Planta Arenariam referens, foliis ovatis ciliatis, pedunculis 1floris, floribus albis. (Arenaria? phyſodes Fiſch. Cand.)

Ad *Corrigiolam.*

telephiifolia Pourr. 2. C. perennis, foliis ſpathulatis acutiusculis, floribus terminalibus glomeratis pedunculatis. *Corſica. Gallia auſtr.* Reichenb. ic. t. 161.

pag. 943.

Ad *Stackhouſiam* Labill.

ſpathulata Sieb. 2. St. caule herbaceo, foliis alternis ſpathulatis glabris, ſpicis terminalibus elongatis. *Nov. Holland.*

pag. 944.

Ad *Staphyleam occidentalem* Sw. dele ſyn. Ventenatii.

pag. 945.

Ad *Xanthoxylon.*

Poſt n. 13. *hyemale* Hilar. 39. X. foliolis 3-6jugis ſubſeſſilibus obovatis obtuſis crenato-ſerratis margine glanduloſis, floribus paniculatis 4andris 1gynis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 37.

ſorbifolium Hilar. 40. X. foliolis 2-5jugis oblongis crenato-ſerratis venoſis glabris, petiolis aculeatis, floribus paniculatis 5andris dioecis 1gynis. *Braſil.* (Langsdorffia Leandr., Pohlana Langsdorffii Mart. nov. act. nat. cur. 11. p. 185. 12. p. 17.)

pag. 946.

Ad X. *Culantrilo* Kunth. (X. Tingo aſſuiba Hilar.)

lucidum Hilar. 41. X. arboreum, ramis 4angulis, foliolis 2-3jugis ſpathulatis retuſis integerrimis pellucido-punctatis baſi 2tuberculatis, floribus ♂ paniculatis 4andris. *Braſil.* (X. nitidum Hilar.)

pag. 947.

Poſt n. 37. *praecox* Hilar. 42. X. arboreum inerme, foliis ſubabrupte pinnatis oblongis obtuſis ſubintegerrimis ſubtus pubeſcentibus pellucido-punctatis, floribus ♀ paniculatis 4fidis. *Braſil.*

pag. 952.

Ad *Araliam.*

Poſt n. 12. *pubeſcens* Cand. 34. A. fruticoſa glabra, foliis impari-pinnatis 2pinnatisque pubeſcentibus, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis baſi inaequaliter attenuatis, umbellis compoſitis verticillatis. *Nov. Hiſpan.*

pag. 953.

Poſt n. 30. *dubia* * 35. A. caule fruticoſo muricato-echinato, foliis profunde cordatis palmato-7partitis ſubtus ferrugineo-pubeſcentibus, laciniis lanceolatis ſerratis, umbellis compoſitis, floribus 1gynis. *Ind. or.* (Gaſtonia palmata Roxb. Lindl. bot. reg. 894.)

pag. 954.

Poſt *Gloſſopetalum:*

EURYCOMA Jack.

longifolia Jack. *Sumatra.* Arbuscula foliis amplis pinnatis, floribus paniculatis purpureis.

Ad *Pilocarpum* Vahl.

Humboldtii * 4. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis, petiolis marginatis, racemis compoſitis pubeſcentibus laxis, petalis rotundatis punctato-glandulofis, germinibus tuberculofis. *Nov. Andaluſ.* (Eſenbeckia pilocarpoides Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 655.)

pag. 955.

Ad *Droſeram.*

Poſt n. 11. 12. *ſeſſilifolia* Hilar. 29. Dr. foliis ſeſſilibus cuneiformibus ſimbriato-laciniatis baſi nudiusculis, ſtipulis multipartito-ciliatis, ſcapo glabro, calycibus glandulofo-pubeſcentibus, ſtigmatibus ſub-5fidis. *Braſil.*

montana Hilar. 30. Dr. foliis breviter petiolatis oblongis obtuſiſſimis glandulofo-pilofis, ſtipulis laciniatis, ſcapo pubeſcente, calycibus glandulofis. *Braſil.*

hirtella Hilar. 31. Dr. foliis ſpathulatis obtuſis in petiolum decurrentibus glandulofo-pilofis, ſtipulis 3partitis, ſcapo hirſuto, calycibus glandulofis. *Braſil.*

parvifolia Hilar. 32. Dr. foliis obovatis obtuſiſſimis glandulofo-pilofis, ſcapo glabriusculo 2-3floro, calycibus glandulofis. *Braſil.*

maritima Hilar. 33. Dr. foliis ſpathulato-cuneatis glandulofo-pilofis, ſtipulis ſubnullis, ſcapo calycibusque glandulofo-pubeſcentibus. *Braſil.*

communis Hilar. 34. Dr. foliis ſpathulatis obtuſiſſimis petiolatis glandulofo-pilofis, ſtipulis multipartitis, calycibus glandulofo-pubeſcentibus. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 15.

villoſa Hilar. 35. Dr. foliis lineari-lanceolatis ſcapo calycibusque glandulofo-pilofis, petiolis villoſis, ſtipulis 2partitis ciliatis. *Braſil.*

aſcendens Hilar. 36. Dr. foliis linearibus ſcapoque aſcendente glandulofo-pilofis, calycibus latiusculis. *Braſil.*

graminifolia Hilar. 37. Dr. foliis linearibus longiſſimis erectis, ſtipulis late ovatis laciniatis, ſcapo 3angulari pauciſloro. *Braſil.*

ſpiralis Hilar. 38. Dr. foliis linearibus elongatis ſpiratim tortis, ſtipulis lanceolatis acutis, ſcapo complanato 2fido glandulofo-pubeſcente. *Braſil.*

Poſt n. 19. *hilaris* Schlechtend. 39. Dr. foliis roſaceo-congeſtis ſpathulato-lanceolatis obtuſis glandulofo-pilofis ſubtus petiolisque villoſis, ſtipulis 0, racemo ſecundo bracteato. *C. B. S.*

pag. 958.

Ad *Staticem.*

Ad St. *globularifoliam* Desf. Patria: *Sardinia.*

echioides 25. St. foliis ſpathulatis obtuſis muricato-aſperis, ſcapi ramis ſtrictis elongatis ſimpliciusculis, calycibus remotis ariſtatis. *Europ. auſtr.* (St. ariſtata Sm.)

articulata Loiſ. 57. St. foliis ſpathulatis punctato-ſcabris, ſcapi ramoſiſſimi ramis divaricatis punctato-aſperis dichotomis articulatis, articulis medio craſſioribus. *Gallia provinc. Corſica. Sardinia.* (St. echioides R. et Sch., rorida Sm.)

acutifolia Reichenb. 58. St. foliis lineari-lanceolatis acutis, ſcapo erecto, ramis dichotomis teretibus, floribus diſtantibus. *Liguria.* Reichenb. ic. t. 225.

pag. 961.

Ad *Armeriam* W.

ſardoa * 16. A. foliis filiformibus canaliculatis ſcapoque glabris, foliolis involucri obtuſis. *Sardin. Corſica.*

pag. 962.

Ad *Linum.*

Poſt n. 3. *ſiculum* Presl. 49. L. ſimplex, foliis lineari-lanceolatis acutis 3nerviis, floribus corymboſo-paniculatis, ſepalis acuminatis 3nerviis margine glanduloſis, petalis emarginatis. *Sicil.*

Poſt n. 12. *piligerum* Presl. 50. L. ſimplex hirſutum, foliis oblongo-lanceolatis 3nerviis, ſepalis linearibus piloſis, ſtylis ſtamina aequantibus. *Sicil. Creta.*

pag. 963.

Poſt n. 23. *carneum* Hilar. 51. L. foliis lineari-lanceolatis acutiſſimis glauceſcentibus, inferioribus oppoſitis, ſuperioribus ſubimbricatis, panicula coarctata, calyce acuto ſerrulato petalis breviori. *Braſil.*

pag. 964.

Poſt n. 29. *erigeroides* Hilar. 52. L. ſimplex erectum, foliis alternis confertis linearibus acutiſſimis baſi 2glanduloſis, panicula ſubcorymboſa, ſepalis acuminatis glanduloſo-ſerratis. *Ad fl. Platam.*

litorale Hilar. 53. L. multicaule erectum glaberrimum, foliis linearibus acutis, ſuperioribus alternis, floribus paniculatis, ſepalis acutis glanduloſis. *Braſil.*

junceum Hilar. 54. L. caule erecto virgato glaberrimo, foliis remotis abbreviatis appreſſis linearibus acutis, floribus paniculatis, ſepalis acutis glanduloſis. *Braſil.*

Ad L. *ſtrictum.* (L. alterniflorum Delil.) *Gallia auſtr.*

pag. 965.

Ad L. *aquilinum* Molin. (L. Chamiſſonis Schiede in Linnaea p. 69.)

Poſt n. 45. *Cicanoba* Hamilt. 55. L. fruticoſum, foliis alternis petiolatis oblongis acuminatis ſerratis glabris, umbella terminali multiflora, ſepalis acutis, floribus trigynis. *Nepal.*

repens Don. 56. L. fruticoſum repens, foliis alternis ovatis mucronulatis crenulatis glabris, pedunculis ſolitariis, ſepalis lanceolatis mucronatis denticulatis. *Nepal.*

AD

AD

VOLUMEN II.

CLASSIS VI.

pag. 5.

Poſt n. 1198. *Phycella* Lindl. Cor. tubuloſa 6partita ſubringens ſubclauſa. Stamina baſi laciniarum inſerta, ſterilia 6 baſi exteriorum adnata. Stigma ſimplex.

pag. 9.

Poſt n. 1274. *Compſanthus* *-(Compſoa Don.) Cor. campanulata 6petala, apice incraſſata, petalis extus gibboſo-ſaccatis. Filamenta baſi dilatata. Antherae peltatae. Stigmata 3 2fida apice revoluta. Capſ. ſiliquaeformis 3locularis polyſperma.

Mierſia Lindl. Bracteae patentes, 6 exter. petaloideae, inter. bifidae coloratae depauperatae. Perianthium 1phyllum urceolatum carnoſum, ore 6dentato. Stamina minima fauci perianthii inſerta. Stigma capitatum. Capſ. 3locularis apice 3valvis polyſperma. *Familia?*

pag. 11.

Poſt n. 1299. *Steriphoma* *. Cal. campanulatus 2lobus. Pet. 4. Fructus oblongus ſtipitatus. *Capparideae.*

Poſt n. 1308. *Leptodermis* Wallich. Cal. 6dentatus, bractea membranacea tubuloſa ſuperne 2fida incluſus. Cor. 6fida. Antherae mediis filamentis adnatae lineares. Stigma 6fidum. Capſ. 6ſperma. *Familia?*

pag. 12.

Poſt n. 1327. *Soulamea* Lam. e ſyſt. veg. 3. p. 150. huc transferenda. Cal. minimus 3fidus. Pet. 3. Stigmata ſeſſilia. Samara 2locularis obcordata, loculis 1ſpermis. *Polygaleae.*

pag. 14.

n. 1357. *Cymation* * deleatur.

Poſt n. 1368. *Kolbea* Schlechtend. Petala ſine unguiculis glandulisque ſtaminifera. Stylus 0. Stigmata in angulis germinis. Capſ. 3locularis: ſemina duplici ſerie.

pag. 15.

Poſt n. 1384. *Bocagea* Hilar. Cal. 3partitus vel ſubinteger. Pet. 6 duplici ordine. Stam. complanata. Antherae

2loculares. Baccae 1-3 diſtinctae 3ſpermae. *Anoneae.*

Hornſchuchia Nees. Cal. inferus coriaceus ſubtruncatus. Cor. 6partita duplici ordine. Antherae lineares ſubſeſſiles. Fructus? *Familia?*

---

pag. 21.

Bromelia nudicaulis commutetur cum Br. *pyramidali* Curt.: apponatur ſyn. Br. *nudicaulis* Ker.

nudicaulis 23. Br. foliis lato-lanceolatis obtuſis coriaceis enerviis lurido-viridis ſurſum nigro-ſpinuloſo-ſerratis, ſcapo villoſo ſuperne bracteis coloratis veſtito, ſpica ſimplici terminali, calycibus acutis uncinulatis. *Inſ. Carib.* Hook. exot. fl. t. 143.

pag. 22.

Ad *Pitcarniam* Herit.

albiflora * 12. P. foliis lineari-lanceolatis acuminatis integerrimis glaberrimis, pedunculis laevibus bracteas ſuperantibus, petalis revolutis, ſtylo ſtamina exſerta excedente. *Braſil.* (P. albiflos Bot. mag. 2642.)

pag. 24.

Ad *Tillandſiam.*

Poſt n. 11. *pulcra* Hook. 40. T. foliis filiformi-ſetaceis canaliculatis laxiusculis tenuiſſime lepidotis, ſpica ſimplici, bracteis (roſeis) flore brevioribus, laciniis corollae obtuſis ſtamina ſuperantibus. *Inſ. Carib.* Hook. exot. fl. t. 154.

Poſt n. 15. *bulboſa* Hook. 41. T. foliis e baſi latiſſima convoluto-ſubulatis flexuoſis, ſpica ſimplici, bracteis viridibus flores ſubaequantibus, genitalibus exſertis corollam acutam ſuperantibus. *Inſ. Carib.* Hook. exot. fl. t. 173.

Poſt n. 24. *nitida* Hook. 42. T. foliis lingulatis nitidis integerrimis ſcapoque paniculato glaberrimis, floribus remotiusculis, calyce ovato bracteas excedente. *Jamaica.* Hook. exot. fl. t. 218.

pag. 25.

Poſt n. 31. *aloaefolia* Hook. 43. T. foliis lato-lanceolatis concavis longe acuminatis ſpiratim tortis rigidis obſcure faſciatis farinaceo-lepidotis, ſpica paniculata flexuoſa, floribus remotis, corolla apice revoluta calycem, genitalibus corollam ſuperantibus. *Inſ. Carib.* Hook. exot. fl. t. 205. T. *paniculata* proxima differt foliis brevioribus, corolla torta, ſtigmate biſulco. Plum. ic. 10. p. 233.

pag. 28.

Ad *Maſſoniam longifolium* Jacqu. M. *grandiflora* Lindl. bot. reg. 958. var.

pag. 31.

Ornithogalum corymboſum R. et P. melius ſic definitur: O. foliis lineari-lingulatis canaliculatis proſtratis, corymbo 6floro, bracteis cordatis pedicello brevioribus, petalis latiſſimis undulatis, filamentis ſubulatis. *Peru. Chili.* Bot. reg. 906.

pag. 33.

Ad *Ornithogalum hiſpidum* Hornem. (O. Bergii Schlechtend.)

pag. 34.

Ad *Allium.*

Poſt n. 16. *Sulvia* Hamilt. 97. A. foliis lineari-loriformibus planis glabris, ſcapo tereti laevi, umbella patula multiflora. *Nepal.*

pag. 40.

Ad A. *moſchatum.* (A. parciflorum Viv.)

pag. 41.

Ad *Yuccam.*

Poſt n. 2. *glauca* Noiſ. 18. Y. foliis lanceolatis flaccidis glaucis, floribus ſubglobofis patentibus. *Carolina.* Bot. mag. 2662.

pag. 44.

Ad *Narciſſum triandrum.* N. Macleai Ker. var.

pag. 47. 48.

Ad *Pancratium flavum* R. et P. (Chryſiphiala flava Bot. reg. 778.)

Poſt n. 33. *Herbertianum* * 37. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis, ſcapo tereti 2floro, corolla cernua ſtaminibus rectis breviore, coronae brevis dentibus 2fidis. *Peru.* (Stenomeſſon curvidentatum Herbert in bot. mag. 2640., Chryſiphiala pauciflora Hook. exot. fl. t. 132.)

Leucoïum trichophyllum Brot. ſpatha multi- non 1flora. Habitat et in Sardinia et Corſica.

pag. 49.

Ad *Amaryllida.*

A. *Atamaſco.* Zephyranthes ſtriata Bot. mag. 2593. var.

A. *candida* Ker. Zephyranthes verecunda Bot. mag. 2583. var.

carinata * 64. A. ſcapo 1floro foliis linearibus canaliculatis flaccidis breviori, ſpatha apice fiſſo-cancellata,

tubo erecto ſubringente, ſtaminibus declinatis. *Mexico.* (Zephyranthes Bot. mag. 2594.)

roſea * 65. A. ſcapo 1floro folia linearia obtuſa flaccida ſuperante, ſpatha 2fida, corolla erecta regulari, laciniis ovalibus patentibus, ſtylo declinato. *Cuba.* (Zephyranthes roſea Lindl. bot. reg. 821.)

Ad A. *minutam* Humb. (Zephyranthes grandiflora Bot. reg. 902.)

pag. 50.

Poſt n. 12. *verſicolor* * 66. A. foliis linearibus flaccidis, ſcapo tereti, ſpatha anguſta, corolla nutante campanulata ſubirregulari. *Ad fl. Platam.* (Habranthus Herb. in Bot. mag. 2485.)

Ad A. *Reginae.* A. Carnarvonia Cand. hort. genev. t. 9. hybrida.

Ad A. *miniatam* R. et P. (Hippeaſtrum ſubbarbatum Herb. in bot. mag. 2475.)

gracilis * 67. A. foliis gracilibus ſemicylindricis erectis, ſcapo tereti, corolla campanulata erecta, ſtaminibus declinatis inaequalibus. *Ad fl. Platam.* (Habranthus gracilifolius Herb. in bot. mag. 2464.) Habr. anguſtus ib. 2639. var.

pag. 51.

Ante n. 28. *biſida* * 68. A. ſcapo 4floro tereti, foliis linearibus flaccidis, ſpatha 2fida, floribus pedicellatis tubuloſis cernuis, fauce ſquamata, ſtaminibus declinatis inaequalibus. *Bonaria.* (Habranthus biſidus Herb. in bot. mag. 2597.)

A. *cyrtanthoides* Sims. et *ignea* Lindl. ad Phycellam Lindl. reducuntor.

pag. 52.

Poſt n. 44. *lineata* Coll. 69. A. ſpatha multiflora, floribus pedunculatis, limbo aperto tubum ſuperante, laciniis vittatis, genitalibus declinatis. *C. B. S.*

pag. 53.

Poſt n. 58. *intermedia* * 70. A. foliis elliptico-oblongis coſtato-reticulatis in petiolum decurrentibus, ſcapo compreſſo, floribus ſubcapitatis, laciniis oblongis obtuſis. *Braſil.* (Griffinia Lindl. in bot. reg. 990.)

pag. 54.

Ad A. *ſtriatam* Jacqu. (Brunsvigia minor Lindl. in bot. reg. 954.)

Poſt *Amaryllida:*

PHYCELLA Lindl.

ignea Lindl. (Amaryllis ignea p. 51.)

cyrtanthoides Lindl. (Amaryllis cyrtanthoides Sims. p. 51.)

Ad *Crinum.*

Ad Cr. *erubeſcens* Ait. Cr. ſubmerſum Herb. in bot. mag. 2463. var.

Ad Cr. *defixum* Ker. Cr. elegans Herb in bot. mag. 2592. var.

Ante n. 9. *ſtrictum* Herb. 28. Cr. bulbo ovato, foliis lanceolatis erectis abbreviatis, umbella pauciflora, tubo limbum ſuperante, ſtylo ſtamina ſubaequante. *Ceilon.* Bot. mag. 2635.

pag. 55.

Ad Cr. *flaccidum* Herb. Cr. confertum Herb. in bot. mag. 2522. var.

Poſt n. 23. *humile* Sims. 29. Cr. bulbo ſphaerico, foliis lineari-lanceolatis lacunoſis margine laevibus depreſſis, umbella multiflora, tubo limbum ſuperante, laciniis anguſtis. *Ind. or.* Bot. mag. 2636.

pag. 56.

Poſt n. 25. *undulatum* Hook. 30. Cr. ſcapo compreſſo foliis lineari-lanceolatis canaliculatis breviori, tubo corollae longiſſimo, limbi laciniis erectis acutis undulatis. *Amer. auſtr.* Hook. exot. fl. t. 200.

pag. 57.

Ad *Strumariam ſpiralem* Ker. (Heſſea ſpiralis Berg. in Linnaea p. 252.)

pag. 58.

Ad *Cyrtanthum* Ait.

Poſt n. 3. *ſtriatus* Herb. 8. C. foliis lincaribus ſubtus maculatis ſcapoque coloratis, floribus umbellatis cernuis, tubo coſtato ſtriato, dentibus limbi obtuſiusculis, genitalibus exſertis. *C. B. S.* Bot. mag. 2534.

Ad C. *collinum* Burch. (C. pallidus Bot. mag. 2471.)

pag. 59.

Ad *Hypoxin.*

Poſt n. 3. *minor* Don. 25. H. ſcapo capillari foliis linearibus acutis villoſis triplo breviori, perianthio villoſo, antheris filamenta ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 60.

Ad *Curculiginem ſaſcicularem* * (Colchicum faſciculare R. Br. ad Denham. it. p. 243.)

Ad C. *enſifoliam* R. Br. (C. ſtans Labill. nov. Caled. t. 24.)

pag. 61.

Ad *Lilium.*

Poſt n. 5. *cordifolium* Thunb. 23. L. caule ſub-4floro, foliis petiolatis cordatis acuminatis venoſis, floribus ſeſſilibus campanulatis, laciniis elongatis. *Japon. Nepal.* (Hemerocallis cordata Thunb. japon.)

L. *japonicum* Thunb, habitat et in *Nepal.*

pag. 62.

L. *glabrum* * eſt L. *Martagon* var. pallida.

pag. 63.

Ad *Fritillariam verticillatam* W. (Fr. cirrhoſa Don.) *Nepal.*

pag. 64.

Poſt n. 16. *macrophylla* Don. 20. Fr. floribus ſubternis cernuis, petalis ſpathulato-oblongis mucronulatis, bracteis pedicellos ſuperantibus, foliis ſparſis lineari-lanceolatis elongatis glabris. *Nepal.*

pag. 65.

Ad *Gloriosam.*

Gl. *ſimplex* Don. videtur varietas Gl. *ſuperbae*, foliis anguſtioribus. *Nepal.*

vireſcens Lindl. 3. Gl. foliis cirriferis, pedunculis pendulis, petalis apice undulatis. *Senegamb.* Bot. mag. 2589.

Ad *Hemerocallem.*

diſticha Don. 3. H. foliis linearibus carinatis margine cartilagineis ſcabris, floribus ſpicatis, nervis corollae reticulatim nexis. *Nepal.*

pag. 67.

Ad *Scillam vernam.* (S. faſtigiata Viv.)

Sc. *undulata* Desf. et *obtuſifolia* Poir. habitant et in *Sardinia.*

pag. 78.

Ad *Uropetalum* Ker.

hyacinthoides * 4. U. floribus racemoſis nutantibus, bracteis pedicellos ſuperantibus, foliis binis lineari-ſubulatis canaliculatis ſcapo longioribus. *C. B. S.* (Polemannia hyacinthiflora Berg. in Linnaea, p. 250.)

longifolium Lindl. 5. U. floribus laxe racemoſis pendulis, petalis obtuſis, foliis loriformibus acuminatis longiſſimis. *Afric. orient.* Bot. reg. 974.

pag. 80.

Ad *Alſtrömeriam.*

roſea Hook. 39. A. foliis linearibus ſubtortis, pedunculis elongatis 1floris ſubcorymboſis, petalis ſubſpathulatis ſerrulatis. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 181.

pag. 84.

Ad *Anthericum.*

Poſt n. 23. *nepalenſe* * 36. A. radice faſciculata, foliis linearilanceolatis ſcapum aequantibus, floribus race-

mofis cernuis, bracteis elongatis, petalis oblongis obtufis. *Nepal.* (Phalangium Lindl. in bot. reg. 998.)

pag. 91.

Ad *Conantheram* R. et P.

†*campanulata* Hook. 4. C. foliis lineari-lanceolatis acuminatis longiffimis flaccidis, floribus racemofis nutantibus, corolla 1petala campanulata, limbo aequaliter 6lobo. *Chili.* Hook. exot. fl. t. 214. (C. bifolia Bot. mag. 2496.)

pag. 93.

Ad *Dracaenam.*

Poft n. 14. *ftricta* Sims. 18. Dr. caule fruticofo ftricto, foliis confertis lineari-lanceolatis cufpidatis margine fcabris, racemo compofito multifloro. *Nov. Zeeland.* Bot. mag. 2575.

pag. 96.

Ad *Afparagum.*

Poft n. 21. *filicinus* Hamilt. 28. A. caule erecto ramoffiffimo, foliis quinis inaequalibus lineari-falcatis mucronatis 1nerviis, pedunculis axillaribus fubfolitariis folio brevioribus. *Ind. or. Nepal.* (A. Curillus Roxb.)

Ad *Convallariam.*

Poft n. 2. *leptophylla* Don. 15. C. caule tereti glabro, foliis quaternis linearibus acuminatis longiffimis, pedunculis elongatis fubquaternis bifloris pendulis. *Nepal.*

pag. 97.

Ad *Ophiopogonem* Ker.

intermedius Don. 3. O. foliis linearibus obtufis ftrictis ferrulatis, fcapo 3quetro foliis duplo breviori, racemo paucifloro, bracteis flore brevioribus, ftylo corollam aequante. *Nepal.*

pag. 98.

Ad *Uvulariam.*

Ad U. *parvifloram* Wallich. (Difporum parviflorum Don.)

Pitfutu Hamilt. 9. U. foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis, umbellis multifloris, pedicellis flore brevioribus, filamentis elongatis. *Nepal.* (Difporum Pitfutum Don.)

Ad *Streptopoda* Mx.

†*fimplex* Don. 4. Str. caule fimpliciffimo, foliis amplexicaulibus ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis filiformibus elongatis. *Nepal.*

pag. 99.

Ad *Xerophytam* Juſſ.

abietina * 2. X. perennis ramoſa, foliis imbricatis e baſi lata villoſa filiformi-trigonis ciliatis, floribus terminalibus ſeſſilibus ſubſolitariis. *Alp. Braſil.* (Velloſia abietina Mart.)

plicata * 3. X. perennis ſubramoſa, foliis imbricatis lineari-lanceolatis plicatis margine carinulaque plicarum hirſutiusculis, floribus ſubſolitariis pedunculatis, germinibus longiſſimis. *Braſil.* (Velloſia plicata Mart.)

pag. 101.

Ad *Smilacem.*

Poſt n. 34. *ovalifolia* Roxb. 69. Sm. aculeis falcatis, foliis ovali-oblongis 3plinerviis, umbellis paniculatis folia ſubaequantibus. *Nepal.*

pag. 102.

Poſt n. 44. *orbiculata* Labill. 70. Sm. caule ſub-4gono, foliis ſubcordato-orbiculatis fuſco-mucronatis 5nerviis, petiolis apice incraſſatis, floribus ♀ umbellatis. *Nov. Caledon.*

Poſt n. 51. *maculata* Roxb. 71. Sm. ramis ſulcatis inermibus, foliis ſubpeltatis triangulari-ovatis 7nerviis, umbellis ſeſſilibus ſpicatis folia ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 103.

Poſt *Peliosanthen* Andr.:

COMPSANTHUS *. (Compſoa Don.)

maculatus * *Nepal.* Herba hirſuta ramoſa folioſa, foliis amplexicaulibus cordatis acuminatis, floribus terminalibus pedunculatis albis purpureo-maculatis.

MIERSIA Lindl.

chilenſis Lindl. *Chili.* Herba acaulis e bulbo, foliis radicalibus linearibus, ſcapo umbellifero, floribus rubentibus.

pag. 104.

Ad *Juncum.*

Poſt n. 7. *ſcheuchzerioides* Laharp. 66. J. culmo breviſſimo, foliis filiformibus, ſpicis ſubbinis 3-5floris, ſepalis ovato-lanceolatis mucronatis capſulam ſubgloboſam aequantibus. *Inſ. Falkland.*

pag. 106.

Poſt n. 24. *concinnus* Don. 67. J. culmo tereti oligophyllo ſtriato, foliis teretibus articulatis, faſciculo terminali multifloro, involucro polyphyllo ſcarioſo abbre-

viato, ſepalis obtuſis, capſula triquetra ſtylo elongato coronata. *Emodi montes.*

Ante n. 80. *conglomeratus* 68. J. culmo aphyllo ſubtiliter ſulcato laxe farcto, panicula laterali compoſita glomerata, floribus 3andris, ſepalis acuminatis, capſula obovato-truncata apiculata. *Europ. Aſia. America.* (J. communis *α.* Meyer., glomeratus Thb., bogotenſis Humb.)

effuſus 69. J. culmo aphyllo laevi laxe farcto, panicula laterali compoſita patente, floribus 3andris, ſepalis acuminatis, capſula obovato-truncata depreſſa ſubmucronata. *Europ.* (J. communis *β.* Meyer.)

diffuſus Hopp. 70. J. culmo aphyllo ſubtiliter ſulcato farcto, vaginis radicalibus atropurpureis, panicula laterali patente, floribus 6andris, ſepalis acuminatis, capſula obovata ſtylo coronata. *Ad Danubium.*

pag. 115.

Ad *Tradeſcantiam.*

Poſt n. 2. *barbata* * 31. Tr. caule procumbente ramoſo hinc villoſo, geniculis barbatis, foliis linearibus acutis ſubtus vaginisque villoſiusculis, pedunculis ſolitariis. *Nepal.* (Cyanotis barbata Don.)

pag. 116.

Ad Tr. *villoſam* * Patria: *Ind. or.*

pag. 119.

Ad *Berberim.*

Poſt n. 1. *iberica* Stev. 34. B. ſpinis ſimplicibus 3partitisque, foliis obovato-oblongis mucronatis integerrimis, racemis pendulis multifloris. *Caucaſ.*

Poſt n. 7. *glauceſcens* Hilar. 35. B. racemis compoſitis pendulis, calycibus 8ſepalis, foliis oblongis mucronatis integerrimis glauceſcentibus. *Braſil.*

Ad B. *latifoliam* R. et P. (B. coriacea Hilar.?)

Ad B. *ruſcifoliam* Lam. (B. ſpinuloſa Hilar.?)

pag. 120.

Ad B. *nepalenſem* * (B. Miccia Hamilt. Don.) Qui potuerit Donius Ilicem japonicam Thunb. huc trahere, haud intelligo. B. nepalenſis * et in *Java* habitat.

pag. 121.

Ad *Cleomen.*

Poſt n. 4. *affinis* * 60. Cl. glanduloſo-piloſa, foliis ternatis quinatisque obovatis integerrimis glanduloſo-ciliatis. *Java.* (Gynandropſis Blum.)

pag. 122.

Ad Cl. *pentaphyllam.* Cl. Candelabrum Bot. mag. 2656. var.

pag. 125.

Ad Cl. *viscosam.* (Polanisia Blum.)

Post *Cleomen:*

STERIPHOMA *.

cleomoides * 1. St. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolos subaequantibus. *Caracas.* (Capparis paradoxa Jacqu. Stephania W.)

elliptica * 2. St. foliis ellipticis petiolos duplo superantibus *Inf. Trinit.* (Stephania elliptica Cand.)

pag. 126.

Ad *Mabam* Forst.

rufa Labill. 10. M. fruticosa, foliis lanceolatis obtusiusculis coriaceis, junioribus ramulis baccisque solitariis breviter pedunculatis rufo-pilosis. *Nov. Caledon.*

Ad *Amajouam corymbosam* Kunth. (? Melanopsidium nigrum Coll. hort. ripul. t. 35. Stigmata tria indicantur, quae silet Kunthius.)

pag. 127.

Post *Cassupam* Humb.:

LEPTODERMIS Wallich.

lanceolata Wallich. *Nepal.* Frutex ramulis brevissimis fasciculatis, foliis ovatis acutis hispidis, floribus lateralibus sessilibus ternis. Quam Wallichius fl. ind. 2. p. 191. 5andram habet, Donius in fl. nepal. p. 138. 6andram pronunciat, *Hamiltoniae fruticosae* nomine.

Ad *Richardiam.*

R. *scabram* cum *pilosa* R. et P. eamdem esse Mart. et Hilar., differre a sequentibus laciniis calycis 3angularibus.

rosea Hilar. 2. R. ramis diffusis foliisque oblongis utrinque attenuatis hirsutis, verticillis multifloris, laciniis calycis lanceolatis. *Brasil.*

emetica Mart. 3. R. ramis hispidis, foliis ovato-lanceolatis mucronatis pilosiusculis, verticillis paucifloris, laciniis calycis linearibus. *Brasil.*

pag. 128.

Ad *Loranthum.*

Post n. 6. *obmunitus* * 75. L. ramis teretibus strictis, foliis spathulato-linearibus apice incrassatis, pedunculis nutantibus subsecundis, calyce duplici, exteriori 3dentato. *Rio grande.* Sello.

Post n. 11. *pendulus* Sieb. 76. L. ramis teretibus glabris, foliis oppositis lineari-lanceolatis longissimis coriaceis laevibus, pedunculis umbelliferis, corollis longissimis. *Nov. Holl.*

pag. 129.

L. *bicolor* Roxb. ad pentandros ablegandus.

Poſt n. 27. *ampullaceus* Roxb. 77. L. foliis breviter petiolatis oblongis glabris, racemis axillaribus ſolitariis folio brevioribus, tubo corollae gibbo, fructibus ovalibus. *Silhet, prov. Ind. or.*

retuſus Jack. 78. L. foliis oppoſitis obovato-oblongis retuſis glabris, racemis ſubſolitariis abbreviatis, tubo corollae gibbo, fructibus 1ſpermis. *Ind. or.*

pag. 130.

Poſt n. 45. *patulus* Jack. 79. L. foliis oppoſitis ovato-ellipticis glabris, racemis paniculatis, calyce bracteato integro. *Sumatra.*

pag. 131.

Poſt n. 47. *odoratus* Wallich. 80. L. foliis ellipticis obtuſis ſpicas axillares ſuperantibus, floribus patulis, ſtylo petalis breviori. *Nepal.* (L. viridiflorus Wallich.)

globoſus Roxb. 81. L. foliis oppoſitis oblongis eveniis glabris, ſpicis axillaribus ſubſolitariis, floribus oppoſitis. *Bengal.*

corynitis * 82. L. caule gracili, foliis ovali-oblongis, floribus axillaribus paucis, corolla irregulari, fructibus clavatis. *Silhet, provinc. Ind. or.* (L. clavatus Roxb.)

coccineus Jack. 83. L. foliis alternis petiolatis ovato-oblongis obtuſis glabris, ſpicis axillaribus, calyce ſubintegro. *Peninſul. Malacc.* Malayan miſcell. 1. 8.

polyſtachys Wallich. 84. L. ramis teretibus punctatis, foliis obovatis obtuſis, racemis axillaribus oppoſitis ſubfaſciculatis folio brevioribus, fructibus globuloſis. *Ind. or.*

pulverulentus Wallich. 85. L. ſuperne ſtellato-tomentoſus farinoſus, foliis oppoſitis obovatis glabris nervoſis, racemis lateralibus faſciculatis tomentoſis. *Nepal.*

Poſt n. 55. *veſtitus* Wallich. 86. L. foliis oblongis acutis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, floribus faſciculatis tubuloſis. *Nepal. Inſ. freti Malacc.* (L. ferrugineus Roxb.)

liguſtrinus Wallich. 87. L. foliis lanceolatis acutis glabris, racemis ſubumbellatis. *Nepal.*

cordifolius Wallich. 88. L. foliis cordato-ovalibus obtuſis, racemis faſciculatis. *Nepal.*

umbellatus Wallich. 89. L. foliis elliptico-oblongis acutis, floribus faſciculatis. *Nepal.*

Poſt n. 57. *involucratus* Roxb. 90. L foliis oppoſitis cordato-ovatis breviter petiolatis glabriusculis, umbellis axillaribus ſubſeſſilibus, involucro 4phyllo 4floro, calyce corollaeque tubo villoſis. *Bengal.*

pentapetalus Roxb. 91. L. foliis oppoſitis ſubcordato-oblongis glabris, racemis axillaribus folia aequantibus, petalis 5 baſi in corpus trigonum intumeſcentibus, antheris obovatis, fructibus oblongis. *Silhet, Nepal.*

cylindricus Jack. 92. L. foliis alternis petiolatis lanceolatis utrinque attenuatis, racemis axillaribus divaricatis folia aequantibus, limbo corollae tubum ſuperante. *Sumatra.*

incarnatus Jack. 93. L. foliis alternis petiolatis ovatis acutis, junioribus ſtellato-pubeſcentibus, racemis ſpicatis hirſutis, tubo corollae limbum ſuperante. *Inſ. freti Malacc.*

bracteatus Heyn. 94. L. ſtellato-tomentoſus, foliis alternis longe petiolatis obovatis obtuſis, umbellis axillaribus, bractea elongata lingulata. *Ind. or.* Roxb. fl. ind. 2. p. 220.

pag. 133.

Ad *Triphaſiam* Lour.

ſarmentoſa Blum. 3. Tr. arborea aculeata, ramis ſarmentoſis, foliis ſimplicibus ternatisque oblongis acuminatis integerrimis, corymbis axillaribus, corolla tripetala. *Java.*

pag. 134.

Ad *Frankeniam.*

Ad Fr. *Nothriam* Thunb. (Fr. Krebſii Schlechtend.)

pag. 135.

grandifolia Chamiſſ. 17. Fr. caule ſuffruticoſo proſtrato, foliis oppoſitis obovatis mucronatis margine revolutis ſubcoriaceis pubeſcentibus, ramis calycibusque ſolitariis hirtis. *Nov. Californ.*

pag. 136.

Poſt *Atraphaxin:*

SOULAMEA Lam.

amara Lam. *Java. Inſ. Molucc.* Frutex foliis oblongis integerrimis, floribus racemoſis albidis. (Rex amaroris Rumph.)

pag. 142.

Deleatur *Cymation* *.

pag. 143.

Ad *Colchicum.*

Poſt n. 7. *Ritchii* R. Br. 8. C. foliis linearibus, ſpatha ſubmultiflora, appendicibus laciniarum corollae fimbriato-criſtatis. *Numidia.* Denham it. p. 241.

Ad *Androcymbium* W.

leucanthum W. 3. A. foliis ovato-lanceolatis undulatis tenuiſſime fimbriatis, floribus ſubternis breviter pedicellatis bracteatis. *C. B. S.* (Melanthium capenſe L., Anguillaria capenſis * p. 146.)

Ad *Tofieldiam* Hudſ.

Poſt n. 3. *coccinea* Richardſ. 9. T. ſcapo ſubfoliato colorato, foliis lineari-lanceolatis, floribus capitatis ſubſeſſilibus, calyculo 3fido. *Ad oras maris glacialis Amer. arctic.*

pag. 145.

Ad *Triglochin.*

filifolium Sieb. 13. Tr. ſcapo folia lineari-filiformia ſuperante, floribus racemoſis, fructibus ovatis, ſtigmatibus perſiſtentibus. *Nov. Holl.*

pag. 146.

Ad *Melanthium.*

M. *uniflorum* Jacqu. deleatur, rediturum ſub *Kolbea* Schlechtend.
M. *punctatum* Cav. (Erythroſtictus punctata Schlechtend.)
M. *gramineum* Cav. (Erythroſtictus graminea Schlechtend.)
M. *ciliatum* Thunb. floribus punctatis, cornibus fructus retrorſum verſis.
Poſt n. 7. *Bergii* Schlechtend. 12. M. foliis radicalibus lineari-lanceolatis papilloſo-ciliatis, ſcapo ſuperne ſulcato, ſpica terminali pauciflora, floribus epunctatis, cornibus erectis. *C. B. S.*
marginatum Schlechtend. 13. M. foliis radicalibus lanceolatis vaginantibus cucullatis papilloſo-ciliatis, ſcapo ſulcato baſi foliato, floribus laxe ſpicatis, germinibus acutangulis ſubalatis. *C. B. S.*
rubicundum W. 14. M. foliis oblongo-lanceolatis baſi cucullatis ciliatis, ſcapo angulato papilloſo, floribus ſpicatis ſecundis. *Afric. auſtr.*
Ad *Anguillariam biglanduloſam* R. Br. (Pleea Sieberi Reichenb. in Sieb. fl. nov. holl. n. 156.)
Anguillaria capenſis * deleatur. Eſt Androcymbium leucanthum W.

pag. 147.

Poſt *Anguillariam* R. Br.:

KOLBEA Schlechtend.

Breyniana Schlechtend. *Afric. auſtr.* Herba ſimplex e bulbo, caule folioſo ſub-1floro, foliis lineari-lanceolatis longiſſimis, flore puniceo-croceo. (Tulipa Breyniana L., Melanthium uniflorum Jacqu. Syſt. 2. p. 146. excl. ſyn. Desrouſſ., Melanthium aethiopicum Thunb.)

Ad *Zigadenum* Mx.

chloranthus Richardſ. 3. Z. caule ſubaphyllo folia radicalia linearia glauca ſuperante, racemo ſubcompoſito, bracteis lanceolatis. *Amer. arctic.*

Ad *Ornithogloſſum* Salisb.

O. viride mutetur in *glaucum* Salisb. (Lichtenſteinia laevigata W., Cymation laevigatum Syſt. 2. p. 142.)

undulatum Schlechtend. 2. (Lichtenſteinia undulata W., Cymation undulatum Syſt. 2. p. 142.)

Ad *Wurmbeam* Thunb.

truncata Schlechtend. 4. W. foliis lineari-lanceolatis, ſpica pauciflora flexuoſa, floribus diſtantibus, laciniis limbi baſi diſtantibus tubo longioribus. *C. B. S.*

pag. 153.

Ad *Dioſcoream.*

Poſt n. 29. *Elephantopus* * 43. D. glaberrima, caudice maximo ſubrotundo, foliis reniformi-cordatis acutis 7nérviis utrinque nitidis, racemis ♂ axillaribus. *Afric. auſtr.* (Tamus Herit. Ait. Syſt. 3. p. 905., Teſtudinaria Burch. Lindl. bot. reg. 921.)

† *montana* * 44. D. foliis reniformi-cordatis obſolete nervoſis ſubtus glaucis. *Afric. auſtr.* (Teſtudinaria Burch.)

pag. 155.

Ad *Meniſpermum.*

Poſt n. 5. *coriaceum* * 51. M. foliis cordato-ovatis mucronulatis coriaceis glabris, racemis elongatis ſolitariis pendulis. *Java.* (Cocculus Blum.)

Poſt n. 12. *lanuginoſum* * 52. M. lanatum, foliis late ovatis retuſis, corymbis axillaribus folio multo brevioribus. *Java.* (Cocculus Blum.)

ovalifolium * 53. M. foliis ovalibus integerrimis mucronatis 3nerviis glabris, ramulis villoſis, pedunculis terminalibus paniculatis, pedicellis umbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 156.

Poſt n. 26. *corymboſum* * 54. M. foliis ſubpeltatis cordato-ſubrotundis mucronulatis 5nerviis, corymbis axillaribus ſolitariis folio minoribus, pedicellis ſubumbellatis. *Java.* (Cocculus Blum.)

rimoſum * 55. M. foliis ſubpeltatis ovali-oblongis acutis coriaceis glabris, racemis paniculatis axillaribus folio brevioribus, caule rimoſo. *Java.* (Cocculus Blum.)

glauceſcens * 56. M. foliis ſubpeltatis cordato-orbiculatis mucronatis glabris ſubtus glaucis, racemis paniculatis folia ſuperantibus. *Java.* (Cocculus Blum.)

bantamenſe * 57. M. foliis ſubcordato-ovalibus acutis ſub-5nerviis integerrimis glabris, paniculis elongatis axillaribus ſolitariis. *Java.* (Cocculus Blum.)

pag. 158.

Poſt *Lardizabalam* R. et P.:

BOCAGEA Hilar.

alba Hilar. 1. B. arboreſcens, foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, pedunculis ſubternis paucifloris, petalis interioribus anguſtioribus apice 3quetris. *Braſil.*

viridis Hilar. 2. B. fruticosa, foliis ovato-lanceolatis acutis subtus pilosis, pedunculis subsolitariis cernuis, petalis interioribus latioribus. *Brasil.*

javensis * 3. B. fruticosa, foliis ovato-lanceolatis, pedunculis subracemosis, petalis interioribus majoribus unguiculatis apice cohaerentibus. *Java.* (Orophea hexandra Blum.)

enneandra * 4. B. fruticosa, foliis oblongis, pedunculis sub-3floris, pedicellis fasciculatis, floribus enneandris. *Java.* (Orophea enneandra Blum.)

HORNSCHUCHIA Nees.

Bryotrophe Nees. 1. H. foliis basi inaequalibus oblongis acuminatis triplinerviis subtus ad venas pubescentibus, pedunculis radicalibus racemosis. *Brasil.* Denkw. der bot. Ges. in Regensb. 2. t. 11.

Myrtillus Nees. 2. H. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis reticulato-venosis subtus ramisque pubescentibus, pedunculis 1floris lateralibus. *Brasil.* Denkw. der bot. Ges. in Regensb. 2. t. 12.

Ad *Rumicem.*

Post n. 4. *montevidensis* * 60. R. valvis oblongis obtusis graniferis reticulatis, ramis angulatis asperis, pedunculis verticillatis, foliis oblongis undulatis subcrispis. *Monte Video.* Sello.

pag. 159.

Ad R. *nepalensem* * (R. hamatus Trevir.)

R. *aegyptiacus* habitat et in *Sardinia.*

Ad R. *scutatum.* (R. hastatus Don.) *Nepal.*

pag. 163.

Ad *Alisma.*

Post n. 4. *reniforme* Don. 10. A. foliis longe petiolatis reniformibus nervosis glabris, scapo elongato paniculato, pedunculis oppositis ternisque, fructibus trigonis obtusis. *Nepal.*

CLASSIS VII.

pag. 164.

n. 1393. *Disandra* del.
n. 1397. *Pancovia* W. melius ad *Afzeliam* Sm. p. 279. n. 1633. ablegatur.

pag. 165.

n. 1405. *Aſtranthus* Lour. ſatius Decandris pentagynis adnumeratur. Bot. mag. 2659.

pag. 166.

Disandra proſtrata del. in cl. V. jam collocata.

pag. 168.

Ad *Piſoniam.*

Ad P. *Pacurero* Humb. (P. eucalyptifolia Kunth.)
Ad P. *aculeatam.* (P. loranthoides Kunth.)
Ad *Petiveriam alliaceam.* (P. tetrandra Gomez. var. levis.)

CLASSIS VIII.

pag. 170.

Poſt n. 1417. *Corallophyllum* Kunth. Cal. 8partitus coloratus. Cor. calyce minor tubuloſa, limbo 8dentato. Stam. cor. inſerta. Antherae biloculares. Stigma capitatum. Germen ſuperum multiloculare, loculis 1ſpermis.

pag. 171.

1420. *Cytinus* melius ad cl. XVI. *Monadelphiam* amandatur.
1425. *Sodada* Delil. cum *Capparide* aptius conjungitur.
1426. *Phyſoſtemon* Mart. Stam. declinata.
1430. *Vitmannia* Vahl. *Rutaceis* adnumerator.
1431. *Elvaſia* Cand. Antherae poris apice dehiſcentes. *Ochneae* Hilar.

pag. 172.

Poſt n. 1446. † *Acrozus* * (Acronodia Blum.) Flores diocci. ♂ Cal. 4ſepalus. Pet. 4 linearia apice eroſa. Antherae lineares pubeſcentes.

pag. 173.

Poſt n. 1456. *Diplopetalon* * (Dimereza Labill.) Cal. 5ſepalus perſiſtens bracteatus. Pet. 10 duplici ſerie, exter. orbiculata, inter. 2partita apice 2calloſa. Diſcus glanduloſus 8-4fidus periſtemon. Capſ. coriacea 3valvis 3ſperma. *Sapindeae.*

n. 1465. *Luxemburgia* Hilar. melius ad cl. XIII.

pag. 175.

n. 1494. *Codia* Forſt. Rec. commune villoſum. Involucrum partiale 1phyllum. Cal. tubuloſus 4-5partitus. Petala 4, 5 ſummo calycis tubo inſerta. Stamina 8-10 gemina. Bacca ſicca 4-5locularis, ſemine perfecto ſubſingulari. *Onagrae* Labillard.

n. 1497. *Hermeſia* Humb. jungenda cum *Alchornea* Sw. Syſt. 3. n. 2381.

Poſt n. 1498. *Aſtilbe* Don. Cal. 4partitus coloratus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Capſ. ſupera 2locularis 2roſtris polyſperma. *Saxifrageae.*

n. 1499. *Marathrum* Humb. ad *Lacida* Schreb. n. 1980. ablegandum.

---

pag. 187.

Ad *Ericam.*

E. *Coventria* Andr. (E. bucciniflora Bot. mag. 2465.)

pag. 192.

E. *incurva* Wendl. (non Andr.)

Poſt n. 196. *ſphaerantha* * 310. E. foliis linearibus obtuſis erectis glabris, ramis villoſis, floribus ſubcorymboſis terminalibus, calycibus ciliatis, corollis globoſis, genitalibus incluſis. *C. B. S.*

pag. 196.

Poſt n. 245. *appreſſa* * 311. E. foliis minutis ſubellipticis obtuſis incano-pubeſcentibus arcte appreſſis, floribus terminalibus aggregatis, calycibus lanatis, corollae pubeſcentis limbo contracto, ſtaminibus incluſis, ſtylo exſerto. *C. B. S.*

pag. 203.

Ad *Diospyron.*

Poſt n. 9. *ſerrata* Hamilt. 28. D. foliis lanceolatis acuminatis ſerratis glabris, petiolis brevibus ramulisque villoſis, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque hirſutis, ſtylo 3fido. *Nepal.*

serraſifolia Don. 29. D. foliis oblongis acuminatis integerrimis, petiolis brevibus ramulisque pubeſcentibus, pedunculis aggregatis lateralibus cernuis calycibusque pubeſcentibus, ſtylo 3fido. *Nepal.*

Poſt n. 20. *vaccinioides* Hook. 30. D. fruticoſa, ramis flexuoſis foliisque ovatis integerrimis nitidis ſubtus rufo-villoſis, floribus ſeſſilibus ſolitariis 4andris, fructibus 3locularibus. *China.* Hook. exot. fl. t. 139.

pag. 205.

Ad *Mimoſam.*

Poſt n. 6. *adhaerens* Kunth. 45. M. aculeata fruticoſa, foliis conjugato-pinnatis, foliolis bijugis dimidiato-obovatis mucronatis ſtrigilloſis, petiolis inermibus villoſis, capitulis ſolitariis. *Ad Orinocum.*

M. *tetrandra* Humb. ad M. *pudicam* Kunth.

M. *polyſtachya* ad *Entadam* Syſt. 2. p. 325.

pag. 206.

Ad M. *ſomniantem* Humb. (M. ſomniculoſa Kunth.)

pag. 208.

Ad *Chloram perfoliatam*, Chl. acuminata, ſerotina et lanceolata Koch. varietates leves, quae ſoli diverſitate cultuque naſcuntur juxta ac evaneſcunt.

CORALLOPHYLLUM Kunth.

coeruleum Kunth. *Mexico.* Caules caeſpitoſi carnoſi baſi foliis laciniatis veſtiti, flores ſeſſiles coerulei. Forte monſtrum. (Humb. nov. gen. 7. t. 660. b.)

pag. 210.

Ad *Vaccinium.*

Poſt n. 16. *canadenſe* Richardſ. 49. V. foliis lanceolatis integerrimis utrinque pubeſcentibus, racemo terminali, floribus faſciculatis, ſtylo incluſo. *Amer. arctic.*

pag. 212.

Poſt n. 36. *falcinum* Chamiſſ. 50. V. foliis lanceolatis cuſpidatis baſi attenuatis coriaceis integerrimis glabris venoſo-reticulatis, pedunculis axillaribus abbreviatis. *Ora occ. Amer. bor.*

V. *braſilienſe* * deleatur, rediturum ſub Luſſacia p. 294.

pag. 213.

Sodada decidua Forsk. melius *Capparis Sodada R. Br.*

Phyſoſiemon lanceolatus Mart. — ſtylo perſiſtente breviſſimo.

Ph. *tenuifolius* Mart. — ſtylo ſiliquam aequantes.

Ph. *rotundifolius* Mart. — ſiliqua ſtylum ſuperante.

Ad *Xylocarpum* Schreb.

Ante n. 1. *obovatus* * 3. X. foliis ſub-2jugis obovatis coriaceis. *Java.* (Carapa obovata Blum.)

pag. 214.

Ad *Tetrathecam* Sm.

denticulata Sieb. 6. T. foliis oppoſitis linearibus revolutis ſubdenticulatis ramulisque piloſiusculis, calycibus lanceolatis acutis glandulоſis. *Nov. Holl.*

Ad *Boroniam* Sm.

Poſt n. 3. *floribunda* Sieb. 14. B. foliis ſub-3jugis, petiolo marginato, foliolis lineari-lanceolatis mucronatis ſerrulatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*

microphylla Sieb. 15. B. foliis ſub-6jugis, foliolis minutis obovatis mucronatis, pedunculis ternis. *Nov. Holl.*

pag. 215.

Poſt n. 5. *triphylla* Sieb. 16. B. foliis ternatis linearibus ſubtus revolutis tomentoſis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Holl.*

Ad B. *polygalaefoliam* Sm. B. hyſſopifolia Sieb. var.

pag. 216.

Ad *Jamboliferam pedunculatam* L. (Cyminoſma Gärtn. Cand.)

pag. 217.

Ad *Amyridem.*

A. *polygama* Cav. (Schinus dependens Ort. Duvaua Kunth.) Flores trigyni.

Poſt n. 4. † *Caraña* Humb. 28. A. foliis ternatis, foliolis oblongis acuminatis glabris epunctatis ſupra nitidis ſubtus albo-pruinoſis. *Ad Orinocum.* (Icica? Caraña Kunth.)

pag. 218.

Ad A. *ambroſiacam* L. (Icica Tacamahaca Kunth.)

Ad A. *altiſſimam* W. (Icica macrophylla Kunth.)

Poſt n. 20. *pinnata* Kunth. 29. A. foliis 3jugis pellucido-punctatis glabris, foliolis ovatis obſolete crenulatis acutiusculis, petiolis ramulisque pubeſcentibus, paniculis axillaribus. *Amer. tropic.*

fagaroides * 30. A. foliis 3jugis glabris, foliolis ovatis obtuſis crenato-ſerrulatis reticulato-venoſis epunctatis, pedunculis axillaribus aggregatis breviſſimis reflexis, fructu ſub-3valvi. *Mexico.* (Elaphrium fagaroides Kunth.)

† *graveolens* * 31. A. foliis 3jugis glabris epunctatis, foliolis oblongis acuminatis groſſe crenato-ſerratis reticulato-venoſis, petiolo ſuperne alato. *Ad fl. Magdalen.* (Elaphrium Kunth.)

pag. 219.

Ad A. *Elaphrium* * (Elaphrium glabrifolium Kunth.)

Ad A. *tomentoſam* * (Elaphrium Jacquinianum Kunth.)

Ad A. *copalliferam* * (Elaphrium excelſum Kunth.)

jorullenſis * 32. A. foliis ſub-8jugis villoſis rugoſis, foliolis oblongis obtuſis duplicato-crenatis ſupra incanis ſubtus rufeſcentibus, petiolo interrupte alato, alis crenatis, pedunculis axillaribus paucifloris. *Mexico.* (Elaphrium jorullenſe Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 612.)

† *arienſis* * 33. A. foliis 5-7jugis villoſis, foliolis oblongis acutis crenato-ſerratis, petiolo ſubalato, alis integerrimis. *Mexico.* (Elaphrium Kunth.)

† *lanuginoſa* * 34. A. foliis ſub-6jugis ſupra villoſo-tomentoſis ſubtus petioloque albido-lanatis, foliolis oblongis crenatis, panicula terminali glomerata. *Nov. Hiſpan.* (Elaphrium Kunth.)

Poſt *Amyridem:*

† ACROZUS *. (Acronodia Blum.)

punctatus * *Java.* Arbor foliis lanceolatis ſerratis ſubtus punctatis, racemis axillaribus ſimplicibus. (Acronodia punctata Blum.)

pag. 220.

Ad *Bäckeam.*

Poſt n. 2. *pinifolia* * 6. B. foliis oppoſitis lineari-filiformibus nigreſcentibus, pedunculis axillaribus 3floris. *Nov. Caledon.* (Leptoſpermum Labill.)

Ad B. *virgatam* Ker. Leptoſpermum parvulum Labill. nov. Caled. t. 61. var. 10andra.

trichophylla Sieb. 7. B. foliis oppoſitis alternisque lineari-ſetaceis patulis glaberrimis, pedunculis axillaribus ſolitariis abbreviatis. *Nov. Holl.*

ſpinoſa Sieb. 8. B. foliis faſciculatis ſpathulatis coriaceis glabris, ramis angulatis ſpineſcentibus, racemis axillaribus terminalibusque compoſitis. *Nov. Holl.*

faſciculata Sieb. 9. B. foliis imbricato-faſciculatis ſetaceis apice incurvo-mucronatis glabris, pedunculis axillaribus aggregatis. *Nov. Holl.*

carnoſula Sieb. 10. B. foliis 4fariam imbricatis breviter petiolatis teretibus carnoſis abbreviatis gibbis glanduloſo-tuberculoſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *Nov. Holl.*

microphylla Sieb. 11. B. foliis 4fariam imbricatis baſi ſcarioſa ſubdecurrentibus triquetris obtuſiusculis glanduloſo-punctatis ciliatis, pedunculis terminalibus aggregatis. *Nov. Holl.*

pag. 221.

Ad *Cupaniam.*

Poſt n. 5. *Poiretii* Kunth. 12. C. foliis pinnatis ſub-4jugis, foliolis oblongis acutis coriaceis ſupra nitidis ſubtus glabriusculis, ramis racemisque paniculatis ferrugineo-tomentoſis. *Inſ. Trinit. Guadalup.* (Robinia rubiginoſa Poir. Syſt. veg. 3. p. 247.) Ann. des ſcienc. nat. 1. p. 457.

Poſt n. 11. *apetala* Labill. 13. C. foliis ſub-6jugis ovato-lanceolatis glabris, racemis abbreviatis, floribus polygamis apetalis. *Nov. Caledon.*

DIPLOPETALON *. (Dimereza Labill.)

glaucum * *Nov. Caledon.* Frutex foliis ſubbinatis bijugisque lanceolatis ſubtus glaucis, floribus paniculatis. (Dimereza glauca Labill. nov. Caledon. t. 51.)

Ad *Thouiniam* Poit.

Poſt n. 2. *dioeca* Mart. 8. Th. foliis ſimplicibus oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris remote ſpinuloſo-ferratis, petiolis apice articulatis, floribus racemoſis dioecis. *Braſil.* Nov. act. nat. cur. 12. t. 4.

pag. 222.

Ad *Schmideliam Cobbe* Cand. petalis (haud glabris ſed) intus villoſis. (Ornitrophe panigera Labill. nov. Caledon. t 52.) Folia vero haud ſunt ſubtus faſciatim tomentoſa, ſed ad axillas venarum barbato-pubeſcentia.

Ad Schm. *Cominiam* Sw. (Schm. viticifolia Kunth.) Pöppigius e Cuba veram attulit.

pag. 223.

Ad *Phacocarpum* Mart.

campeſtris Mart. 1. Ph. foliis impari-pinnatis ramisque pubeſcentibus, paniculae ramis fulvo-villoſis. *Braſil.* (Magonia pubeſcens Hilar.)

glabratus * 2. Ph. foliis abrupte pinnatis glabriusculis, paniculae ramis pubeſcentibus. *Braſil.* (Magonia glabrata Hilar.)

pag. 224.

Ad *Acer.*

Ad A. *oblongum* Wall. (A. laurifolium Don.)

Ante n. 11. *acuminatum* Don. 31. A. foliis cordatis 3-5fidis glabris, laciniis duplicato-ſerratis longe acuminatis, corymbis paucifloris erectis folio brevioribus, pedicellis ſuboppoſitis elongatis glabris. *Nepal.*

pag. 226.

Luxemburgia Hilar. (Plectanthera Mart.) in cl. XIII. emigret.

pag. 228.

Ad *Oenotheram.*

Poſt n. 10. *eroſa* Horn. 47. Oen. caule ramoſo diffuſo glabriusculo, foliis ſubpetiolatis lanceolatis baſi ſinuato-dentatis glabris, capſulis ſeſſilibus ſubſulcatis apice truncatis. *Patria?*

pag. 229.

Poſt n. 23. *roſeo-alba* Bernh. 48. Oen. caule ſimpliciusculo, foliis petiolatis ovato-oblongis denticulatis, peta-

lis amplis crenulatis, capſulis ſub-4gonis curvatis pubeſcentibus. *Nepal.*

pag. 230.

Poſt n. 39. *triloba* Bart. 49. Oen. ſubacaulis, foliis runcinatis glabris, petalis ſub-3lobis, capſulis ſeſſilibus 4alatis, alis 1dentatis. *Amer. bor.*

pag. 231.

Ad *Juſſieuam.*

Poſt n. 1. *longifolia* Cand. 22. J. caule 3quetro ſtricto foliisque lineari-lanceolatis integerrimis glabris, capſulis pedunculatis oblongis 4quetris. *Braſil.* Reichenb. hort. t. 67. Cand. hort. genev. t. 4.

ovalifolia Sims. 23. J. caule erecto ramoſo, ramis 4gonis, foliis oblongis utrinque attenuatis venoſis villoſis, ſepalis 3nerviis hirtis. *Madagaſcar.* Bot. mag. 2530.

Poſt n. 7. *ramoſa* Jacqu. f. 24. J. caule herbaceo ramoſo glabro, foliis lanceolatis venoſis undulato-crenulatis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus. *Braſil.*

pag. 233.

Ad *Epilobium.*

Ad E. *ſtrictum* Mühlenb. (E. molle Torr.)

riviulare Wahlenb. 21. E. caule tereti, foliis lanceolatis elongatis ſubdenticulatis, petalis emarginatis calycem ſuperantibus. *Ager upſal.*

nutans Schmidt. 22. E. caule tereti foliisque oppoſitis ovato-lanceolatis obtuſiusculis integerrimis glabris, petalis emarginatis calycem ſuperantibus. *Paludes Bohemiae.* (E. hypericifolium Tauſch.)

Poſt n. 13. † *brevifolium* Don. 23. E. caule tereti foliisque ovatis acutis ſerratis ſupra lineatis utrinque pubeſcentibus, floribus axillaribus breviter pedunculatis, petalis calycem ſuperantibus. *Nepal.*

Ad E. *tetragonum.* (E. virgatum Fr.)

Ad E. *davuricum* Fiſch. (E. cylindricum Don.)

pag. 234.

Ad *Fuchſiam.*

Poſt n. 2. *arboreſcens* Seſſ. 12. F. foliis verticillatis oblongis acuminatis obſolete ſerrulatis glabris, panicula ampla terminali, petalis patentibus apiculatis, ſtigmate 4fido. *Mexico.* Bot. reg. 943. Bot. mag. 2620.

F. *decuſſata* R. et P. foliis ſubtus albidis, ramis rufo-tomentoſis, floribus folia ſtaminibusque calycem ſubaequantibus.

gracilis Lindl. 13. F. foliis oppoſitis longe petiolatis lanceolatis remote denticulatis utrinque glaberrimis, pedunculis axillaribus aggregatis longiſſimis pendulis, ſtaminibus longe exſertis, ramis coloratis pubeſ-

centibus. *Mexico.* (F. decuſſata Graham. Bot. mag. 2507.) Bot. reg. 847.

pag. 237.

Ad *Daphnen.*

D. *cannabina* Lour. a Donio perperam D. *odorae* Thunb. accenſetur.

Bholua Hamilt. 32. D. floribus terminalibus umbellatis ſericeo-villoſis, laciniis corollae ſubrotundis retuſis, ſtigmate ſeſſili capitato, foliis lanceolatis utrinque attenuatis coriaceis glabris. *Nepal.*

D. *ſericea* Vahl. et in *Nepal.* habitat.

pag. 239.

Ad *Gnidiam.*

Poſt n. 17. *denudata* Lindl. 19. Gn. foliis bifariam oppoſitis lanceolatis erectis 3nerviis ciliatis demum glabratis, floribus terminalibus aggregatis, laciniis corollae lanceolatis obtuſiusculis ciliatis. *C. B. S.?* Bot. reg. 757.

pag. 242.

Ad *Dodonaeam.*

laurina Sieb. 11. D. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, ramis teretibus, ramulis ancipitibus, pedunculis cymoſis axillaribus. *Nov. Holl.*

pag. 243.

Ad *Aſpidiſtram* Ker.

punctata Lindl. 2. A. foliis longe petiolatis oblongis nervoſis, floribus radicalibus ſolitariis 8fidis *China.* Bot. reg. 977.

pag. 245.

Ad *Lagettam* Juſſ.

funifera Mart. 2. L. fruticoſa, foliis alternis ſubpetiolatis lanceolatis acutis ſubtus ſericeis, floribus dioecis ſubracemoſis. *Braſil.* (Daphne braſilienſis Radd.)

Ad *Codiam montanam* Forſt. cf. eximiam analyſin iconemque Labill. nov. Caled. t. 46.

Ad *Weinmanniam.*

Ad W. *glabram.* (W. caripenſis Kunth.)

Poſt n. 4. *pubeſcens* Kunth. 9. W. foliis impari-pinnatis 4-6jugis utrinque piloſis, foliolis elliptico-oblongis acutis ſerratis, petiolo communi alato articulato, racemis folia aequantibus. *Caracas.*

hirtella Kunth. 10. W. foliis impari-pinnatis 4-7jugis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, foliolis oblongis acutiusculis ſerrulatis, petiolo communi alato arti-

culato, floribus fascículato-racemosis. *Nov. Granat.*

sorbifolia Kunth. 11. W. foliis impari-pinnatis 3-4jugis glabris, foliolis oblongis acutiusculis basi attenuatis serratis, petiolo communi alato articulato, ramulis glabris, floribus fascículato-racemosis. *Nov. Granat.?*

fagaroides Kunth. 12. W. foliis impari-pinnatis 3-6jugis glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi alato articulato, floribus corymbosis. *Peru.*

microphylla Kunth. 13. W. foliis binatis ternatis bijugisque glabris, foliolis parvis coriaceis obovatis apice crenatis, petiolo communi subalato, pedunculis subsolitariis. *Peru.*

heterophylla Kunth. 14. W. foliis simplicibus ternatisque membranaceis glabris, foliolis ovato-oblongis serratis, lateralibus multo minoribus, petiolo superne alato, racemis erectis elongatis. *Nov. Granat.*

W. *racemosa* Forst. habet racemos folia superantes. Huc et W. *macrophylla* Kunth. ex *Amer. austr.* et ipsa *laurina* Ej. Nec W. *ellipticam* Ej. diversam habeo: racemorum enim longitudo variat.

Balbisiana Kunth. 15. W. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis acuminatis argute serratis coriaceis glabris, racemis strictis elongatis. *Peru.*

pag. 246.

Hermesia Humb. deleatur. Prima species, monente Adr. Jussievo, sub Alchornea, altera sub Gallicoma militat.

Post *Galeniam:*

ASTILBE Don.

rivularis Don. *Nepal.* Herba pilosa, foliis biternatis, foliolis ovatis duplicato-serratis, floribus spicato-racemosis ochroleucis.

Marathrum Humb. sub *Lacide* redibit.

pag. 248.

Ad *Serianam.*

Post n. 14. *letalis* Hilar. 20. S. foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis subdentatis glaberrimis, petiolis nudis, racemis pubescentibus. *Brasil.*

pag. 250.

Ad *Paullíniam.*

Post n. 32. *austrális* Hilar. 21. P. foliis supradecompositis glabris, foliolis incisо-serratis pellucido-venosis, paniculis simplicibus paucifloris. *Brasil.*

pag. 253.

Ad *Coccolobam.*

Totnea Hamilt. 18. C. fruticosa, ramis hirsutis, foliis lanceolatis acuminatis utrinque pubescentibus, racemis paniculatis, pedunculis hirtis, laciniis calycis oblongis obtusis. *Nepal.*

Ad *Polygonum.*

Post n. 1. *petiolatum* Don. 95. P. foliis petiolatis cordato-oblongis acuminatis crenulatis, stipulis integerrimis acutiusculis, spica brevi, bracteis cuspidatis. *Nepal.*

amplexicaule Don. 96. P. foliis amplexicaulibus cordato-oblongis acuminatis crenulatis utrinque pubescentibus, stipulis integerrimis obtusis, spica brevi, bracteis cuspidatis. *Nepal.*

macrophyllum Don. 97. P. foliis lanceolatis obtusiusculis coriaceis integerrimis glabris, radicalibus longe petiolatis, stipulis integerrimis obtusis, spica ovata, bracteis cuspidatis. *Nepal.*

viscosum Hamilt. 98. P. foliis oblongo-lanceolatis obtusiusculis hispidis, stipulis truncatis, spicis abbreviatis, caule ramoso glanduloso hispidissimo. *Nepal.*

Donianum * 99. P. foliis subsessilibus lanceolatis acutis integerrimis glabris, stipulis truncatis, spica oblonga, bracteis obtusis. *Nepal.* (P. affine Don.)

Post n. 7. *tortuosum* Don. 100. P. foliis ovalibus obtusis pubescentibus, stipulis truncatis piloſis, pedunculis hirsutis, spicis geminis tenuifloris. *Emodi montes.*

Post n. 10. *bracteatum* * 101. P. foliis linearibus obtusis margine revolutis subtus niveo-tomentosis, stipulis truncatis, floribus racemoso-spicatis cernuis, bracteis longe cuspidatis. *Emodi montes.* (P. angustifolium Don.)

gracillimum * 102. P. foliis radicalibus petiolatis ovato-oblongis obtusis crenulatis subtus pubescentibus, caulinis sessilibus linearibus revolutis, stipulis truncatis, racemo compacto, bracteis ovatis acutis. *Emodi montes.* (P. tenue Don.)

pag. 254.

Post n. 25. *alatum* Hamilt. 103. P. foliis amplexicaulibus ovatis acutis piloſis subtus glanduloso-punctatis, stipulis basi glandulosis, capitulis sphaericis terminalibus, bracteis ovatis acutis flore longioribus. *Nepal.* (P. punctatum Don.)

microcephalum Don. 104. P. foliis petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis pubescentibus ciliatis, stipulis fimbriato-laceris, capitulis globosis pedunculatis. *Nepal.*

capitatum Hamilt. 105. P. foliis petiolatis ovatis acutis caulequc radicante lanatis, capitulis globosis. *Nepal.*

runcinatum Hamilt. 106. P. foliis runcinato-lyratis dense piloſis, lacinia extrema acuminata, stipulis obtusis hirsutis, capitulis subrotundis solitariis. *Nepal.*

ciliatum Hamilt. 107. P. foliis ovato-oblongis acuminatis ciliatis, caule decumbente, ſtipulis barbatis, capitulis ſphaericis axillaribus pedunculatis. *Nepal.*

patens Don. 108. P. foliis cordato-oblongis cuſpidatis margine criſpo-repandis ſubtus pubeſcentibus, floribus glomeratis paniculatis. *Nepal.*

pag. 255.

Poſt n. 86. *cymoſum* Trevir. 109. P. foliis petiolatis haſtato-ovatis acuminatis undulatis cauleque ramoſo elato glabris, ſtipulis elongatis, cymis paniculatis patentibus. *Nepal.*

dibotrys Don. 110. P. foliis cordato-ſagittatis acutis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis axillaribus dichotomis, racemis conjugatis recurvatis, floribus ſecundis, pedicellis medio articulatis. *Nepal.*

Hamiltonii * 111. P. foliis lanceolatis acuminatis utrinque hiſpidis, ſtipulis bracteisque longiſſime ſetoſo-ciliatis, ſpicis elongatis denſifloris ſubpaniculatis. *Nepal.* (P. hiſpidum Hamilt.)

molle Don. 112. P. foliis petiolatis oblongis acuminatis ſubtus ſericeis, ſtipulis diviſis, caule erecto ſimplici villoſo, floribus ſeſſilibus paniculatis. *Nepal.*

Ad P. *flagellare* Bertol. (P. romanum Guſſon.)

pag. 258.

Poſt n. 71. *Poſumbu* Hamilt. 113. P. foliis ovato-lanceolatis acutis glabris, ſtipulis ſetaceis petiolos ſuperantibus, ſpicis filiformibus tenuifloris, bracteolis tubuloſis 2floris ſetoſo-ciliatis. *Nepal.*

CLASSIS IX.

pag. 266.

Ad *Laurum.*

Nacuſua Don. 24. L. foliis elliptico-oblongis acutis 1nerviis ſupra nitidis ſubtus reticulatis tomentoſis, umbellis axillaribus glomeratis ſeſſilibus 6floris, pedicellis lanatis, involucris 8phyllis, floribus ♀. *Nepal.*

Hamiltonii * 25. L. foliis elliptico-oblongis acuminatis 1nerviis ſubtus villoſis, umbellis axillaribus, pedicellis lanatis, floribus ♀. *Nepal.* (L. umbellata Hamilt.)

macrophylla Don. 26. L. foliis lanceolatis acuminatis 1nerviis reticulatis glabris ſubtus glauceſcentibus, ramulis pedunculisque lateralibus ſolitariis cernuis incraſſatis villoſis. *Nepal.*

cuſpidata Don. 27. L. foliis ovali-oblongis longe cuſpidatis 3nerviis glabris, floribus axillaribus ſeſſilibus aggregatis involucratis. *Nepal.*

Ad *Tetrantheram* Jacqu.

Ad T. *trinerviam* * (Laurus aggregata Bot. mag. 2497.)

Poſt n. 10. *megapotamica* * 15. T. foliis lanceolatis acuminatis utrinque glaberrimis venoſis, paniculis axillaribus diffuſis ebracteatis, pedicellis paucifloris. *Rio grande.* Sello.

Doſtia Don. 16. T. foliis lanceolatis acutis 1nerviis glabris, pedunculis lateralibus corymbiferis, floribus 6partitis 12andris. *Nepal.*

Cuipala Don. 17. T. foliis elliptico-oblongis acutis 3plinerviis glabris ſubtus glaucis, umbellis lateralibus ſeſſilibus glomeratis, involucris 6phyllis imbricatis, floribus 4partitis 6andris. *Nepal.*

pallens Don. 18. T. foliis ellipticis acutis 3plinerviis glabris ſubtus glaucis, umbellis axillaribus ſeſſilibus glomeratis, floribus ♀ 4partitis. *Nepal.*

pag. 268.

Ad *Perſeam* Gärtn.

Poſt n. 8. *Cathia* * 45. P. foliis oblongis acutis multinerviis ſubtus ramulisque tomentoſis, paniculis axillaribus longe pedunculatis. *Nepal.* (Cinnamomum Cathia Don.)

nitida * 46. P. foliis oppoſitis elliptico-oblongis obtuſis 3nerviis glabris ſubtus glaucis, ramis glabris, paniculis ſupraxillaribus erectis, floribus ternis. *Ind. or.* (Cinnamomum nitidum Hook. exot. fl. t. 176., Laurus Caſſia Nees.)

Poſt n. 12. †*pyrifolia* * 47. P. foliis oblongis acutis venoſis glabris ſubtus pallidis, panicula terminali multiflora. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

tomentoſa * 48. P. foliis lanceolatis acutis venoſis ſubtus racemisque terminalibus paniculatis tomentoſis. *Nepal.* (Cinnamomum Don.)

pag. 271.

Ad *Anacardium.*

Rhinocarpus Cand. 2. A. foliis amplis ſpathulato-lanceolatis obtuſis glabris reticulato-venoſis, panicula corymboſa rufeſcente. *Ad fl. Magdalen.* (Rhinocarpus excelſus Berter. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 601.) A. occidentale habet folia magis elliptica retuſa, paniculam diffuſam glabriuſculam, ſtamen unicum abortiens, cum in noſtra 6-8 abortiant. Idem tamen genus eſſe, plurima ſuadent.

pag. 272.

Ad *Rheum.*

auſtrale Don. 7. Rh. foliis cordato-ſubrotundis obtuſis ſubtus margineque ſcabris, petiolis ſulcatis teretius-

culis ramisque papilloso-asperis, sepalis oblongis apice crenulatis. *Nepal.*

pag. 273.

Ad *Butomum.*

latifolius Don. 2. B. foliis longe petiolatis elliptico-oblongis nervosis, umbella pauciflora, spatha diphylla. *Nepala.*

CLASSIS X.

pag. 274.

Post n. 1541. *Pernettia* Gaudich. Cal. 5partitus. Cor. urceolata, limbo 5fido revoluto. Filamenta basi incrassata. Antherae apice 2lobae, lobis 2fidis. Glandulae 10 3lobae perigynae. Bacca polysperma.

n. 1543. *Encyanthus* Lour. capsulam fert, non baccam. Lindley. Enkianthum Lour. (ab ἔγχυος, quod male intellectos flores indicat) mutare decebat.

pag. 275.

Post n. 1561. *Mauria* Kunth. Cal. urceolatus 4-5lobus persistens. Pet. 4, 5 ovata. Filamenta subulata. Discus orbicularis. Stigma angulatum. Fructus 1spermus.

pag. 276.

Post n. 1564. *Cyrtocarpa* Kunth. Cal. 5partitus cum petalis patentibus nervoso-venosus. Discus orbicularis 10crenatus. Stigma sub-4fidum. Fructus drupaceus 5tuberculatus, calyce corolla staminibusque persistentibus suffultus.

Post n. 1569. *Micromelum* Blum. Cal. urceolatus integer persistens. Pet. 5 linearia. Stam. alterna breviora. Antherae didymae. Bacca exsucca, dissepimentis 5 1-2spermis.

pag. 277.

1582. *Eriostemon* Sm. Filamenta pilosa. Antherae apice appendiculatae.

Phebalium Vent. Cal. 5fidus. Pet. 5. Stam. glabra. Antherae apice emarginatae s. glanduloso-callosae. Fructus 5coccus.

Schotia Jacqu. et *Omphalobium* Gärtn. (non Jacqu. fil.) melius in cl. XVI. collocantur, ubi scientius secundum Candollei nuperas observationes digestae quaerantur.

pag. 278.

n. 1612. *Godoya* R. et P. melius ad cl. XIII.

pag. 279.

Poſt n. 1628. *Bowdichia* Kunth. Cal. campanulatus 5dentatus, dentibus 2 ſuperioribus conniventibus. Cor. 5petala ſubpapilionacea. Legumen ſtipitatum membranaceum hinc alatum. Semina compreſſa.

pag. 281.

Poſt n. 1664. *Baphia* Afz. Cal. calyptraeformis florem includens ſubtus hians. Vexillum patens ſubrotundum alas lineares aequans. Carina acuta. Legumen falciforme.

Poſt n. 1678. *Geiſſoïs* Labill. Cal. 4ſepalus. Cor. 0. Stam. hypogyna exſerta. Stylus 2partitus. Fructus ſiliquaeformis elongatus 2locularis, ſeminibus alatis imbricatis. *Familia?*

Detarium Juſſ. Cal. 4fidus. Cor. 0. Stamina alterna breviora. Stigma ſimplex. Drupa orbicularis, putamine farinaceo, 1ſperma. *Familia?*

pag. 284.

Poſt n. 1737. *Poupartia* Commerſ. Flores diclini. Cal. 5fidus. Pet. 5 patentiſſima. Styli 5 approximati. Drupa nucleo 2-5loculari. *Terebinthaceae.*

---

pag. 287.

Poſt *Arbutum:*

PERNETTIA Gaudich.

empetrifolia Gaud. 1. (Arbutus pumila Forſt.) Hab. et in *Inſ. Falkland.*

mucronata Gaud. 2. (Arbutus mucronata Forſt.)

microphylla Gaud. 3. (Arbutus microphylla Forſt.)

Ad *Encyanthum* Lour.

E. *quinqueflorus* Lour. melius ſic definitur: pedunculis aggregatis, ſepalis patulis ovato-lanceolatis germen aequantibus, foveis nectariferis diaphanis, foliis oblongis utrinque attenuatis marginatis. *China.* Bot. reg. 884. (Melidora pellucida Salisb.)

reticulatus Lindl. 2. E. pedunculis aggregatis, ſepalis ovatis appreſſis germine brevioribus, foveis nectariferis obſcuris, foliis oblongis utrinque attenuatis reticulatis. *China.* Bot. reg. 885.

biflorus Lour. 3. E. pedunculis geminis, ſepalis lanceolatis patulis piloſis, foliis parvis ovato-lanceolatis villoſis. *China.*

pag. 288.

Ad *Gaultheriam.*

Poſt n. 4. *nummularioides* Don. 18. G. caule filiformi procumbente ſetoſo, foliis ſubſeſſilibus cordatis mucronatis ſupra nudis ſubtus margineque hiſpidis, pedunculis axillaribus breviſſimis ſolitariis bracteolatis. *Emodi montes.*

myrtilloides Schlechtend. 19. G. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus ramisque ſetoſo-hirſutis, pedunculis breviſſimis bracteatis. *Braſil.* Sello.

Ad G. *fragrantiſſimam* Wallich. (G. fragrans Don.)

G. *hiſpida* * deleatur, reditura ſub *Luſſacia* *.

Ad G. *tomentoſam* Kunth. (G. ferruginea Schlechtend. *Braſil.*)

pag. 289.

Ad *Andromedam.*

Poſt n. 5. *Redowskii* Chamiſſ. 35. A. foliis 4fariam imbricatis ſquamaeformibus laevibus nitidis fimbriatis, ramis exacte 4gonis, floribus 8andris. *Sibir. or.*

pag. 290.

Poſt n. 22. *ovalifolia* Wallich. 36. A. arborea, foliis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ſubcoriaceis glabriusculis, racemis lateralibus foliatis multifloris, pedicellis ſecundis pubeſcentibus, laciniis calycis ovatis acutis, corollis oblongis pubeſcentibus. *Nepal.*

lanceolata Wallich. 37. A. fruticoſa, foliis ellipticis acutiusculis membranaceis glabris, racemis terminalibus erectis, pedicellis cernuis directione variis ſquamuloſis, laciniis calycis obtuſis ciliatis, corollis ovatis pubeſcentibus. *Nepal.* (A. ſquamuloſa Don.)

formoſa Wallich. 38. A. arboreſcens, foliis lanceolatis acuminatis crenulatis glabris, racemis compoſitis thyrſoideis, pedicellis ſecundis cernuis calycibusque pruinoſis, laciniis calycis ovato-oblongis marginatis, corollis ovalibus. *Nepal.*

pag. 291.

Poſt n. 26. *eucalyptoides* Schlechtend. 39. A. fruticoſa, foliis petiolatis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis lateralibus. *Rio grande.* Sello.

nummularia Schlechtend. 40. A. fruticoſa, foliis breviter petiolatis cordatis ovatis ſubretuſis coriaceis glabriusculis, racemis hiſpidis. *Rio grande.* Sello.

pulcra Schlechtend. 41. A. fruticoſa glabra, foliis petiolatis ovatis mucronatis coriaceis, racemis ſecundis axillaribus terminalibusque laevibus. *Braſil.*

neriifolia Schlechtend. 42. A. fruticoſa glaberrima, foliis petiolatis ovato-lanceolatis acutis coriaceis, panicula racemoſa terminali. *Braſil.*

pag. 292.

Rhododendron arboreum Sm. habet folia ſubtus argenteo-lepidota, racemos multifloros ſubcapitatos.

pag. 294.

Ad *Luſſaciam* *.

Vaccinium * 2. L. glabriuscula, foliis ovalibus mucronatis apice ſubſerratis, racemis aggregatis bracteatis ſecundis, corolla cylindrico-urceolata. *Braſil.* (Vaccinium braſilienſe * Syſt. 2. p. 212. Gay-Luſſacia Pſeudo-Vaccinium Schlechtend.)

ſalicifolia * 3. L. glaberrima pruinoſa, foliis oblongo-lanceolatis apice ſubſerratis, racemis paucifloris ebracteatis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

Rhododendron * 4. L. ramis hiſpidis, foliis obovato-oblongis calloſo-mucronatis apice obſolete ſerratis, floribus racemoſis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

rugoſa * 5. L. ramis hiſpidis, foliis oblongis retuſis rugoſis margine revolutis ſupra ſcabris ſubtus hirſutis, floribus racemoſis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

hiſpida * 6. L. ramis hirtis, foliis oblongis utrinque rotundatis apice calloſis integerrimis margine revolutis hiſpidiusculis, racemis terminalibus foliatis ſtrictis ſecundis viſcoſo-piloſis. *Braſil.* (Gaultheria hiſpida * Syſt. 2. p. 288. Gay-Luſſacia Pſeudo-Gaultheria Schlechtend.)

incana * 7. L. incano-tomentoſa, foliis oblongis calloſo-mucronatis integerrimis revolutis, racemis bracteatis ſecundis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

pinifolia * 8. L. glaberrima pruinoſa, foliis confertis linearibus utrinque attenuatis crenatis, pedunculis paucifloris axillaribus bracteatis. *Braſil.* (Gay-Luſſacia Schlechtend.)

pag. 299.

Ad *Melaſtoma*.

Poſt n. 63. † *normale* Don. 167. M. foliis ovato-ellipticis acutis 5nerviis ſupra hiſpidis ſubtus lanatis, ramis ſetoſo-piloſis, floribus ternis, calyce ſquamulis ciliatis canis appreſſis veſtito. *Nepal.*

pag. 302.

Poſt n. 111. *denticulatum* Labill. 168. M. foliis oblongis acuminatis 3-5nerviis ſubtus flavidis rufo-punctatis, corymbis paucifloris, floribus 6petalis, denticulis lacinias calycis intercedentibus. *Nov. Caledon.*

pag. 309.

Ad *Rhexiam*.

Poſt n. 49. *paniculata* Hamilt. 85. Rh. foliis elliptico-oblongis acuminatis ſerrulatis coriaceis ſubtus ramisque lana-

lanatis, panicula ampla pyramidata, floribus cernuis. *Nepal.* (Arthroſtemma Don.)

pag. 311.

Poſt n. 84. *bidentata* Mart. 86. Rh. fruticoſa, foliis faſciculatis lanceolatis acutis 2dentatis glabris, floribus corymboſis 5andris, calycibus muricatis. *Braſil.*

pag. 312.

Ad *Osbeckiam.*

Ad O. *nepalenſem* Hook. (O. ſpecioſa Don.)

Poſt n. 5. *Chuleſis* Don. 20. O. foliis cordato-oblongis mucronulatis 5nerviis piloſis ſubtus caneſcentibus, ramis lepidotis, floribus corymboſis, ſquamis calycis ciliato-ſetoſis. *Nepal.*

pag. 313.

Poſt n. 17. *ternifolia* Don. 21. O. ramis 3gonis, foliis ternis lanceolatis acutis 3nerviis margine hiſpidis, floribus racemoſo-paniculatis, bracteis cordatis, laciniis calycis acutis hiſpidis. *Nepal.*

roſtrata Don. 22. O. foliis ovato-lanceolatis acutis ſub-5nerviis glabriusculis, floribus corymboſis, bracteis cordatis, calycibus ſetoſis ciliatis. *Nepal.*

anguſtifolia Don. 23. O. foliis ſubſeſſilibus lineari-lanceolatis acutis obſolete 3nerviis ramisque 4gonis piloſis, floribus ſeſſilibus glomeratis bracteatis, laciniis calycis ovatis. *Nepal.*

Ad *Boswelliam.*

B. *turifera* Colebr. habet potius folia pubeſcentia.

B. *balſamifera* * eſt in B. *glabram* Roxb. mutanda.

B. *hirſuta* Sm. (non *.)

Poſt *Garugam* Roxb.:

MAURIA Kunth.

ſimplicifolia Kunth. 1. M. foliis ſimplicibus oblongis obtuſis glabris, ramis verrucoſis, floribus paniculatis. *Patria?* Humb. nov. gen. 7. t. 605. Eadem videtur cum Mangifera axillari Desrouſſ. in Encycl. bot. 3. p. 697. et Cambeſſedea Kunth. ad Humb. nov. gen. 7. p. 2. Hanc Sonneratus ex *Ind. or.* attulerat.

heterophylla Kunth. 2. M. foliis ternatis 2jugisque oblongis retuſis glabris, ramis verrucoſis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Peru.* Humb. nov. gen. 7. t. 606.

Poſt *Baraultiam* Steud.:

CYRTOCARPA Kunth.

procera Kunth. *Nov. Hiſpan.* Arbor proceriſſima, foliis pinnatis, floribus paniculatis albis.

pag. 314.

Ad *Glycoſmida.*

Gl. *pentaphylla* Colebr. (Scleroſtylis Blum.)

cyanocarpa * 3. Gl. foliolis oblongis obtuſiusculis, corymbis axillaribus terminalibusque. *Java.* (Cookia Blum.)

chlorosperma * 4. Gl. foliolis oblongo-lanceolatis, racemis compositis terminalibus. *Java.* (Cookia Blum.)

trifoliata * 5. Gl. foliis simplicibus ternatisque oblongo-lanceolatis obtusis, racemis axillaribus brevissimis. *Java.* (Scleroftylis Blum.)

simplicifolia * 6. Gl. foliis simplicibus oblongo-lanceolatis obtusiusculis, racemis axillaribus brevissimis. *Java.* (Scleroftylis lanceolata Blum.)

Ad *Limoniam.*

Post n. 9. *retusa* Don. 10. L. foliis obovato-ellipticis retusis, petiolis semiteretibus, pedunculis subsolitariis 1floris. *Nepal.*

spinosa * 11. L. spinosa, foliis ovato-oblongis acutiusculis obsolete crenatis, pedunculis 1floris. *Inf. ad Javae oras.* (Scleroftylis Blum.)

pag. 315.

Murraya paniculata Cand. pedunculos habet subsolitarios axillares. Hook. exot. fl. t. 134.

Post *Murrayam:*

MICROMELUM Blum.

pubescens Blum. *Java.* Arbor foliis impari-pinnatis 4jugis, foliolis oblongis subtus ramulisque pubescentibus.

pag. 317.

Ad *Monotropam.*

M. *Morisoniana* Mx. et in *Nepal.* habitare, Don.

humilis Don. 6. M. caule 1floro, squamis approximatis oblongis obtusis integerrimis, petalis intus filamentisque pilosis, stigmate umbilicato 7sulcato. *Nepal.*

pag. 318.

Ad *Gompluam.*

G. *oleaefolia* Hilar. habet petala calycem superantia.

Post n. 9. *parvifolia* Hilar. 25. G. foliis sessilibus parvis ovatis subintegerrimis subtus ramulisque pubescentibus, floribus thyrsoideis bracteatis, petalis orbiculatis. *Brasil.*

floribunda Hilar. 26. G. foliis imbricatis oblongis acutiusculis subintegerrimis, paniculis terminalibus bracteatis, petalis obovato-orbiculatis. *Brasil.*

suaveolens Hilar. 27. G. foliis oblongis acuminatis subintegerrimis subveniis, floribus thyrsoideis numerosissimis parvis, calyce corollam aequante, antheris laevibus. *Brasil.*

cuspidata Hilar. 28. G. foliis oblongis obtusis mucronatis subintegerrimis glaberrimis, racemis terminalibus, antheris transverse rugosis. *Brasil.*

G. *parviflora* Cand. habet folia integerrima, petala calycem superantia. (Correia 2. Vand.)

hexaſperma Hilar. 29. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis obſolete ſerratis ſubtus eveniis, paniculis terminalibus. *Braſil.*

olivaeformis Hilar. 30. G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis obſolete ſerratis, racemis terminalibus, antheris laeviusculis, receptaculo carnoſo turbinato. *Braſil.*

curvata Hilar. 31. G. glaberrima, foliis ovato-oblongis acutis coriaceis venoſis apice ſerrulatis, racemis compactis incurvis, pedicellis tuberculatis, petalis calyce longioribus. *Braſil.*

glauceſcens Hilar. 32. G. glaberrima, foliis ſubcordato-oblongis mucronatis apice ſerrulatis glauceſcentibus, racemis terminalibus, petalis obovatis calycem excedentibus, antheris transverſe rugulosis. *Braſil.*

lucens Kunth. 33. G. foliis ſparſis petiolatis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis remote ſerrulatis obſolete venoſis membranaceis nitidis, racemis terminalibus compoſitis. *Nov. Granat.*

ſemiſerrata Mart. 34. G. foliis ellipticis antrorſum ſerratis coriaceis, floribus paniculatis, petalis orbiculatis. *Braſil.*

perſiſtens Hilar. 35. G. glaberrima, foliis oblongis acuminatis ſerratis coriaceis, paniculis terminalibus, calycibus perſiſtentibus, petalis calycem ſubaequantibus. *Braſil.*

venoſa * 36. G. foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus venoſis, racemis paniculatis, antheris transverſe rugulosis. *Braſil.* (G. nervoſa Hilar.)

humilis Hilar. 37. G. ſuffruticoſa glaberrima, foliis oblongis coriaceis ſubſerratis, racemis paniculatis, petalis obovatis calycem ſuperantibus, antheris transverſe rugulosis. *Braſil.*

nana Hilar. 38. G. ſuffruticoſa, foliis ovato-oblongis acutis ſerratis, ſtipulis perſiſtentibus, floribus axillaribus racemoſis, terminalibus paniculatis, petalis calycem ſubaequantibus, antheris transverſe rugulosis. *Braſil.*

pag. 319.

Ad *Quaſſiam.*

verſicolor * 5. Qu. floribus dioecis 10andris paniculatis, foliis pinnatis, foliolis elliptico-oblongis obtuſiſſimis retuſis coſta media pubeſcentibus. *Braſil.* (Simaruba Hilar.)

Ad *Zwingeram* Schreb.

quaſſioides * 8. Zw. foliis pinnatis 4jugis, foliolis elliptico-oblongis acuminatis ſerratis, corymbis trichotomis, floribus 5andris 5gynis. *Nepal.* (Simaba Don.)

pag. 320.

Ad *Rutam.*

Ante n. 13. Rutae ſimplicifoliae *Aplophyllae* genus Adr. Juſſ.

cordata Don. 23. R. foliis amplexicaulibus cordatis integerrimis glaucis, floribus corymbosis, petalis integerrimis, filamentis glabris. *Nepal.*

pag. 321.

Ad *Eriostemonem* Sm.

Post n. 4. *neriifolius* Sieb. 8. E. foliis lanceolatis marginatis mucronatis punctatis, pedunculis axillaribus 3floris, filamentis barbatis. *Nov. Holl.*

hispidulus Sieb. 9. E. foliis subspathulatis mucronatis callosо-crenatis supra hispidis subtus stellato-villosis, pedunculis 1floris. *Nov. Holl.*

corymbosus Labill. 10. E. foliis oblongis subtus sericeis rufo-lepidotis, corymbis terminalibus, filamentis pilosis, antheris apice nudis. *Nov. Caledon.*

PHEBALIUM Vent.

correaefolium Adr. Juss. 1. Ph. foliis lanceolatis supra scabris subtus stellato-tomentosis, pedunculis axillaribus ternis. *Nov. Holl.* (Ph. ovatum Sieb.)

hexapetalum Adr. Juss. 2. Ph. foliis oblongis obtusis utrinque stellato-tomentosis, pedunculis terminalibus congestis, floribus 6petalis 12andris. *Nov. Holl.*

squamulosum Vent. 3. Ph. foliis lineari-oblongis acutis subtus floribusque lepidotis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Eriostemon lepidotus * Syst. 2. 322.)

anceps Cand. 4. Ph. foliis spathulato-lanceolatis glabriusculis, floribus corymbosis lepidotis, staminibus corolla brevioribus. *Nov. Holl.* (Eriostemon anceps Syst. veg. 2. p. 322.)

Billardierii Adr. Juss. 5. Ph. foliis lanceolatis integerrimis subtus rufo-lepidotis, ramulis angulatis, pedunculis axillaribus 3floris, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Eriostemon squameus Labill., Ph. elaeagnoides Sieb.)

elaeagnifolium Adr. Juss. 6. Ph. foliis linearibus obtusis supra seriatim punctatis subtus argenteo rufoque lepidotis, pedunculis terminalibus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. anceps Sieb.)

salicifolium Adr. Juss. 7. Ph. foliis lineari-lanceolatis crenatis subtus stellato-pulverulentis, floribus axillaribus umbellatis, staminibus exsertis. *Nov. Holl.*

phylicoides Sieb. 8. Ph. foliis linearibus obtusis asperis subtus revolutis, ramis strictis hispidis, fasciculis terminalibus, staminibus exsertis. *Nov. Holl.* (Ph. diosmeum Adr. Juss.)

pag. 323.

Ad *Zygophyllum fruticulosum* Cand., floribus 4fidis. (Röperia Adr. Juss.)

pag. 325.

Ad *Entadam* Adans.

Plumerii * 3. E. foliis 2pinnatis cirro terminatis, partialibus 4-propriis 6jugis, foliolis oblongis obtusis gla-

bris, ſpicis aggregatis denſe imbricatis, caule ſcandente. *Ind. occid.* (Mimoſa polyſtachya L. Syſt. 2. p. 205.)

Ad *Deſmanthum* W.

leptophyllus Kunth. 9. D. ſuffruticoſus inermis, foliis 2pinnatis glabris, partialibus 6-7-propriis multijugis, foliolis inaequilateris linearibus acutis ciliatis, petiolo baſi glandulifero, capitulis paucifloris. *Cumana.*

pag. 326.

Ad *Prosopin.*

Poſt n. 4. *elegans* * 8. Pr. foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis multijugis, foliolis linearibus ſubfalcatis mucronatis, petiolis eglandulofis, ſpicis cylindricis. *Rio grande.* Sello.

Bonplandiana * 9. Pr. foliis 2pinnatis ſubtus pubeſcentibus, partialibus 4-propriis 8-9jugis, foliolis oblongis obtuſis, petiolo eglandulofo, ſpicis geminis terminalibus. *Caracas.* (Adenanthera Bonplandiana Kunth.)

inermis Kunth. 10. Pr. foliis 2pinnatis ſubtus ſubpubeſcentibus, partialibus 3-propriis 6-13jugis lineari-oblongis, petiolo 2-3glandulofo, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Peru.*

dubia Kunth. 11. Pr. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 12-propriis 15jugis, foliolis lineari-oblongis acutis, petiolo 2glandulofo. *Nov. Granat.*

tamariſcina * 12. Pr. foliis 2pinnatis glabriusculis, partialibus propriisque multijugis, foliolis imbricatis linearibus ſubciliatis, petiolo glandulifero, ſpicis terminalibus paniculatis. *Inſ. Maſcaren.* (Acacia W. Syſt. 3. 138., Gagnebina Cand.)

† *elephantorrhiza* * 13. Pr. glaberrima, foliis 2pinnatis, partialibus 10-12-propriis multijugis, foliolis linearibus, petiolis eglandulofis, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Afric. auſtr.* (Acacia Burch. Cand.)

Poſt n. 7. *juliflora* Cand. 14. Pr. ſpinis ſtipularibus geminis, foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis multijugis, foliolis oblongis obtuſis glabris, petiolo baſi glandulifero, ſpicis pendulis, germinibus villoſis. *Ind. occid. Amer. auſtr.* (Mimoſa piliflora Sw., Acacia juliflora W. Syſt. 3. p. 142.)

pag. 327.

Ad *Guilandinam.*

ciliata Berg. 6. Gu. ramis angulatis aculeatis, ramulis ferrugineo-tomentoſis, foliis abrupte pinnatis 3-6jugis glabriusculis, foliolis oblique orbiculatis emarginatis, racemis ſpicatis, lomentis ellipticis aculeatis. *Inſ. Bartholom. in Caribaeis.* O. B. Bergius om Veſtindien Stockh. 1819. Wikſtröm. in Stockh. acad. handl. 1825. p. 431.

pag. 331.

Ad *Combretum.*

Poſt n. 6. *parviflorum* Reichenb. 7. C. foliis oblongis utrinque attenuatis integerrimis venoſis ſubtus lepidotis, ſpicis axillaribus ferrugineis. *Senegambia.*

nanum Don. 8. C. foliis ovalibus obtuſis glabris, ſpicis pubeſcentibus. *Nepal.*

pag. 333.

Ad *Bauhiniam.*

B. *variegata.* (Schnellia microſtachya Radd., Pauletia multinervia Kunth.)

† B. *ungulata.* (Schnellia macroſtachya Radd., Pauletia picta Kunth.)

† B. *parviflora* Vahl. (Pauletia glaucescens Kunth. *Cumana.*)

B. *Pes caprae* Cav. (Caſparea Kunth.)

ſuaveolens Kunth. 24. B. foliis cordatis ſubrotundo-ovatis, lobis rotundatis patulis multinerviis ſubtus pubeſcentibus, racemis terminalibus, calycibus ſericeis. *Nov. Holl.*

B. *porrecta* Ait. (B. cumanenſis Kunth.)

pag. 334.

Ad B. *aculeatam.* (Pauletia glandulosa Kunth.)

Ad B. *heterophyllam* Link. (B. ſplendens Kunth.)

Ad *Caſſiam.*

Ad C. *braſilianam* Lam. (Bactyrilobium ferrugineum Schrad., Caſſia Trinitatis Reichenb., moſchata Kunth.)

Ad C. *javanicam.* (C. Sieberiana Cand.) *Senegambia.*

Humboldtiana Cand. 119. C. foliis 14jugis oblongis acutiusculis ſupra glabris ſubtus villoſiusculis, petiolo eglandulosо, racemis multifloris, leguminibus compreſſiusculis undulato-annulatis. *Ad fl. Magdalen.* (C. ſpecioſa Kunth.)

Ad C. *Fiſtulam.* (C. excelſa Kunth, Bonplandiana Cand.)

pag. 335.

Poſt n. 5. *laeta* Kunth. 120. C. foliis 4jugis elliptico-oblongis acuminatis utrinque villoſis, petiolo eglandulosо, pedunculis 4-8floris. *Nov. Granat.*

Poſt n. 8. *puberula* Kunth. 121. C. foliis 2jugis inaequilateris acutis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, ſuperioribus elliptico-oblongis, inferioribus minoribus ſubrotundo-ovatis, petiolo baſi glandulifero, racemis axillaribus. *Nov. Granat.*

Poſt n. 11. *excelſa* Schrad. 122. C. foliis 10-15jugis elliptico-oblongis mucronatis baſi inaequalibus ſupra glabriusculis nitidis ſubtus villoſis, corymbis paniculatis. *Braſil.* (C. faſtigiata Nees.)

pag. 336.

Poſt n. 24. *ſtrobilacea* Kunth. 123. C. foliolis oblongis emarginatis ſupra piloſiuſculis ſubtus villoſis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus, bracteis flores obvallantibus, leguminibus compreſſis torulosis. *Ad fl. Magdalen.* (C. Tarantan Kunth. var.?)

Poſt n. 29. *fraxinifolia* Kunth. 124. C. foliolis oblongis obtuſis glabris, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus corymboſo-congeſtis, leguminibus compreſſis laevibus. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 337.

Poſt n. 41. *purpurea* Carey. 125. C. foliolis lanceolatis piloſis, petiolo baſi glandulifero, ramis purpureis, racemis congeſtis folio brevioribus, floribus 8andris. *Bengal.* Bot. reg. 856.

pag. 338.

Poſt n. 48. *piſtaciaefolia* Kunth. 126. C. foliolis oblongis retuſis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, petiolo eglanduloſo, floribus racemoſis, leguminibus compreſſis transverſe venoſis. *Popayan in Columbia.*

Ad C. *tomentoſam.* (C. cana Schrank.)

Ad C. *biſloram.* (C. nemoroſa Kunth., roſtrata Mart., averſiflora Herb. in Bot. mag. 2638.)

pag. 339.

Poſt n. 65. *venuſtula* Kunth. 127. C. foliolis obovato-ellipticis obtuſis pubeſcentibus, petiolo baſi glandulifero, racemi terminalis pedunculis 2floris. *Cumana.*

acapulcenſis Kunth. 128. C foliolis obovato-ellipticis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus punctato-maculatis, petiolo baſi glandulifero, pedunculis axillaribus 2floris. *Mexico.*

Poſt n. 70. *artemiſioides* Cand. 129. C. incano-villoſa, foliolis lineari-filiformibus, petiolo baſi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris folio brevioribus. *Nov. Holl.*

glutinoſa Cand. 130. C. foliolis oblongis acuminatis ramisque glutinoſis glabris, petiolo baſi glandulifero, racemis axillaribus paucifloris. *Nov. Holl.*

Alcaparillo Kunth. 131. C. foliolis obovato-oblongis glabris, petiolis baſi glanduliferis, racemis axillaribus terminalibusque laxis. *Peru.*

elliptica Kunth. 132. C. foliolis ellipticis retuſis utrinque incano-villoſis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus. *Cumana.*

Peralteana Kunth. 133. C. foliolis oblongis obtuſis utrinque pubeſcentibus ſubtus incanis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus. *Mexico.*

canescens Kunth. 134. C. foliolis elliptico-ſubrotundis ſupra villoſis ſubtus incano-tomentoſis, petiolo eglanduloſo, racemis axillaribus pendulis. *Quito.*

argentea Kunth. 135. C. foliolis ſubellipticis obtuſis ſericeis ſubtus argenteis, petiolo baſi glanduloſo, floribus axillaribus ſolitariis, terminalibus ſubracemoſis, leguminibus gracilibus. *Mexico.*

pag. 340.

Poſt n. 80. *barbata* Mart. 136. C. foliolis ovato-oblongis obtuſis ſubtus pubeſcentibus, petiolo eglanduloſo, floribus racemoſis bracteatis, leguminibus hirſutis. *Braſil.*

Poſt n. 84. *lotoides* Kunth. 137. C. foliolis obovatis obtuſis glabris, petiolo eglanduloſo, racemis terminalibus viſcoſo-piloſiusculis. *Cumana et ad Orinocum.*

Poſt n. 85. *cultrifolia* Kunth. 138. C. foliolis oblongo-lanceolatis falcato-enſiformibus apice denticulato-ciliatis glabris, petiolo glandulifero, ramis hinc piloſis, pedunculis axillaribus ſolitariis 1floris hirſutis bibracteatis. *Ad Orinocum.*

ſabaginifolia Kunth. 139. C. foliolis dimidiato-cordatis obovatis ſubretuſis glabris ciliatis, petiolo eglanduloſo ramisque villoſis, pedunculis axillaribus 1floris glabris bibracteatis. *Mexico.*

pag. 341.

Poſt n. 91. *viſcoſa* Kunth. 140. C. foliolis obovatis emarginatis viſcoſo-piloſiusculis, petiolo eglanduloſo, ramis racemisque multifloris glutinoſo-piloſis. *Nov. Granat.*

pauciflora Kunth. 141. C. foliolis ellipticis viſcoſis, petiolo eglanduloſo, ramis racemisque terminalibus paucifloris viſcoſo-piloſis. *Mexico.*

Poſt n. 94. *tenella* Kunth. 142. C. foliolis oblongis glabris, petiolo glandulifero, pedunculis 1floris 2bracteatis piloſiusculis, caule procumbente. *Ad Orinocum.*

obcordata Sw. 143. C. foliolis obcordatis ſtriato-venoſis glabris, petiolo baſi glandulifero, pedunculis ſubterminalibus 1floris, leguminibus pubeſcentibus. *Inſ. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 429.

Poſt n. 98. *Swartzii* Wikſtr. 144. C. foliolis ſpathulato-linearibus mucronatis baſi obliquis glabris, pedunculo baſi glandulifero, pedunculis ſubterminalibus 1floris, leguminibus curvatis glabris. *Inſ. Bartholom. in Caribaeis.* Act. holm. 1825. p. 430.

pag. 342.

Ad C. *Patellariam* Cand. (C. biglanduloſa Bertol. in opuſc. ſcient. 3. p. 409.)

flavicoma Kunth. 145. C. foliolis lineari-oblongis pubeſcentibus, glandula ſtipitata petiolari, pedunculis 1floris 2bracteatis ramisque piloſis. *Mexico. Amer. auſtr.* C. riparia, propinqua, ſelipenſis, triſticula, ramoſiſſima Kunth. varr.

Poſt n. 113. *dimidiata* Hamilt. 146. C. foliolis linearibus mucronatis ciliatis, petiolo glandulifero, ſtipulis lan-

ceolatis nervoſis, pedunculis axillaribus geminis 1floris 2bracteatis, leguminibus hirſutis. *Nepal.*

arenaria Kunth. 147. C. foliolis linearibus glabris margine hiſpido-ſcabris, inferioribus ſtipulisque ciliatis, petiolo biglanduloſo, pedunculis 1floris 2bracteatis ramisque piloſis. *Amer. auſtr.*

pag. 343.

Ad *Caeſalpiniam.*

Poſt n. 2. 3. *glabrata* Kunth. 20. C. glaberrima, foliis abrupte 2pinnatis, partialibus 3-4-propriis 4-5jugis, foliolis oblongo-ellipticis utrinque rotundatis coriaceis, racemis terminalibus congeſtis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, leguminibus oblongis ſubtoruloſis. *Quito.*

† *melanoſticta* * 21. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 4jugis, terminali elongato 8jugo, ſtipulis pinnatifidis, racemis elongatis, calycibus foliolisque glanduloſo-punctatis. *Afric. auſtr.* (Melanoſticta Burchellii Cand.)

mollis * 22. C. foliis 2pinnatis, partialibus 2-propriis 4jugis, foliolis ovato-oblongis obtuſis, petiolis racemisque et leguminibus ſubſtipitatis tomentoſis, calycis glanduloſi lacinia inferiore fimbriata. *Ad fl. Magdalen.* (Adenocalyx racemoſus Berter., Coulteria mollis Kunth.)

pectinata Cav. 23. C. foliis 2pinnatis glabris, partialibus 2-4-propriis 6-8jugis, foliolis oblongis, nervo medio ſubtus pubeſcente, calycis hirſuti lacinia inferiore fimbriata. *Amer. auſtr.* (Coulteria tinctoria Kunth.)

pag. 344.

Poſt n. 16. *ligulata* Rottl. 24. C. foliis 2pinnatis, partialibus 4-propriis 6jugis, foliolis ovalibus obtuſis, petiolis retrorſum aculeatis, floribus paniculatis. *Ind. or.*

Cacalaco Humb. 25. C. foliis abrupte 2pinnatis, partialibus propriisque 4jugis, foliolis obovato-ſubrotundis emarginatis membranaceis glabris nitidis, racemis terminalibus villoſis, ſtaminibus corollam ſubaequantibus, leguminibus toruloſis. *Mexico.* Humb. pl. aequinoct. 2. t. 137.

horrida * 26. C. foliis 2pinnatis aculeatis glabris, partialibus 2-propriis 4-7jugis, foliolis oblongis, calycis hirſuti lacinia infima fimbriata. *Amer. auſtr.* (Coulteria horrida Kunth. Humb. nov. gen. 6. t. 568.)

Poſt *Caeſalpiniam:*

BOWDICHIA Kunth.

virgilioides Kunth. *Amer. auſtr.* Arbor inermis foliis pinnatis, foliolis oblongis obtuſis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, racemis congeſtis, floribus violaceis.

pag. 345.

Ad *Cubaeam* Scop.

ſpecioſa * 4. C. arborea, foliis pinnatis, panicula ampla prolifera. *Braſil.* (Moldenhawera floribunda Schrad., Dolichonemia ſpecioſa Nees.)

Ad *Parkinſoniam.*

orientalis * 3. P. inermis, foliis pinnatis glabris, foliolis ſub-7jugis alternis oblongis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Inſ. Molucc.* (Solulus arbor Rumph. 4. t. 128. Diphaca cochinchinenſis Lour., Dalbergia Diphaca Perſ.)

Ad *Afzeliam* Sm.

bijuga * 2. A. foliis 2jugis ellipticis coriaceis glabris, racemis lateralibus, floribus polygamis 7andris. *Guinea.* (Pancovia bijuga W. Syſt. veg. 2. p. 167.)

Ad *Hymenaeam.*

Candolleana Kunth. 4. H. foliolis baſi inaequalibus coriaceis oblongis emarginatis, pedunculis terminalibus multifloris, germinibus polyſpermis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 566.

floribunda Kunth. 5. H. foliolis baſi inaequalibus coriaceis oblongis obtuſe acuminatis, paniculis axillaribus, leguminibus ovatis hirſutis 1-2ſpermis. *Guiana.* Humb. nov. gen. 6. t. 567.

Ad *Myroſpermum.*

oubeſcens Cand. 4. M. foliis impari-pinnatis ſubtus pubeſcentibus, foliolis ſubcordato-oblongis acutiuſculis emarginatis, petiolis ramulisque hirtis. *Amer. auſtr.* (Myroxylon pubeſcens Kunth., peruiferum Lamb.)

pag. 346.

Anagyris chinenſis * (Macrotropis foetida Cand.)
A. *inodora* Lour. (Macrotropis Cand.)

Ad *Sophoram.*

Ad S. *tomentoſam.* (S. havanenſis Jacqu.)
Poſt n. 3. *craſſifolia* Jaum. 8. S. arborea, foliolis inaequilateris oblongis obtuſis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, racemo terminali elongato. *Senegambia.*

macrocarpa Sm. 9. S. arborea, foliolis elliptico-oblongis obtuſis rigidis ſubtus ſubſericeis, racemis axillaribus abbreviatis. *Chili.* (Maju, Molin. chil. ed. nov. p. 146. quam pro Caſſia ſtipulacea W. habet.)

glauca Leſchen. 10. S. fruticoſa, foliolis ellipticis mucronatis ſupra glaucis ſubtus villoſis, racemis terminalibus confertis. *Ind. or.*

litoralis Schrad. 11. S. fruticoſa, foliolis ſubrotundo-ellipticis ſupra glabris ſubtus tenuiſſime ſtrigillofis caneſcentibus, racemis terminalibus. *Braſil.* (S. arenicola Nees)

S. *obliqua* Perſ. deleatur, reditura ſub *Acaciis.*

pag. 347.

Ad *Podaliriam* Lam.

P. *hirſuta* W. (P. Burchellii Cand.)

coruſcans Reichenb. 10. P. foliis ſubſeſſilibus confertis ovato-lanceolatis acutis utrinque ſericeo-villoſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus. *C. B. S.*

pag. 348.

Ad *Baptiſiam* Vent.

mollis Nutt. 9. B. foliis petiolatis ſubrhombeo-lanceolatis cauleque decumbente pubeſcentibus, ſtipulis lineari-lanceolatis, racemis ſpicatis terminalibus, leguminibus apice ſubulatis. *Carolina.* (Podaliria mollis Mx.)

Poſt n. 8. †*nepalenſis* Hook. 10. B. caule fruticoſo glabro, foliis petiolatis ternatis, foliolis lanceolatis acuminatis ſubſericeis, ſtipulis deciduis, paniculis axillaribus. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 131.

Ad *Virgiliam* Lam.

ſylvatica Cand. 5. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 6-7jugis ovalibus obtuſis, paniculis terminalibus. *Afr. auſtr.* (Sophora ſylvatica Burch.)

lutea Mx. 6. V. foliis impari-pinnatis glabris, foliolis 5jugis ovatis acuminatis, leguminibus ſtipitatis glabris. *Amer. bor.*

Ad *Cyclopiam* Vent.

geniſtoides Vent. 1. C. foliolis linearibus obtuſis calycibusque muticis, ramis glabris. *C. B. S.* (Sophora geniſtoides L. Berg. cap. p. 140., Podaliria W., Galega Thunb.)

galioides Cand. 2. C. foliolis ſubulatis ſulcatis mucronatis, calycibus acuminatis, ramis hirſutis. *C. B. S.* (Sophora galioides Berg. cap. p. 141., Aſpalathus calloſa Burm.)

latifolia Cand. 3. C. foliolis ovato-ellipticis ſubmucronatis, calycibus acutis. *C. B. S.* (Geniſta buxifolia Burm.)

Ad *Thermiam* Nutt.

laburnifolia * 3. Th. foliis ternatis elliptico-oblongis acutis ſubſericeis, ſtipulis grandibus coalitis oppoſitifoliis caducis, racemis paucifloris, caule fruticoſo. *Nepal.* (Thermopſis laburnifolia Don., napaulenſis Cand.)

fabacea * 4. Th. foliis ternatis ſtipulisque diſtinctis late ovatis glabris, racemo terminali, caule herbaceo. *Camtſchatca. Inſ. Carib.* (Sophora fabacea Pall. aſtrag. t. 90. f. 2., Thermopſis Cand.)

alpina * 5. Th. foliis ternatis ſeſſilibus ſtipulisque caulinis verticillatis ovatis villoſis, ſpica terminali bracteata. *Imaus.* (Sophora alpina Pall. aſtrag. t. 90. f. 1., Thermopſis corgonenſis Cand.)

pag. 349.

Ad *Edwardſiam* Salisb.

nitida Cand. 4. E. fruticoſa, foliis pinnatis ſericeis, foliolis obovatis obtuſis emarginatis. *Inſ. Maſcaren.* (Sophora nitida Sm., ſericea Jaum.)

denudata Cand. 5. E. fruticoſa, foliis pinnatis ſupra glabris ſubtus ſericeis, foliolis ellipticis retuſis. *Inſ. Maſcaren.* (Sophora denudata Bory., retuſa Perſ.)

Ad *Chorizema* Labill.

Henchmanni R. Br. 4. Ch. foliis ſolitariis ternatisque lineari-filiformibus mucronatis piloſiusculis, ramis calycibusque bracteatis viſcoſis, floribus racemoſis. *Nov. Holl.* Bot. reg. 986. (Podolobium aciculare Cand.)

† *platylobioides* Cand. 5. Ch. foliis ovatis acuminatis reticulatis integerrimis ſupra glabris ſubtus villoſis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus, germinibus villoſiſſimis. *Nov. Holl.* (Platylobium reticulatum Sieb.)

Ad *Podolobium* R. Br.

ſtavrophyllum Sieb. 2. P. foliis oppoſitis 3fidis coriaceis glaberrimis, laciniis ſubaequalibus integerrimis apice ſpinoſis, germine glabro. *Nov. Holl.*

ſcandens Cand. 3. P. foliis oppoſitis oblongis integerrimis apice ſetifero-mucronatis reticulatis ſubtus ſtrigilloſis, germine villoſo, caule ſcandente. *Nov. Holl.* (Chorizema ſcandens Sm., Davieſia umbellata et humifuſa Sieb.)

ſericeum Cand. 4. P. foliis oppoſitis alternisque ellipticis calycibusque ſericeis, racemis axillaribus folia aequantibus, germine ſetoſo. *Nov. Holl.* (Chorizema ſericeum Sm.)

Ad *Oxylobium* Andr.

retuſum R. Br. 4. O. foliis oblongis retuſis coriaceis reticulatis glabris, corymbis axillaribus pedunculatis congeſtis folio brevioribus. *Nov. Holl.* (Chorizema coriaceum Sm. Podolobium? Cand.) Bot. reg. 913.

ſpinoſum Cand. 5. O foliis ternis late ovatis glabris apice ſtipulisque ſpinoſis. *Nov. Holl.*

† *Pultenaeae* Cand. 6. O. foliis verticillatis alternisque linearibus obtuſiusculis margine revolutis ſubtus ramisque pubeſcentibus, umbellis pedicellatis. *Nov. Holl.* (Pultenaea ſylvatica Sieb.)

pag. 350.

Ad *Gompholobium* Sm.

G. *minus* Sm. deleatur, rediturum ſub *Burtonia*.

Ad G. *grandiflorum* Sm. G. ſetifolium Sieb. var. foliis anguſtiſſimis elongatis ſetaceis.

barbigerum Cand. 7. G. foliolis ſpathulato-linearibus mucronatis glabris, pedunculis ſolitariis, carina apice denſe

barbata, vexillo amplo calycem ſuperante. *Nov. Holl.* (G. fimbriatum Sieb.)

virgatum Sieb. 8. G. foliolis erectis linearibus obtuſiusculis apice callofis, ramis teretibus, pedunculis ſubracemoſis, carina imberbi. *Nov. Holl.*

tetrathecoides Sieb. 9. G. foliolis lineari-filiformibus ſubmucronatis abbreviatis, ramis teretibus, breviſſime villoſis, floribus ſubterminalibus, carina imberbi. *Nov. Holl.*

pedunculare Cand. 10. G. foliolis inferioribus obovatis mucronatis, ſuperioribus lineari-lanceolatis acuminatis, ſtipulis petiolum aequantibus, pedunculis elongatis baſi apiceque 2bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Calliſtachyn* Vent.

ovata Sims. 2. C. foliis ternis obovatis mucronatis. *Nov. Holl.* Bot. mag. t. 1925.

Ad *Pultenaeam* Sm.

Poſt n. 8. *parviflora* Sieb. 18. P. foliis ſpathulatis recurvo-mucronatis ſubeveniis glabris, junioribus ramulisque ſubvillofis, ſtipulis rufis ſcariofis appreſſis, capitulis paucifloris. *Nov. Holl.*

plumoſa Sieb. 19. P. foliis linearibus concavis eveniis, junioribus ramisque villoſis, floralibus villoſiſſimis, ſtipulis fuſcis ſcariofis appreſſis, capitulis ſubrotundis. *Nov. Holl.*

thymifolia Sieb. 20. P. foliis obovatis concavis eveniis glabris, ſuperioribus villoſis, ſtipulis deciduis, capitulis compactis. *Nov. Holl.*

hypolampra Sieb. 21. P. foliis oblongis obtuſis glabris ſubtus nitidis punctatis ſub-3nerviis, ſtipulis ſcariofis ariſtatis, capitulis ſubſpicatis foliatis, calycibus villoſis. *Nov. Holl.*

capitellata Sieb. 22. P. foliis ſpathulatis ſupra nitidis ſubtus incano-ſericeis, ramis glabris exſtipulatis, capitulis compactis villoſis. *Nov. Holl.*

ariſtata Sieb. 23. P. foliis linearibus convolutis enerviis ſubtus aſperis baſi ciliatis, ſtipulis fuſcis elongatis ſubulatis, calycibus villoſiſſimis ariſtatis. *Nov. Holl.*

echinata Sieb. 24. P. foliis confertis tereti-ſubulatis mucronatis ſulcatis aſperis, ſtipulis ſubulatis, bracteis ramoſo-piloſis. *Nov. Holl.*

phylicoides Sieb. 25. P. foliis linearibus obtuſiusculis margine revolutis ſupra aſperis ſubtus ramulisque incanis, capitulis ſubrotundis, calycibus obtuſis. *Nov. Holl.*

paleacea Sm. 26. P. foliis linearibus ſetaceo-mucronatis margine revolutis ſericeis apice incurvis, bracteis ſcariofis mucronatis calyces ſuperantibus. *Nov. Holl.*

biloba R. Br. 27. P. foliis bilobo-retuſis ſupra ſcabris ſubtus ramisque incano-pubeſcentibus, ſtipulis ſetaceis recurvis, calycibus ſericeo-villoſis. *Nov. Holl.* (P. deltoidea Sieb.)

pag. 351.

Ad P. *dentatam* Labill. deleatur ſyn. P. paleacea Sm.

Ad P. *ſtipularem* Sm. (P. pſoraleoides Sieb., non proteoides ut Cand. ſcribit.)

Ad P. *ferrugineam* Rudg. (P. lanata Sieb.)

Poſt n. 17. *racemuloſa* Sieb. 28. P. foliis obovato-ellipticis obtuſis ſupra ſcabris ſubtus glabris, ramulis pubeſcentibus, racemulis axillaribus foliatis. *Nov. Holl.*

villifera Sieb. 29. P. foliis ovato-lanceolatis cuſpidato-ariſtatis ſubtus nitidis 3nerviis longiſſime ciliatis, ramulis hirtis, floribus axillaribus, bracteis ſcarioſis cuſpidatis. *Nov. Holl.*

euchila Cand. 30. P. foliis ſpathulato-linearibus obtuſis glabris ſubtus glaucis, ramulis exſtipulatis angulatis, pedunculis ſubracemoſis, laciniis calycis inaequalibus, aliis latis obtuſis, aliis linearibus acutis. *Nov. Holl.* (Dillwynia cuneata Sieb.)

microphylla Sieb. 31. P. foliis ſpathulato-linearibus calloſo-mucronatis ſupra glabris ſubtus ramulisque incanis, floribus ſubcapitatis, calycibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

aſperata Sieb. 32. P. foliis linearibus revolutis glabriuſculis ſupra tuberculoſo-aſperis, ramulis exſtipulatis calycibusque glabris, floribus lateralibus ſubſpicatis foliatis. *Nov. Holl.*

comoſa Sieb. 33. P. foliis linearibus revolutis ſupra muricato-aſperis ſubtus ramulisque exſtipulatis ſtrigilloſis, floribus lateralibus ſubſpicatis foliatis. *Nov. Holl.*

ſquarroſa Sieb. 34. P. foliis linearibus apice recurvo-mucronatis revolutis ſquarroſis ſcabris, ramulis exſtipulatis, floribus foliatis, calycibus ſpinuloſis. *Nov. Holl.*

pag. 352.

Ad *Daviesiam* Sm.

D. *reticulatam* Sm. ſatius eſt cum Candolleo Jackſoniis accenſere.

racemuloſa Cand. 13. D. foliis lineari-lanceolatis acuminatis pungentibus, racemis ſolitariis bracteatis folio brevioribus. *Nov. Holl.*

Ad *Dillwyniam* Sm.

D. *parvifolia* R. Br. — foliis ſubcarnoſis punctatis oblique mucronatis.

Ad D. *ericaefoliam* Sm. D. pinifolia Sieb. var.

acicularis Sieb. 6. D. foliis filiformibus mucronatis rigidis erectis glabris, ramulis incanis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*

rudis Sieb. 7. D. foliis lineari-filiformibus mucronatis rigidis aſperis, ramulis villoſis, racemis ſpicatis foliatis. *Nov. Holl.* D. hiſpidula et teretifolia Sieb. varr.

cineraſcens R. Br. 8. D. foliis lineari-filiformibus patentibus mucronato-pungentibus, junioribus ramulisque ſtrigilloſis, racemis paucifloris ſubterminalibus, calycibus ſericeis. *Nov. Holland.* (P. juniperina Sieb.)

tenuifolia Sieb. 9. D. foliis linearibus gracillimis obtuſiusculis rectis, ramulis ſubpubeſcentibus, pedunculis ſolitariis. *Nov. Holl.*

pag. 353.

Ad *Aotum* Sm.

villoſa Sm. 1. A. foliis linearibus revolutis acutiusculis ſupra nitidis patentibus, ramulis pubeſcentibus, calycibus ſubſolitariis villoſis. *Nov. Holl.* (Pultenaea rosmarinacea Sieb.)

virgata Cand. 2. A. foliis linearibus obtuſis revolutis ſupra ſcabris erectis ſtrictis, ramis tomentoſis, floribus racemoſo-ſpicatis lateralibus, calycibus ſericeis. *Nov. Holl.* (Pultenaea virgata Sieb.)

Ad *Jackſoniam* R. Br.

reticulata Cand. 3. J. fruticoſa, foliis lanceolatis pungentibus utrinque reticulato-venoſis, ſtipulis geminis, floribus axillaribus ſolitariis. *Nov. Holl.* (Daviesia Sm.)

furcellata Cand. 4. J. fruticoſa, ramis teretibus, ramulis furcellatis inermibus compreſſis ſtriatis, racemis terminalibus, pedicellis apice bracteatis. *Nov. Holland.* (Gompholobium furcellatum Bonpl. plant. Navarr. t. 11.)

horrida Cand. 5. J. fruticoſa, ramis angulatis, ramulis foliiformibus angulato-compreſſis ſpineſcentibus, racemis terminalibus, pedicellis medio bracteatis. *Nov. Holl.*

Ad *Burtoniam* R. Br.

ſcabra R. Br. 1. B. foliis petiolatis ternatis lineari-ſubulatis ſubaduncis ſcabris muticis, ramulis teretibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.* (Gompholobium ſcabrum Sm.)

minor Cand. 2. B. foliis ſeſſilibus ternatis linearibus aduncis mucronatis erectis laevibus, ramulis teretibus hirtis. *Nov. Holl.* (Gompholobium minus Sm.) B. ſeſſilifolia Cand. var. foliis longioribus.

conferta Cand. 3. B. foliis ſimplicibus confertiſſimis lineari-ſubulatis margine revolutis ramisque glabris. *Nov. Holl.*

Ad *Mirbeliam* Sm.

ſpecioſa Sieb. 3. M. foliis linearibus acutiusculis revolutis integerrimis, pedunculis axillaribus aggregatis, calycibus ſericeis. *Nov. Holl.*

Poſt *Mirbeliam*:

BAPHIA Afzel.

nitida Loddig. *Afric. occid.* Arbor foliis pinnatis oblongis nitidis, floribus pedunculatis axillaribus albis.

Ad *Ormoſiam* Jackſ.

daſycarpa Jackſ. 1. O. ramis ferrugineis leguminibusque tomentoſis, foliolis oblongis acuminatis glabris. *Ind. occid.* (Sophora monoſperma Sw., Podaliria Poir.)

coccinea Jackſ. 2. O. foliolis ſubovatis coriaceis revolutis utrinque leguminibusque glabris. *Guiana.* (Robinia coccinea Aubl.)

coarctata Jackſ. 3. O. foliolis inaequalibus ſupra glabris ſubtus ferrugineo-hirſutis. *Guiana.*

pag. 354.

Ad *Samydam.*

Poſt n. 6. *macrocarpa* Cand. 15. S. foliis ovatis acutis ſerratis ſubtus ſubtomentoſis, pedunculis axillaribus breviſſimis ſubaggregatis. *Mexico.*

pag. 356.

Ad *Caſeariam.*

Poſt n. 23. *glomerata* Roxb. 24. C. foliis ovali-oblongis acuminatis glabris ſubſerratis, pedunculis faſciculatis abbreviatis 1floris. *Bengal.*

pag. 357.

Ad *Copaiferam.*

* *Foliis abrupte pinnatis,*

† *pellucido-punctatis.*

Juſſieui Hayn. 1. C. foliolis alternis ovato-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris. *Peru.?* Hayn. plant. off. 10. t. 17. b.

laxa Hayn. 2. C. foliolis ſuboppoſitis ovato-ellipticis obtuſis ſubtus ad coſtam petiolisque pubeſcentibus, ſpicis pedunculatis compoſitis villoſis. *Braſil.* Hayn. plant. off. 10. t. 18.

Langsdorffii Desf. 3. C. foliolis 3-5jugis alternis ellipticis obtuſis ciliatis ſplendidis, petiolis pedunculisque pubeſcentibus, ſpicis compoſitis. *Braſil.* Mém. du muſ. 7. t. 14. Hayn. plant. off. 10. t. 19.

oblongifolia Mart. 4. C. foliolis ſuboppoſitis 6-8jugis elliptico-oblongis ſubemarginatis glabris, petiolis pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis, ſpicis compoſitis folio brevioribus. *Braſil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. a.

† *trapezifolia* Hayn. 5. C. foliolis alternis 7jugis trapezio-ovatis obtuſis glabris, petiolis pubeſcentibus. *Braſil.* Hayn. plant. off. 10. t. 23. b. c.

multijuga Mart. 6. C. foliolis alternis multijugis ovato-oblongis acuminatis nitidis glabris coſtato-venoſis. *Braſil.*

bijuga W. herb. 7. C. foliolis oppoſitis 2jugis oblique ovato-oblongis acutiusculis coriaceis nitidis petiolisque glabris, ſpicis paniculatis. *Braſil.* Hayn. plant. off. 10. t. 16.

8.

Jacquini Desf. 8. C. foliolis alternis 2-5jugis ovato-oblongis acutiusculis nitidis parallele venosis petiolisque glabris, spicis paniculatis. *Inf. Carib. Nov. Granat.* (Copaiva officinalis Jacqu., Copaifera officinalis W. Cand. Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)

guianensis Desf. 9. C. foliolis oppositis 4jugis subcordato-oblongis acuminatis parallele venosis glabris nitidis, spicis compositis. *Guiana.* Mém. du mus. 7. t. 13.

†† *Foliis epunctatis.*

Martii Hayn. 10. C. foliolis oppositis sub-3jugis ovali-oblongis acutiusculis margine subrevolutis petiolisque glabris, spicis paniculatis. *Brasil.* Hayn. plant. off. 10. t. 15.

nitida Mart. 11. C. foliolis oppositis sub-4jugis ovato-oblongis acutis reticulato-venosis nitidis petiolisque glabris, ramulis verrucosis, racemis spicatis paniculatis elongatis, floribus remotiusculis. *Brasil.* Hayn. pl. off. 10. t. 17. a.

coriacea Mart. 12. C. foliolis oppositis sub-3jugis ovalibus emarginatis coriaceis glabris subtus glaucescentibus, spicis paniculatis. *Brasil.* Hayn. pl. off. 10. t. 20.

cordifolia Hayn. 13. C. foliolis oppositis sub-5jugis cordato-oblongis obtusis subtus ad costam petiolisque pubescentibus, pedunculis racemosis. *Brasil.* Hayn. pl. off. 10. t. 21.

Selloi Hayn. 14. C. foliolis subalternis 4jugis lanceolatis obtusiusculis, petiolis subtomentosis, spicis paniculatis. *Brasil.* Hayn. pl. off. 10. t. 22.

** *Foliis impari-pinnatis vix pellucido-punctatis.*

Beyrichii Hayn. 15. C. foliolis sub-3jugis oblongo-lanceolatis acuminatis petiolisque glabris, pedunculis racemosis. *Brasil.* Hayn. pl. off. 10. t. 12.

Post *Crudiam* Schreb.:

GEISSOIS Labill.

racemosa Labill. *Nov. Caledon.* Arbor foliis quinato-digitatis subtus discoloribus, stipulis oppositis magnis oblongis, floribus racemosis.

DETARIUM Juss.

senegalense Juss. *Senegambia.* Arbor foliis impari-pinnatis subtus villosis, floribus racemosis.

pag. 359.

Ad *Bucidam.*

megapotamica *3. B. racemis subcorymbosis, bracteis sericeis, calycibus lanatis, foliis oblongis lanceolatis obtusis submucronatis. *Ad fl. magnum Amer. austr.*

B. *capitata* Vahl. habet bracteas villosas calycesque glabros: B. *Buceras* bracteas caducas, calyces sericeos.

pag. 360.

Ad Hydrangeam.

Poſt n. 1. *anomala* Wallich. 6. H. cymis terminalibus hirſutis, floribus conformibus, foliis ovatis acuminatis ſinuato-dentatis nudiusculis, petiolis nervisque piloſis. *Nepal.*

heteromalla Wallich. 7. H. cymis radiatis diffuſe ramoſiſſimis piloſis, radiis integerrimis, foliis oblongis acuminatis ſerrulatis ſubtus tomentoſis. *Emodi montes.*

aſpera Don. 8. H. corymbis paniculatis diffuſis radiatis, radiis ovatis mucronatis ſerratis, foliis lanceolatis acuminatis ſerrulatis ſubtus ramulisque denſe incano-tomentoſis. *Nepal.*

pag. 361.

Ad *Tiarellam.*

polyphylla Wallich. 5. T. foliis cordatis 3-5lobis argute ſerratis utrinque piloſis, caule glanduloſo-piloſo, racemo laxo, laciniis calycis oblongis mucronatis. *Emodi montes.*

pag. 362.

Ad *Saxifragam.*

Poſt n. 11. *folioloſa* R. Br. 118. S. foliis radicalibus cuneatis ſubdentatis, caule diviſo folioloſo, ramis 1floris, calycibus obovatis, petalorum laminis cordato-lanceolatis. *Inſ. Melville.* (S. ſtellaris β. comoſa W.)

Poſt n. 13. *cuſcutaeformis* Loddig. 119. S. ſtolonibus reptantibus, foliis cordato-orbiculatis repandis utrinque hirſutis albo-venoſis, ſcapo ſubbifloro pubeſcente, petalis aequalibus lanceolatis. *China.* Bot. mag. 2631.

pag. 363.

Poſt n. 22. †*hyperborea* R. Br. 120. S. foliis glaberrimis, radicalibus palmatis, petiolis elongatis, caule lanato ſubbifloro, bracteis oblongo-linearibus ſeſſilibus, petalis 1nerviis. *Inſ. Melville.*

†*petiolaris* R. Br. 121. S. foliis radicalibus palmatis ſubſeſſilibus glanduloſis, florali lobato, ſcapo foliis ſubbreviori, petalis 3nerviis. *Amer. arctic.*

pag. 369.

Ad S. *petraeam.* S. cervicornis Viv. var. *Corſica.*

pag. 371.

Ad *Gypſophilam.*

Poſt n. 2. *dioeca* * 32. G. floribus paniculatis dioecis, foliis ſeſſilibus lanceolatis, calycibus ovatis baſi ſubangulatis glabris, bracteis foliaceis acutis. *Ad fl. Platam.* Sello. (Saponaria dioeca Schlechtend.)

pag. 372.

Poſt n. 15. *ceraſtioides* Wallich. 33. G. caule erecto 4gono piloſo, foliis obovatis ſubſeſſilibus hirſutis, floribus corymboſis, laciniis calycis lanceolatis acutis membranaceo-fimbriatis, petalis emarginatis. *Nepal.*

pag. 373.

Poſt n. 29. *transſylvanica* * 34. G. caule herbaceo ſtricto, foliis linearibus carinatis obtuſiusculis, floribus faſciculatis, bracteis minutis, calycibus coloratis, ſtaminibus alternis abortientibus. *In alpibus dinariis.* (Banffya petraea Baumg. transſylvan. 1. 385. Syſt. veg. 1. 866.)

pag. 377.

Ad *Dianthum.*

Ad D. *diffuſum* Sm. D. *graminifolius* Presl. *Sicilia* var.

pag. 381.

Poſt n. 73. *ſiculus* Presl. 78. D. caule caeſpitoſo 1floro, ſquamis calycis ſubſenis obovatis mucronatis tubo triplo brevioribus, petalis fimbriato-dentatis, foliis linearibus canaliculatis ciliato-ſcabris. *Sicil.*

Arroſtii Presl. 79. D. caule caeſpitoſo ſub-1floro, ſquamis calycis quaternis emarginatis mucronatis tubo quater brevioribus, petalis fimbriato-dentatis imberbibus, foliis linearibus canaliculatis glauceſcentibus rigidis ſerrulatis. *Sicil.*

pag. 382.

Ad *Chryſoſplenium oppoſitifolium.* (Chr. nepalenſe Don.) - *Emodi montes.*

pag. 384.

Ad *Malpighiam.*

Poſt n. 21. *macrophylla* W. ſuppl. 37. M. foliis amplis ovalibus integerrimis ſupra ſericeo-ſtrigillosis ſubtus ſetoſo-aculeatis, umbellis lateralibus ſeſſilibus. *Braſil.* Coll. hort. ripul. t. 11.

pag. 391.

Ad *Schinum.*

† *terebinthifolius* Radd. 5. Sch. foliis impari-pinnatis ſub-3jugis ſubaequalibus ſubſerratis, floribus racemoſis. *Braſil.*

pag. 392.

Ad *Stellariam.*

Poſt n. 3. *monogyna* Wallich. 41. St. caule ramoſiſſimo procumbente glabro, geniculis barbatis, foliis petiolatis

fubrotundis nervofis glabris, umbellis dichotomis pedunculatis, floribus 5andris 1ftylis. *Nepal.*

Poft n. 10. *faxatilis* Hamilt. 42. St. caule erecto fimpliciusculo foliisque elliptico-oblongis mucronulatis utrinque tomentofis, pedunculis axillaribus trichotomis multifloris, calycibus acuminatis corolla longioribus. *Nepal.*

Edwardfii R. Br. 43. St. caule glabro, foliis ovato-lanceolatis integerrimis enerviis nitidis, pedunculis terminaliviis fub-1floris, petalis 2partitis lacinias calycis 3nervias fuperantibus, antheris purpureis. *Amer. arctic.*

marginata Chamiff. 44. St. caule caefpitofo glaberrimo 4gono, foliis connatis ovato-lanceolatis cartilagineo-marginatis apice uncinatis, pedunculis axillaribus folitariis, petalis capfulisque calycem aequantibus. *Orae freti Bering.*

crifpa Chamiff. 45. St. caule diffufo glaberrimo, foliis breviffime petiolatis ovatis acuminatis repando-undulatis 3nerviis, pedunculis axillaribus folitariis, calycibus 3nerviis petala fuperantibus. *Inf. Aleut.*

pag. 393.

St. *tetragona* Blum. in *Java* a St. uliginofa Sm. vix differt.

Poft n. 20. *patens* Wallich. 46. St. caule decumbente foliisque feffilibus lineari-lanceolatis acutis utrinque villofis, pedunculis axillaribus 3fidis paucifloris, calycibus acutis glabris corollam aequantibus. *Nepal.*

monofperma Hamilt. 47. St. caule elato foliisque feffilibus late lanceolatis acuminatis glabris, panicula terminali trichotoma multiflora, calycibus obtufis corolla brevioribus, capfula 1fperma. *Nepal.*

nitida Hook. 48. St. caule erecto 4gono fuperne glaberrimo, foliis lanceolatis nitidis ficcitate 3nerviis, pedunculis fubpaniculatis, calyce obtufo petalis breviori. *Grönland.*

laeta Richardf. 49. St. caule decumbente foliisque lineari-lanceolatis carinatis laevibus glaucis, pedunculis fubgeminis terminalibus, calyce villofiusculo petala aequante. *Amer. arctic.*

gracilis Richardf. 50. St. caule gracili 4quetro foliisque lanceolatis enerviis glaberrimis, ramis fterilibus gemma foliorum terminatis, flore folitario fubterminali, calyce 3nervio petalis fubbreviori. *Ad finum Hudfon.*

pag. 394.

Poft n. 35. *liguftrina* * 51. St. caule fuffruticofo erecto ramofo, foliis lanceolatis acutis revolutis fub-3plinerviis glabris, floribus paniculatis, petalis calyce brevioribus, capfula 3valvi. *Inf. Sandwich.* (Schiedea liguftrina Chamiff.)

pag. 396.

Ad *Arenariam.*

Poſt n. 17. *Redowskii* Chamiſſ. 117. A. caule procumbente caeſpitoſo, foliis ovatis utrinque attenuatis mucronatis glabris baſi ciliatis, pedunculis terminalibus calycibusque corolla brevioribus pubeſcentibus. *Sibir.?*

nepalenſis * 118. A. caule diffuſo angulato, foliis petiolatis oblongis mucronatis ciliato-ſerrulatis, floribus corymboſo-paniculatis, pedunculis glanduloſis bracteatis, calycibus amplis coloratis obtuſis, petalis minutis, capſula 1ſperma. *Nepal.* (Brachyſtemma calycinum *Nepal.*)

pag. 397.

Poſt n. 29. *Salzmanni* Presl. 119. A. caule ramoſiſſimo flaccido villoſo, foliis oblongo-lanceolatis acutis hiſpidis ciliatis, panicula dichotoma, calycibus 3nerviis margine ſcarioſis corolla brevioribus capſula ſubgloboſa longioribus. *Sicil.*

Ad A. *procumbentem* Vahl. A. roſea Presl.

pag. 398.

Poſt n. 45. *abietina* Presl. 120. A. caule caeſpitoſo aſcendente pauciflоro ſubvilloſo, foliis lineari-lanceolatis ariſtatis rigidis glabris baſi ciliatis, petalis obovatis emarginatis calycem acuminatum ſuperantibus. *Sicil.*

elegans Chamiſſ. 121. A. caule caeſpitoſo ramoſo foliisque linearibus obtuſis craſſiuſculis glaberrimis, pedunculis ſolitariis, calycibus ſubulatis, capſula 3valvi. *Aſia arctica ad ſretum Bering.*

pag. 399.

Ad A. *polygonoidem* Wulf. varietas e ſolo ſterili pertinet: *Gouffeia arenarioides*, quam Robillard et Caſtagne in agro maſſilienſi invenerunt, ſtylo tertio abortiente. Semina duo vel tria, quae quaterna in A. polygonoide. Cand. fl. gall. 6. 609. Semina ſubſolitaria in Stellaria monoſperma Hamilt., Arenaria bavarica L. et nepalenſe *.

Poſt n. 59. *quadrivalvis* R. Br. 122. A. caule caeſpitoſo, foliis lineari-ſubulatis 3nerviis glabris, pedunculis unifloris elongatis pubeſcentibus, calycibus acutiſſimis 3nerviis petala ſuperantibus, capſula 4valvi. *Inſ. Melville.*

Ad A. *grandiflоram* L. del. ſyn. A. abietina Presl.

pag. 400.

Poſt n. 72. *Cerviana* Chamiſſ. 123. A. caule dichotomo foliisque lineari-filiformibus mucronatis ſucculentis glabris, floribus dichotome paniculatis glomeratis, capſulis 3valvibus calycem ſuperantibus. *Chili.*

pag. 401.

Ad A. *cucubaloidem* Sm. A. *nardifolia* Ledeb. ex Imao var.

pag. 402.

Ad A. *bavaricam* L. (A. Ponae Reichenb. ic. t. 138.)

pag. 403.

Poſt n. 109. *ſubulifolia* Presl. 124. A. caule caeſpitoſo ſimplici, foliis ſubulatis obtuſiusculis glaberrimis, panicula dichotoma, calycibus acutiſſimis glandulo ſo-puberſcentibus petala duplo ſuperantibus, capſula 3valvi calycem aequante. *Sicilia.* (A. arvatica Presl.)

laricina Schlechtend. 125. A. caule decumbente, foliis faſciculatis ſubulatis rigidis ciliatis, floribus paucis terminalibus, petalis calycem ſuperantibus, ſeminibus difciformibus ciliatis. *Sibir.* (Spergula laricina L. Syſt. veg. 2. 422.)

Roſſii R. Br. 126. A. caule ramoſiſſimo, foliis 3quetro-ſubulatis obtuſiusculis, pedunculis 1floris elongatis, petalis oblongis ſepala ſub-3nervia ſuperantibus. *Amer. arctic.*

pag. 405.

Ad *Silenem.*

Poſt n. 13. *pauciflora* Cand. 146. S. caule erecto gracili baſi foliato ſuperne ſubviſcoſo, foliis ſubſpathulato-lanceolatis acutis baſi longe attenuatis glabriuſculis, pedunculis elongatis, calycibus clavatis glaberrimis, petalis longe unguiculatis reticulatis, genitalibus exſertis. *Corſica. Sardinia.* Moris.

pag. 408.

Ad S. *nicaeenſem* All. S. arenicola Presl. var.

Ad S. *cernuam* Thunb. S. piloſellaefolia Schlechtend.

Ad S. *luſitanicam.* S. ſardoa Moris.

pag. 409.

Ad S. *ceraſtoidem.* S. matutina Presl.

pag. 410.

Poſt n. 77. *undulatifolia* Moris. 147. S. caule erecto glabro, foliis ſpathulato-oblongis obtuſis undulatis glabris, floribus ſubfaſciculatis, calycibus glaberrimis coloratis, petalis 2lobis. *Sardinia.*

pag. 411.

Poſt n. 97. *calycina* Presl. 148. S. caule ſimplici erecto ſcabro apice viſcoſo, foliis lineari-lanceolatis acutis ſerrulato-ciliatis, floribus paniculatis bracteatis,

calycibus longiſſime clavatis pedicellisque viſcoſo-pubeſcentibus, petalis 2fidis coloratis. *Sicil.*

pag. 412.

Ad S. *italicam* Gaud. S. ſicula Presl. var.

pag. 415.

Ad S. *inflatam* Sm. S. craſſifolia Thor., Thorei Dufour.

pag. 416.

Ad *Cherleriam.*

Ch. *octandra* Sieb., imbricata Ser., potius *Arenaria aretioides* Portenſchl. Gay.

dicranoides Chamiſſ. 4. Ch. humilis denſe caeſpitoſa, foliis arcte imbricatis ſpathulato-oblongis glaberrimis carinatis, pedunculis ſolitariis breviſſimis. *Ora aſiatica freti Bering.*

juniperina Don. 5. Ch. denſe caeſpitoſa, foliis imbricatis lanceolatis mucronatis ſubtus carinatis laevibus, pedunculis axillaribus ſolitariis breviſſimis, petalis calyce duplo longioribus. *Nepal.*

grandiflora Don. 6. Ch. denſe caeſpitoſa, foliis confertis tetraſtichis lanceolatis mucronatis rigidis patulis baſi ciliatis, pedunculis terminalibus 1floris, petalis obovatis (roſeis) calycem ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 417.

Ad *Ceraſtium.*

Poſt n. 13. *furcatum* Chamiſſ. 54. C. caule ſimpliciusculo aſcendente ſuperne glanduloſo, foliis late lanceolatis acutis hirtis, floribus dichotome paniculatis, calyce obtuſo petalis breviori capſulam excedente. *Sibir.?*

Ad C. *arvenſe.* C. grandiflorum Don., oblongifolium Torr. var.

pag. 418.

Poſt n. 23. *Beringianum* Chamiſſ. 55. C. caule caeſpitoſo aſcendente hirſuto ſuperne viſcoſo, ramis elongatis paniculatis, foliis oblongis acutiusculis, floribus nutantibus, petalis capſulisque cylindricis calycem acutum ſuperantibus. *Ora Amer. arctic. ad fretum Bering.*

pag. 421.

Ad *Lychnidem dioecam.* L. divaricata Reichenb. ic. t. 303. var. glabra.

pag. 422.

Spergula laricina L. deleatur, Arenariis ſupra, Willdenovio et Schlechtendalio ſuadentibus, adnumerata.

Ad *Bergiam.*

repens Blum. 4. B. caule ramoſo repente, foliis lanceolatis ſerrulatis, floribus glomeratis axillaribus. *Java.*

pag. 423.

Ad *Oxalida.*

Agmen ducant

Subaphyllae.

fruticoſa Radd. 140. O. caule ſuffruticoſo ramoſo, petiolis foliaceis lanceolatis nervoſis glabris, pedunculis lateralibus abbreviatis ſubracemoſis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.* (O. ruſciformis Mikan. Zuccarin. in act. acad. monach. 9. t. 2.)

bupleurifolia Hilar. 141. O. caule ſuffruticoſo ſimpliciusculo, petiolis foliaceis ſubaphyllis nervoſis, pedunculis complanatis elongatis 2fidis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* (O. daphnaeformis Mik.)

†*ſaliciformis* Mik. 142. O. caule ramoſiſſimo, ramis virgatis, petiolis foliaceis ſparſis, pedunculis elongatis 2fidis racemoſis, ſtylis breviſſimis. *Braſil.*

Poſt n. 6. *ovata* Zuccar. 143. O. caule ſuffruticoſo ſimpliciusculo foliisque ovatis acutiusculis glabris, nervo medio ſubtus baſi incraſſato, pedunculis multifloris, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

alata Mart. 144. O. caule ſuffruticoſo, foliis ovatis acutis pubeſcentibus, pedunculis elongatis alatis multifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

pag. 424.

Ad O. *punctatam* L. (O. Piottae Coll.)

Poſt n. 23. *megapotamica* * 145. O. foliolis obcordatis denſe piloſis, calycibus obtuſiusculis, ſtaminibus interioribus ſtylos ſuperantibus. *Rio grande.* Sello.

hiſpidula Zuccar. 146. O. foliolis obcordatis ciliatis ſubtus glaucescentibus, calycibus acutis 2glandulosis, ſtylis ſtamina longiora ſuperantibus. *Monte Video.*

eriorrhiza Zuccar. 147. O. bulbo lanato, foliolis obcordato-bilobis glabris, petiolis hirtis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Monte Video.*

†*lobata* Sims. 148. O. radice tuberoſa, foliolis obcordato-bilobis glabris ſubtus glaucescentibus, calycibus acutis. *Chili.* Bot. mag. 2386.

nana Hilar. 149. O. foliolis obovatis glabris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Rio grande.*

pag. 426.

Poſt n. 53. *laſiopetala* Zuccar. 150. O. radice tuberoſa, foliolis obcordato-bilobis ſupra glabriusculis ſubtus pubeſcentibus, ſcapo ſub-3floro, petalis extus margine piloſis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Monte Video.*

rubra Hilar. 151. O. foliolis obcordatis punctatis glabriusculis, ſcapo umbellifero, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

rupeſtris Hilar. 152. O. foliolis obcordatis piloſis, ſcapo umbellifero, calycibus maculatis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

urbica Hilar. 153. O. foliolis obcordatis piloſis, umbellis compoſitis, calycibus maculatis, ſtylis intermediis. *Braſil.* (O. violacea Savign., Martiana Zuccar.)

triangularis Hilar. 154. O. foliolis truncato-triangularibus ſericeo-villoſis, ſcapo umbellifero, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

paluſtris Hilar. 155. O. foliolis truncato-triangularibus glabriusculis, ſcapo umbellifero, ſtylis ſtamina aequantibus. *Braſil.* (O. papilionacea W. herb.)

bipartita Hilar. 156. O. foliolis linearibus bipartitis glabriusculis, ſcapo umbellifero, ſtylis intermediis. *Braſil.*

pag. 427.

Poſt n. 80. *macromiſchos* * 157. O. caule baſi nudo ſtipulato, foliis faſtigiato-verticillatis cauleque incano-villoſis, foliolis linearibus ſubemarginatis, pedunculis longiſſimis demum refractis, ſtylis breviſſimis. *C. B. S.*

pag. 428.

Poſt n. 88. *confertiſſima* Hilar. 158. O. caule ſuffruticoſo, foliis parvis confertiſſimis, foliolis obovatis piloſis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

caeſpitoſa Hilar. 159. O. caule ſuffruticoſo breviſſimo, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia ſuperantibus, ſtylis longiſſimis. *Braſil.*

Sternbergii Zuccar. 160. O. caule erectiusculo abbreviato foliolisque obcordato-bilobis hirtis, pedunculis petiolos ſuperantibus. *Peru.* Hänke.

Commerſonii Perſ. 161. O. caule breviſſimo piloſo, foliolis obovatis tomentoſis, pedunculis folia ſubſuperantibus, calycibus obtuſis. *Monte Video.* (O. ſexenata Savign., hallucinatione folia ſena indicantur.)

paludoſa Hilar. 162. O. caule proſtrato glaberrimo, foliolis obcordatis, petiolis baſi ſtipulaceis dilatatis, pedunculis folia ſuperantibus, ſtylis intermediis. *Braſil.*

myriophylla Hilar. 163. O. caule proſtrato ramoſo, foliis numeroſis faſciculatis, foliolis profunde obcordatis villoſis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

amara Hilar. 164. O. caule proſtrato hirſuto, foliolis obcordatis villoſis, pedunculis folia, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

Poſt n. 90. *ſerpens* Hilar. 165. O. caule repente, foliolis obcordatis ſubvilloſis, pedunculis folia, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

pag. 429.

Poſt n. 106. *refracta* Hilar. 166. O. caule diffuſo piloſo, foliolis obcordatis ciliatis, pedunculis folia ſuperantibus

2-3fidis umbelliferis, pedicellis fructiferis refractis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

Hänkeana * 167. O. caule erecto foliolisque obovatis emarginatis glabris, pedunculis 2fidis multifloris folia ſuperantibus, floribus laxe racemoſis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Peru.* (O. melilotoides Zuccar.)

hiſpida Mart. 168. O. caule breviſſimo foliolisque obovatis emarginatis hiſpidis, pedunculis folia aequantibus ſub-3floris, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

ſquamata Zuccar. 169. O. caule humili ſquamoſo, foliolis obcordato-bilobis glabris, pedunculis axillaribus dichotomis multifloris. *Chili.* Hänke.

craſſicaulis Zuccar. 170. O. caule aſcendente carnoſo, foliolis obcordatis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis acutis ciliatis, pedunculis elongatis umbelliferis paucifloris, ſtaminibus ſtylos ſubaequantibus. *Peru.* Hänke.

pag. 430.

Ad O. *albicantem* Kunth. O. cinerea Zuccar. var.

Ad O. *Barrelieri* L. (O. campeſtris Mart.)

Ad O. *rhombifoliam* Jacqu. del. O. hedyſarifolia Radd.

Ad O. *pentantham* Jacqu. del. Neaei Cand., apponatur O. divaricata Mart. var.

Ad O. *Plumerii* Jacqu. O. umbraticola Hilar.

O. *fruticoſa* Radd. deleatur, ſupra melius collocata.

Poſt n. 122. *rhombeo-ovata* Hilar. 171. O. caule ſuffruticoſo, foliolis rhombeo-ovatis acuminatis ciliatis, medio majori, petiolis nudis, pedunculis 2fidis multifloris, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* (O. Neaei Cand., hedyſarifolia Radd.)

cytiſoides Mart. 172. O. ramis tomentoſis, foliolis ovatis utrinque attenuatis incano-villoſis, pedunculis folia ſuperantibus multifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

denſifolia Mart. 173. O. caule virgato denſiſſime folioſo foliolisque obcordato-bilobis hirtis, pedunculis elongatis ſub-8floris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.*

roſellata Hilar. 174. O. caule breviſſimo ſuffruticoſo, foliolis pubeſcentibus, lateralibus ſubrotundis, intermedio oblongo elongato, pedunculis 2fidis paucifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.* (O. puberula Mart.)

inſipida Hilar. 175. O. caule ſimplici ſuffruticoſo, foliolis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis 2fidis. *Braſil.*

linearis Zuccar. 176. O. caule ſimplici ſuffruticoſo, foliolis linearibus acutiusculis hirſutis, pedunculis terminalibus ſolitariis elongatis multifloris, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.* Sello.

cajaniſolia Hilar. 177. O. caule ſuffruticoſo pubeſcente, foliolis ovato-lanceolatis acuminatis, pedunculis 2fidis racemoſis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* (O. polymorpha Mart.)

ſepium Hilar. 178. O. caule ſuffruticoſo glabro, foliis verticillatis, foliolis ovatis obtuſiuſculis, pedunculis biſidis racemoſis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

melilotoides Hilar. 179. O. caule ſuffruticoſo piloſiuſculo, foliolis ovatis obtuſis, pedunculis biſidis racemoſis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

euphorbioides Hilar. 180. O. caule ſuffruticoſo pubeſcente viſcoſo, foliolis obtuſis glabris, inferioribus ovatis, reliquis linearibus, pedunculis 2ſidis 7floris, ſtaminibus intermediis. *Braſil.*

nigreſcens Hilar. 181. O. caule ſuffruticoſo piloſiuſculo, foliolis ovato-oblongis glaberrimis. pedunculis 2ſidis racemoſis, ſtaminibus intermediis. *Braſil.*

ſaxatilis Hilar. 182. O. caule fruticoſo ramoſiſſimo, foliolis parvis ſubrotundis, pedunculis breviter 2ſidis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* (O. leptophylla Zuccar.)

diſtans Hilar. 183. O. caule ſuffruticoſo ferrugineo, foliolis obovatis retuſis villoſis, pedunculis umbelliferis. *Braſil.* (O. hirſutiſſima Mart.)

fulva Hilar. 184. O. caule ſuffruticoſo hirſutiſſimo, foliolis ſubrotundis villoſis, pedunculis 2ſido-umbelliferis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

cordata Hilar. 185. O. caule ſuffruticoſo, foliis cordatis ma gine pubeſcentibus, pedunculis 2ſido-umbelliferis. *Braſil.*

campeſtris Hilar. 186. O. caule ſuffruticoſo, foliolis obcordatis hirſutis, pedunculis 2ſido-umbelliferis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.*

pag. 431.

O. *Commerſonii* del. ſupra jam melius collocata.

pag. 432.

Poſt n. 138. 139. *mimoſoides* Hilar. 187. O. caule fruticoſo ſimplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubeſcentibus, foliolis lineari-oblongis obtuſis, pedunculis villoſis bracteatis 3-4floris, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* Hilar. fl. braſil. t. 21.

caſta Mart. 188. O. caule fruticoſo umbellatim ramoſo, foliis abrupte pinnatis multijugis glabriuſculis, foliolis adnatis ſubrhombeis, faſciculis florum ſubſeſſilibus bracteatis, ſtaminibus ſtylos ſuperantibus. *Braſil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 6.

dormiens Mart. 189. O. caule ſuffruticoſo ſimplici, foliis abrupte pinnatis multijugis pubeſcentibus, foliolis ſubſeſſilibus baſi angulatis oblongis obtuſis, pedunculis aggregatis 1floris e glomerulo bractearum prodeuntibus. *Braſil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 5.

ſomnians Mart. 199. O. caule ſuffruticoſo ſimplici, foliis abrupte pinnatis ſub-6jugis pubeſcentibus, foliolis extimis majoribus obovato-oblongis obtuſis, infimis

ſubcordatis acutis, capitulis florum longe pedunculatis bracteatis, ſtylis ſtamina ſuperantibus. *Braſil.* Zuccar. in act. acad. monach. 9. t. 4.

pag. 433.

Ad *Sedum.*

Poſt n. 8. *himalenſe* Don. 67. S. caule herbaceo erecto, foliis ovato-lanceolatis dentatis laevibus glaucis, corymbo ſubſimplici, radice craſſa. *Emodi montes.*

Poſt n. 15. *aſiaticum* * 68. S. caulibus caeſpitoſis filiformibus e caudice craſſiſſimo ortis, foliis ſparſis lineari-lanceolatis obtuſis integerrimis glaucis, umbellis paucifloris, calycibus obtuſis, floribus 8andris 4fidis. *Emodi montes.* (Rhodiola aſiatica Don.)

pag. 434.

Poſt n. 19. *Anacampſeros* 69. S. caule decumbente, foliis obovatis integerrimis glaucis ſubſeſſilibus, ramorum ſterilium roſaceo-congeſtis, corymbis pedunculatis terminalibus. *Gallia auſtr.*

pag. 437.

Ad *Cotyledonem.*

Poſt n. 2. *coruſcans* Haw. 26. C. foliis cuneiformibus mucronatis ſubinvolutis micantibus, floribus paniculatis pendulis. *C. B. S.* Bot. mag. 2201.

Poſt n. 9. *decuſſata* Lindl. 27. C. caule fruticoſo, foliis decuſſatis ſubteretibus fuſco-mucronatis glaucis, panicula longe pedunculata, floribus pendulis. *C. B. S.* Bot. reg. 915. (C. papillaris Haw. non Thunb.)

pag. 439.

Ad *Robergiam* Schreb.

glabra * 2. R. foliis pinnatis glabris, foliolis ſubcordatis acuminatis coriaceis, paniculis axillaribus folio brevioribus. *Ad Orinocum.* (Rourea glabra Kunth.)

POUPARTIA Commerſ.

borbonica J. F. Gmel. *Inſ. Maſcaren.* Arbor foliis pinnatis, racemis compoſitis, floribus atropurpureis.

CLASSIS XI.

pag. 447.

Ad *Baſſiam.*

butyracea Roxb. 3. B. foliis obovatis infra tomentoſis coriaceis, pedunculis glomeratis ſloris calycibusque lanatis. *Nepal.*

pag. 448.

Ad *Garciniam* manifeſto pertinet *Stalagmites cambogioides* Murr., quae eadem ſit ac *Garcinia Cambogia* Desr. ſive ſecus, ambigo.

pag. 449.

Ad *Elaeocarpum.*

E. *ferratus* — axillis venarum ſubtus glanduloſis.

E. *reticulatus* Sm. (Erioſtemum dentatum Coll. hort. ripul. t. 30.)

Poſt n. 5. *lanceolatus* Blum. 11. E. foliis lanceolatis obtuſiusculis remote ſerratis, racemis axillaribus folio longioribus nutantibus, fructibus ovalibus, nucleo rugoſo aculeato. *Java.*

obtuſus Blum. 12. E. foliis obovato-oblongis obtuſiusculis baſi mucronato-ſerratis, racemis axillaribus petalisque ſericeis. *Java.*

macrophyllus Blum. 13. B. foliis ovato-oblongis obtuſis repando-ſerratis, ſtipulis ſemiorbiculatis foliaceis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java.*

glaber Blum. 14. E. foliis ovato-oblongis obtuſis mucronato-ſerratis, racemis axillaribus folia ſuperantibus. *Java.*

reſinoſus Blum. 15. E. foliis ovali-oblongis acuminatis obſolete ſerratis, axillis venarum glanduloſis, racemis axillaribus folio brevioribus. *Java.*

anguſtifolius Blum. 16. E. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis baſi ſerrulatis, racemis axillaribus folio brevioribus, fructibus globoſis, nucleo rugoſo ſubſulcato. *Java.*

floribundus Blum. 17. E. foliis oblongis acuminatis obtuſe ſerratis coriaceis glaberrimis, racemis axillaribus nutantibus folia aequantibus. *Java.*

longifolius Blum. 18. E. foliis oblongis acuminatis mucronulato-repandis, racemis folio brevioribus ſericeo-tomentoſis. *Java.*

ſtipularis Blum. 19. E. foliis oblongis acuminatis ſerrulatis, venis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis ovatis inciſo-ſerrulatis, racemis axillaribus villoſo-tomentoſis, fructibus ovalibus. *Java.*

tomentoſus Blum. 20. E. foliis ovato-oblongis acuminatis ſetaceo-denticulatis ſubtus ramulisque villoſo-tomentoſis, racemis axillaribus elongatis. *Java.*

pag. 450.

Ad *Triumfettam.*

Poſt n. 6. *ſpicata* Blum. 23. Tr. foliis cordato-ſubrotundis 3lobis inaequaliter ſerrulatis ſupra pubeſcentibus ſubtus villoſis, floribus interrupte ſpicatis. *Java.*

ſuffruticoſa Blum. 24. Tr. foliis cordato-ovatis acuminatis inaequaliter ſerratis ſubtus ſtellato-piloſiusculis, junioribus ſemi-3fidis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3-5floris. *Java.*

pag. 451.

Ad Tr. *trilocularem* Roxb. Tr. pſeudo-angulata Blum. var.

Poſt n. 8. *villoſiuscula* Blum. 25. Tr. foliis ſubrotundo-ovatis 3lobis 5nerviis argute duplicato-ſerratis, ſerraturis infimis calloſis, ſupra villoſiusculis ſubtus ſtellato-tomentoſis, pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. *Java.*

Ad Tr. *annuam* L. (Tr. graveolens Blum.)

†*oblonga* Wallich. 26. Tr. foliis ovato-lanceolatis inaequaliter ſerratis ſubtus lanatis. *Nepal.*

Ad Tr. *obliquam* Roth. (Tr. cana Blum.) add. pedunculis extraxillaribus aggregatis 3floris. Patria: *Java.*

pag. 454.

Ad *Lythrum.*

Poſt n. 6. *quintuplinervium* Mart. 16. L. fruticoſum, foliis ſeſſilibus oppoſitis ovatis 5plinerviis glabris, floribus oppoſitis ſeſſilibus. *Braſil.*

tribracteatum Salzm. 17. L. foliis alternis ſpathulatis glaberrimis, floribus axillaribus ſubaggregatis 6andris, bracteis ternis ſubrotundis, caule ramoſo, ramis decumbentibus. *Ager monspel.*

pag. 456.

Ad *Cupheam.*

Poſt n. 16. *parviflora* Hook. 24. C. ſuffruticoſa glanduloſo-pubeſcens, foliis lanceolatis baſi attenuatis ſubrepandis ciliatis, floribus racemoſis terminalibus. *Guiana.*

Melvilla Lindl. 25. C. foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis ſcabris, floribus terminalibus racemoſis cernuis, petalis 0. *Inſ. Carib.* Bot. reg. 852.

Poſt n. 20. *megapotamica* * 26. C. caule herbaceo ſimplici glabro, foliis oppoſitis lineari-lanceolatis integerrimis, corymbis terminalibus paucifloris, calycibus glabris. *Rio grande.* Sello.

pag. 461.

Ad *Agrimoniam.*

A. *repentis* patria eſt *Armenia.* Tournef.

nepalenſis Don. 5. A. foliis interrupte pinnatis villoſiſſimis, foliolis ovatis ſerratis, impari petiolato, racemis rectis

tenuifloris, bracteis 3fidis calyce brevioribus, laciniis calycis lanceolatis acutis carinatis. *Nepal.*

Ad *Callicomam ferratifoliam* R. Br. (Hermefia bankfiaefolia Syft. 2. 246.)

pag. 462.

Ad *Pleurandram* Labill.

Poft n. 6. *ftricta* Sieb. 19. Pl. foliis linearibus apice callofis ftriatis fcabris, calycibus feffilibus acutis pubefcentibus. *Nov. Holl.*

ciftiflora Sieb. 20. Pl. foliis lineari-filiformibus acutis fulcatis punctato-afperis, calycibus terminalibus feffilibus glaberrimis margine membranaceis. *Nov. Holl.*

pag. 463.

Poft n. 18. *aftrotricha* Sieb. 21. Pl. foliis fpathulato-linearibus callofo-afperis hirfutiusculis, ramulis ftellato-pulverulentis, pedunculis ebracteatis nutantibus, calycibus acutis. *Nov. Holl.*

camforofma Sieb. 22. Pl. foliis fafciculatis filiformibus pilofis, ramis albido-hirfutis, calycibus folitariis feffilibus glabris mucronatis. *Nov. Holl.*

microphylla Sieb. 23. Pl. foliis confertis teretiusculis obtufis 4fulcatis incano-pubefcentibus, pedunculis folitariis abbreviatis, calycibus obtufiusculis. *Nov. Holl.*

pag. 466.

Ad *Blackwelliam.*

† *nepalenfis* Cand. 8. Bl. foliis oblongis acuminatis ferrato-dentatis utrinque glabris, racemis axillaribus paniculatis folio fubbrevioribus, floribus 6-7andris. *Nepal.*

pag. 467.

Ad *Bruneliam* R. et P.

propinqua Kunth. 7. B. foliis impari pinnatis 3-4jugis fubtus fufco-tomentofis, foliolis oblongis obtufiusculis crenulato-ferratis, paniculis ferrugineis. *Amer. auftr.*

pag. 468.

Ad *Sempervivum.*

Poft n. 9. *calyciforme* Haw. 27. S. foliis denfe imbricatis fpathulatis obtufis glaucis apice recurvis margine albidis glabris, corymbo terminali glanduloso-pubefcente. *Madera.* Bot. reg. 892.

CLASSIS XII.

pag. 471.

Poſt n. 1819. *Neillia* Don. Cal. campanulatus 5fidus. Petala ſubrotunda. Antherae 2loculares. Capſ. 2locularis polyſperma. *Spiraeeis affinis.*

Pygeum Gärtn. Cal. 6dentatus. Pet. 6. Drupa ſicca oblonga 1ſperma.

pag. 473.

Ante n. 1849. *Brayera* Kunth. Cal. perſiſtens turbinatus, limbo duplici, utroque 5lobo. Pet. 5 ſquamaeformia. Stigmata ſubpeltata lobata. Fructus 2 1ſpermi.

Poſt n. 1860. *Cowania* Don. Cal. 5fidus. Pet. 5. Styli 5–11 plumoſi. Achenia totidem ſtylis coronata.

---

pag. 477.

Ad *Prunum.*

Poſt n. 19. *ceraſoides* Don. 43. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis duplicato-ſerratis ſubtus piloſis, ſtipulis pectinatis glanduliferis, petiolis 5glandulofis, umbellis ſubſeſſilibus paucifloris. *Nepal.*

Poſt n. 23. *mollis* Torr. 44. Pr. foliis ovatis acuminatis duplicato-ſerratis ramulisque pubeſcentibus; ſtipulis ſetaceis denticulatis, calycibus glabriusculis ſerratis, fructibus ovalibus grandibus. *Maſſachuſetts Amer. bor.*

Poſt n. 29. *undulata* Hamilt. 45. Pr. foliis elliptico-oblongis acuminatis coriaceis glabris integerrimis margine criſpato-undulatis, petiolis eglandulofis, racemis ſolitariis multifloris glabris folio brevioribus. *Nepal.*

pag. 479.

Poſt *Banaram* Aubl.:

Neillia Don.

thyrſiflora Don. 1. N. foliis cordato-ovatis 3lobisque acuminatis duplicato-ſerratis, ſtipulis foliaceis ovatis acuminatis ſerratis, racemis ſpicatis thyrſoideis terminalibus, bracteolis dentatis, calycibus ſericeis. *Nepal.*

rubiflora Don. 2. N. foliis cordatis 3lobis acuminatis duplicato-ſerratis, ſtipulis integerrimis membranaceis caducis, racemis terminalibus ſolitariis paucifloris, bracteolis obtuſiusculis integerrimis, calycibus tomentoſis. *Nepal.*

Pr-

PYGEUM Gärtn.

acuminatum Colebr. *Silhet, prov. Ind. or.* Arbor, foliis alternis oblongis acuminatis integerrimis glabris, racemis axillaribus, floribus flavicantibus. Linn. transact. 12. t. 18.

pag. 480.

Ad *Myrtum.*

Poſt n. 24. *veſtita* * 142. M. foliis lanceolatis acutis venoſis ſubtus ramulisque lanato-tomentoſis, pedunculis breviſſimis ſuboppoſitis, floribus 4fidis. *Rio grande.*

pag. 481.

Poſt n. 41. *megapotamica* * 143. M. foliis ſpathulato-lanceolatis obſcure venoſis ſubtus flavido-ſericeis, pedunculis aggregatis folio brevioribus, floribus 4fidis. *Rio grande.* Sello.

Ad M. *cayennenſem* * (M. micrantha Mart. *Braſil.*)

pag. 482.

Poſt n. 45. *Caledoniae* * 144. M. foliis ovatis glabris, pedunculis terminalibus ternis breviſſimis, floribus 4fidis. *Nov. Caledon.* (Caryophyllus ellipticus Labill. t. 63.)

pag. 483.

Poſt n. 71. *ſpiciflora* * 145. M. foliis oblongo-lanceolatis cuſpidatis venuloſis ciliatis, ramis hirtis, pedunculis pubeſcentibus multifloris. *Braſil.* (Eugenia ſpiciflora Mart.)

pag. 485.

Poſt n. 101. *umbraticola* Kunth. 146. M. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis revolutis coriaceis nitidis pubeſcentibus, racemis axillaribus 2partitis. *Ad Orinocum.*

† *longifolia* Kunth. 147. M. foliis amplis ſubcordato-oblongis cuſpidatis coriaceis glaberrimis lucidis, floribus 5fidis, fructibus pyriformibus. *Ad Orinocum.*

pag. 486.

Poſt n. 115. † *xylopioides* Kunth. 148. M. foliis lanceolatis acuminatis membranaceis reticulatis ſubtus ſtrigilloſis, paniculis axillaribus folio brevioribus, floribus 5fidis, fructibus ovalibus 1ſpermis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 657.

pag. 487.

Ad M. *Berterianam* * (Eugenia auſtralis Coll. in act. taurin. 31. t. 8.)

pag. 488.

Ad *Pſidium.*

Pſ. *pyriferum* habet ramulos 4angulares, pedunculos 1-3floros. Congruit Pſ. *ſapidiſſimum* Jacqu. Quo igitur deleto, accedunt nova:

Araca Radd. 16. Pſ. ramulis teretibus hirſutis, foliis oblongis obtuſis utrinque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus 1-3floris, fructibus ſubpyriformibus. *Braſil.* Opuſc. ſcient. di Bologn. 4. t. 7. f. 1.

litorale Radd. 17. Pſ. ramis teretibus, foliis oblongis obtuſiusculis baſi attenuatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris, fructibus pyriformibus. *Braſil.* Opuſc. ſcient. di Bologn. 4. t. 7. f. 2.

pag. 490.

Ad *Metroſideron* Gärtn.

M. *coriaceus* Labill. (M. albidus Sieb.)

pag. 491.

Poſt n. 14. *juniperinus* Reichenb. 23. M. foliis filiformi-ſubulatis mucronatis rigidis glabris tuberculoſis, pedunculis lanatis, ſpicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.

pungens Reichenb. 24. M. foliis linearibus mucronatis patulis nervoſis glabris, pedunculis lanatis, ſpicis capitatis. *Nov. Holl.* Sieber.

Poſt n. 21. *operculatus* Labill. 25. M. foliis lineari-lanceolatis ſubtus discoloribus punctatis, floribus corymboſis, petalis operculi forma ante antheſin convolutis. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

Ad *Leptoſpermum* Forſt.

Poſt n. 10. *ſquarroſum* Sieb. 20. L. foliis lanceolatis acutis ſquarroſis rigidis glabris, junioribus ſubtus ſericeis, calycibus ſeſſilibus glabris coloratis obtuſis. *Nov. Holl.*

L. *flexuoſum* Link. (L. reſiniferum Bertol.)

Poſt n. 19. *criocalyx* Sieb. 21. L. foliis parvis ſpathulatis glaberrimis punctatis, calycibus ſubſeſſilibus ſericeo-lanatis. *Nov. Holl.*

pendulum Sieb. 22. L. foliis linearibus acutiusculis ſubſericeis, pedunculis breviſſimis aggregatis calycibusque denſe ſericeo-lanatis. *Nov. Holl.*

pag. 499.

Calyptranthes paniculata R. et P. Ad hanc referenda C. *aromatica* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 14.

pag. 500.

Ad *Eucalyptum* Herit.

Poſt n. 5. *curvula* Sieb. 25. E. operculo conico, pedunculis ſub-3floris incraſſatis compreſſis divaricatis, foliis inaequaliter oblongo-lanceolatis acutis. *Nov. Holl.*

pag. 501.

Poſt n. 10. *pauciflora* Sieb. 26. E. operculo conico, pedunculis abbreviatis ſub-6floris, foliis oblongo-lanceolatis falcatis nervoſo-venoſis elongatis. *Nov. Holl.*

Poſt n. 11. *virgata* Sieb. 27. E. operculo conico, pedunculis 3floris incraſſatis compreſſis rugoſis erectiusculis, foliis lanceolatis acuminatis coriaceis ſubvenoſis glabris. *Nov. Holl.*

Poſt n. 14. *ſtricta* Sieb. 28. E. operculo ſubmutico, pedunculis lateralibus 2floris, foliis linearibus acutis coriaceis glabris ſubpunctatis. *Nov. Holl.*

longifolia Lindl. 29. E. operculo ſubmutico, pedunculis 3-6floris, foliis lineari-lanceolatis elongatis venoſis acuminatis pendulis. *Nov. Holl.* Bot. reg. 947.

Poſt n. 22. *eugenioides* Sieb. 30. E. operculo mucronulato, umbellis lateralibus racemoſis, ramulis teretibus, foliis inaequaliter oblongo-lanceolatis. *Nov. Holl.*

pag. 502.

Poſt *Waldſteiniam* Kit.:

BRAYERA Kunth.

anthelminthica Kunth. *Abyſſinia.* Arbor, cujus folia ignota, pedunculis ramoſis piloſis bracteatis, floribus quaternis.

Ad *Spiraeam.*

Sp. *acutifolia* W. (Sp. flexuoſa Fiſch.) e *Sibiria.*

vaccinifolia Don. 32. Sp. foliis elliptico-oblongis acutis glabris apice ferratis ſubtus glaucis, ramulis hirſutis, cymis terminalibus paucifloris tomentoſis. *Nepal.*

bella Sims. 33. Sp. foliis ovatis acutis glabris ferratis ſubtus glaucis, cymis terminalibus patentibus ramulisque pubeſcentibus. *Nepal.*

caneſcens Don. 34. Sp. foliis ovalibus obtuſis integerrimis villoſis, corymbis confertis ramulisque tomentoſis. *Nepal.*

cana Kit. 35. Sp. foliis ovatis acutis integerrimis ſubtus incano-villoſis, corymbis terminalibus pedunculatis. *Croatia.*

pag. 505.

Ad *Aizoon.*

Camforoſma Reichenb. 11. A. ramis virgatis foliisque alternis lineari-ſubulatis glabris, floribus axillaribus pedunculatis. *C. B. S.*

pag. 506.

Ad *Mespilum.*

Post n. 21. *crenulata* Don. 41. M. foliis ovali-oblongis crenulatis apice retusis mucronulatis glabris nitidis, pedunculis lateralibus aggregatis elongatis 1-plurifloris. *Nepal.* (Crataegus crenulata Lindl.)

pag. 508.

Photinia dubia Lindl. (Mespilus tinctoria Don.)

Ph. *integrifolia* Lindl. (Pyrus integerrima Don.)

pag. 509.

Ad *Pyrum japonicam* Thunb. De genere fictitio *Chaenomeles* lege *παλινῳδίαν* auctoris ipsius in Bot. reg. ad n. 905.

Pashia Hamilt. 39. P. foliis longe petiolatis ovatis acuminatis serratis glabris, corymbis simplicibus umbellatis pilosis, laciniis calycis ovatis cuspidatis, fructibus sphaericis asperis. *Nepal.*

Nussia Hamilt. 40. P. foliis ellipticis mucronatis crenulatis coriaceis glabris, junioribus subtus ramulisque et corymbis terminalibus paniculatis niveo-lanatis, fructibus sphaericis. *Emodi montes.*

pag. 510.

Post n. 18. † *Sumbosbia* * 41. P. foliis cordato-ovalibus mucronulatis subtus ramulisque lanatis, stipulis ellipticis acutis glandulosо-serratis, pedunculis terminalibus solitariis tomentosis, laciniis calycis oblongis, fructibus basi attenuatis. *Nepal.* (Cydonia Sumbosbia Hamilt. Don.)

Ad P. *arbutifolium* Ehrh. P. *floribunda* Lindl. Bot. reg. 1006. hybrida.

Post n. 24. *crenata* Don. 42. P. foliis longe petiolatis ovalibus acutis crenatis supra glabris subtus ramulisque niveo-tomentosis, corymbis simplicibus lanatis, laciniis calycis ovatis acutis. *Nepal.*

lanata Don. 43. P. foliis ovato-oblongis acuminatis duplicato-serratis subtus ramulisque niveo-lanatis, corymbis terminalibus compositis, laciniis calycis ovatis acuminatis. *Nepal.*

pag. 518.

Ad *Mesembrianthemum.*

Post n. 112. *crassulinum* * 248. M. ramis decumbentibus, foliis semiterectibus acutiusculis viridibus lucidis basi distinctis, calycibus inaequalibus, filamentis exterioribus abortientibus elongatis. *Afric. austr.?* (M. crassuloides Salm.)

pag. 526.

Tetragonia expansa Murr. (non Ait.)

Poſt *Dalibardam:*

COWANIA Don.

mexicana Don. *Mexico.* Frutex ramoſiſſimus lanatus, foliis confertis Spartito-pinnatifidis revolutis ſubtus niveo-lanatis, ſtipulis membranaceis dilatatis, floribus terminalibus ſeſſilibus aureis. Linn. transact. 14. t. 22. f. 1.

pag. 527.

Ad *Rubum.*

R. *pinnatus* Don. fl. nepal. p. 234. ad R. *laſiocarpum* Sm. pertinere videtur.

R. *aſper* Don. ad R. *biflorum* Buchan.

micranthus Don. 72. R. foliis ſub-3jugis ſupra viridibus nitidis ſubtus albo-villoſis, foliolis ovatis mucronatis duplicato-ſerratis, petiolis ſparſe aculeatis, corymbo paniculato, petalis unguiculatis calyce brevioribus. *Nepal.* (R. pauciflorus Wallich. Bot. reg. 854.)

pag. 528.

Poſt n. 13. *microphyllus* Don. 73. R. foliis ternatis quinatisque ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis obovatis ſerratis, pedunculis 3floris petiolisque aculeatis, calycibus denſe tomentoſis, caule decumbente, aculeis recurvis. *Nepal.*

R. *Wiegmanni* Weih. ſatius ad R. *plicatum* Ej. referendus.

pag. 530.

Ad R. *occidentalem* addatur patria: *Amer. bor.*

Poſt n. 41. *pedunculoſus* Don. 74. R. foliis ternatis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis ovatis baſi attenuatis inaequaliter ſerratis, petiolis aculeatis, ſtipulis linearibus, pedunculis elongatis ſubgeminis, caule inermi laevi. *Nepal.*

flavus Hamilt. 75. R. foliis ternatis ſubtus tomentoſis, foliolis ovalibus ſerratis, ramulis ſetoſo-aculeatis, ſtipulis lineari-ſetaceis, floribus glomeratis racemoſo-corymboſis. *Nepal.*

pag. 531.

R. *paniculatus* Sm. (R. cordifolius Don.)

betulinus Don. 76. R. foliis ovatis cuſpidatis glabriusculis inaequaliter ſerratis, ſtipulis minutis glandulaeformibus, floribus ſubracemoſis, pedicellis geminis quaternisve calycibusque nudis, ramis teretibus glabris petiolisque parce aculeatis. *Nepal.*

pag. 532.

Poſt n. 68. *calycinus* Wallich. 77. R. caule reptante petiolisque villoſis aculeatis, foliis cordato-orbiculatis cre-

natis utrinque villoſis, ſtipulis late ovatis ſerratis, pedunculis axillaribus 1floris, calycis aculeati laciniis foliaceis inciſo-dentatis petala ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 533.

Ad *Potentillam.*

Poſt n. 1. *nepalenſis* Don. 96. P. caule fruticoſo erecto, foliis ſub-2jugis ovalibus obtuſis integerrimis ſupra villoſis ſubtus nudis, ſtipulis obtuſis membranaceis, calyce 15fido. *Nepal.*

pag. 534.

P. *lineata* Trevir. (P. ſplendens Don., Siemerſiana Lehm.)

leuconota Don. 97. P. caule erecto ſimplici villoſo, foliis pinnatis 7jugis ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis ovali-oblongis obtuſis inciſo-ſerratis, pedunculis ſubumbellatis, laciniis calycis corolla brevioribus aequalibus. *Nepal.*

pedunculariſ Don. 98. P. foliis radicalibus pinnatis ſupra villoſis ſubtus argenteo-ſericeis, foliolis oblongis inciſo-ſerratis, ſcapo erecto paucifloro, petalis calyce longioribus. *Nepal.*

micropetala Don. 99. P. caule aſcendente ramoſo villoſo-tomentoſo, foliis ſubtus niveo-tomentoſis, radicalibus pinnatis caulinis ternatis, foliolis obovatis ſerratis, pedunculis axillaribus 1floris, petalis calyce duplo brevioribus. *Nepal.* (Comarum flavum Roxb.)

confertiflora Torr. 100. P. caule erecto viſcoſo-piloſo, foliis ſubinterrupte pinnatis, foliolis oblique ſubrotundis inciſo-dentatis, ſtipulis ovatis acutis integris, floribus faſciculatis, diſco 5lobo ſtaminifero. *Amer. bor.* (Geum agrimonioides Purſh.? Syſt. 2. p. 543.)

nivalis Torr. 101. P. caule erecto ſub-1floro, foliis pinnatis glabris ciliatis, foliolis ſubimbricatis ovatis 2-3fidis, laciniis acutis, petalis ſubrotundis calyce longioribus. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.*

pulchella R. Br. 102. P. caule paucifloro, foliis pinnatis 2jugis ſupra villoſis ſubtus ſericeis, foliolis pinnatifidis, inferioribus minoribus, laciniis lineari-lanceolatis, ſtylis baſi glanduloſo-dilatatis. *Inſ. Melville.*

pag. 535.

Poſt n. 18. *microphylla* Don. 103. P. caulibus caeſpitoſis humilibus 1floris foliisque 2pinnatifidis ſubtus ſericeo-villoſis, laciniis linearibus obtuſis, petalis obovatis calyce longioribus, receptaculo villoſo. *Nepal.*

coriandrifolia Don. 104. P. caulibus caeſpitoſis aſcendentibus paucifloris, foliis 2pinnatis ſubtus piloſiusculis, laciniis linearibus ſubmucronatis, petalis obcordatis calyce longioribus, receptaculo villoſo. *Nepal.*

pag. 536.

Poſt n. 29. *Loddigeſii* * 105. P. caule erecto incano piloſo, foliis 7-5natis ſupra hirſutis ſubtus incano-piloſis, foliolis pinnatifido-ſerratis, floribus corymboſis, petalis retuſis calycem ſuperantibus. *Sibir.* (P. vinoſa Loddig. Ledeb.)

normalis Beſſ. 106. P. caule erecto foliisque 5nato-digitatis utrinque denſe lanatis, foliolis pinnatifidis ſubtus candidis, ſtipulis oblongis inciſis, pedunculis corymboſis, petalis calycem ſubſuperantibus. *Ad Tyram.*

P. *virgata* Lehm. (P. elongata Beſſ.) *Podolia.*

pag. 537.

Poſt n. 44. *pulchella* Richardſ. 107. P. caule diffuſo abbreviato, foliis 7-5natis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis obovatis apice inaequaliter ſerratis, pedunculis ſubternis, petalis obcordatis, receptaculo hirſuto. *Amer. arctic.*

pag. 539.

Poſt n. 68. *formoſa* Don. 108. P. caule erecto foliisque 5-3natis ſericeo-piloſis, foliolis ſpathulato-oblongis ſerratis venoſis, ſtipulis ovatis integris, petalis obcordatis calycem multo ſuperantibus. *Nepal.* (P. nepalenſis Hook. exot. fl. t. 88.)

pag. 542.

Poſt n. 94. *atroſanguinea* Don. 109. P. caule aſcendente pauciflora, foliis omnibus ternatis ſubtus niveo-tomentoſis, foliolis obovatis inciſo-ſerratis, ſtipulis ſubintegris, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 543.

Ad *Sieverſiam* W.

paradoxa Don. 7. S. fruticoſa, foliis faſciculatis 3-5partitis ſubtus ſerrugineo-lepidotis, floribus corymboſis, ariſtis plumoſis. *Mexico.* Linn. transact. 14. t. 22. f. 2.

Roſſii R. Br. 8. S. acaulis glabra, foliis radicalibus interrupte pinnatis, foliolis 3lobis, ſcapo 1floro ſub-2phyllo, ariſtis nudis. *Inſ. Melville.*

pag. 547.

Ad *Roſam.*

Woodſii Lindl. — aculeis ramorum ſparſis rectis, ſtipulis oblongis ſubintegerrimis.

pag. 548.

Ad R. *cinnamomeam* reducenda R. *turbinella* Sw. n. 83.

R. *laxa* Retz. — ramis pruinoſis, aculeis caulinis ſparſis duplicibus ſubreflexis.

pag. 549.

R. *liveſcentis* Beſſ. forte var.: R. *guttenſteinenſis* Jacqu. f. 110. R. germinibus oblongis utrinque conſtrictis pedunculisque geminis glabris, calycibus glandulofis petala longe ſuperantibus, aculeis ſtipularibus patentiſſimis, foliis oblongis ſerratis livido-glaucis ſubtus verſicoloribus petiolisque laevibus. *Volhynia.*

pallens Retz. 111. R. germinibus hemiſphaericis pedunculisque glabris, laciniis calycis ſubaequalibus, foliolis ovalibus glaberrimis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus. *Suecia.*

hemiſphaerica * 112. R. germinibus hemiſphaericis breviſſimis glabris, pedunculis aculeato-hiſpidis, aculeis ramorum duplicibus horizontalibus, foliolis minutis ſubrotundis petiolisque glaberrimis. *Patria?* In horto halenſi colitur.

moſquenſis * 113. R. germinibus globoſis pedunculisque glabris, aculeis ſtipularibus rectiusculis, foliolis oblongis ſerratis petiolisque inermibus pubeſcentibus. *Ager moſquenſis.*

gorinkenſis Fiſch. 114. R. germinibus ſubglobоſis pedunculisque glaberrimis, ramis nitidis ſubinermibus, petiolis foliisque ſubtus pubeſcentibus. *Ager moſquenſis.*

R. *ochroleuca* Sw., quam R. *ſpinoſiſſimae* varietatem habui, differt omnino aculeis ramorum rectis, petiolis ſubinermibus.

pag. 551.

dimorpha Beſſ. 115. R. germinibus ovatis utrinque contractis pedunculisque confertis abbreviatis ſparſim glandulofo-hiſpidis, calycibus confertim glandulofis, aculeis ramorum ſparſis ſubrecurvis, petiolis aculeatis foliisque utrinque pubeſcentibus. *Podolia.* Ergo minimae eſt R. tomentoſae var.

pag. 552.

R. *Boreykiana* Beſſ. germina habet oblonga (non ovata) foliola ſubtus pubeſcentia duplicato-ſerrata margine (non ſubtus) glandulofa.

floribunda Beſſ. 116. R. germinibus elliptico-oblongis pedunculisque aggregatis glandulofo-piloſis, aculeis ramorum ſparſis validis recurvis, petiolis aculeatis villoſis, foliis lineato-rugulofis duplicato-ſerratis ſubtus margineque glandulofis pubeſcentibus. *Ad Boryſthenem.*

pag. 554.

R. *turbinella* Sw. ad R. *cinnamomeam* n. 21.

R. *venoſa* Sw. ad R. *caninam* n. 77. relegenda.

CLASSIS XIII.

pag. 557.

Poſt n. 1883. *Empedoclea* Hilar. Cal. polyphyllus imbricatus. Antherae 2loculares. Stigma capitatum. Germen 6ſpermum. Bacca? *Dillenieae.*

pag. 558.

Poſt n. 1893. *Entelea* R. Br. Cal. 4-5ſepalus. Petala 4. Stam. omnia perfecta. Capſ. echinata 5locularis, loculis polyſpermis. *Tiliaceae.*

Echinocarpus Blum. Cal. 4partitus deciduus. Pet. 4, 5 inciſa. Antherae cuſpidatae. Stigma ſimplex. Capſ. echinata lignoſa 4valvis, intus pulpa farinacea farcta. *Bixeae.*

Haſſeltia Kunth. Cal. 4partitus. Pet. 4. Antherae 2loculares. Glandulae 8 perigynae. Fructus ſubgloboſus 1-2locularis, loculis 1-2ſpermis. *Bixeae.*

Poſt n. 1894. *Corynandra* Schrad. Cal. 4ſepalus. Cor. 4petala. Filamenta clavata apice colorata. Antherae curvatae. Siliqua ſeſſilis 2valvis polyſperma. *Capparideae.*

Poſt n. 1900. *Porpa* Blum. Cal. 5partitus. Pet. 5, intus baſi tomentoſa. Stam. annulo membranaceo cincta. Stigma 3dentatum. Capſ. 3locularis, loculis 1ſpermis.

1905. *Alegria* Seſſ. cum Lühea W. Mart. jungenda.

pag. 559.

Poſt n. 1911. inſerendae:
Luxemburgia Hilar. n. 1465. p. 173.
et *Godoya* R. et P. n. 1612. p. 278.
Cochloſpermum Kunth. *Bombaceis* potius accenſendum.

Poſt n. 1923. *Caraipa* Aubl. Cal. 5partitus. Pet. 5. Antherae 2loculares apice glanduliferae. Stylus ſimplex, ſtigmate 3lobo. Capſ. 3locularis, placenta centrali columnari 3alata. Semina ſolitaria compreſſa. *Ternſtrömieae.*

pag. 560.

Poſt n. 1936. *Micranthera* Choiſ. Flores dioeci. Cal. 4ſepalus. Pet. 10. Antherae 2loculares. Stigma peltatum. Bacca 5locularis. *Guttiferae.*

pag. 561.

Poſt n. 1955. *Kuhlia* Kunth. Cal. campanulatus 6-8ſidus clauſus perſiſtens, laciniis interioribus majoribus. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigma obtuſum. Fructus 1locularis polyſpermus. *Bixeae.*

Ad *Davillam* Vand. adde Pet. 1-6 caduca.

pag. 562.

Poſt n. 1977. *Trichoſpermum* Blum. Cal. 5ſepalus. Pet. 5. Antherae didymae. Stylus 0. Stigm. 2. Capſ. 2valvis hirſuta, placenta lineari. Sem. arillata ciliata.

Ad *Sauravium* W. adde: Stam. baſi ſubcoalita. Styli 3, 5. Capſ. baccata intus mucilaginoſa. Placenta in quovis loculo 2fida.

pag. 564.

Ad *Wormiam* Rottb. adde: Sem. pulpa pellucida obvoluta.

Poſt n. 2013. *Geeria* Blum. Flores dioeci. Cal. 5ſepalus 2bracteatus. Cor. 5partita. Stam. baſi corollae adnata. Styli 3, 5 coaliti, ſtigmatibus acutis. Bacca 5locularis polyſperma. *Ternſtrömieae.*

pag. 565.

Poſt n. 2020. *Rollinia* Hilar. Cal. 3partitus. Cor. 1petala 6loba dorſo 3alata. Bacca compoſita. *Anoneae.*

Ad *Micheliam* add. Cal. bractea ſpathacea lateraliter dehiſcente cinctus.

Sarcocarpon Blum. Flores monoeci. Cal. 3bracteatus 3ſepalus. Petala 9–12, ordine ternario diſpoſita. Filamenta breviſſima. Antherae apice extrorſum adnatae. Fructus baccati 2ſpermi conglomerati.

Ad *Dilleniam.* Petala perſiſtentia. Stam. aequalia.

Capellia Blum. Cal. 5ſepalus. Pet. 5 decidua. Stam. exteriora breviora, interiora multo longiora 1ſerialia. Capſ. membranaceae intus dehiſcentes polyſpermae. *Dillenieae.*

Aromadendron Blum. Cal. 1phyllus ſpathaceus. Petala numeroſiſſima. Stamina ſubulata. Antherae extrorſum dehiſcentes. Capſ. 2ſpermae in fructum ligneum coalescentes. *Magnolieae.*

Poſt n. 2042. *Hydraſtis.* Cal. corollinus 3ſepalus. Nectaria 0. Caryopſes baccatae 1ſpermae coalitae. *Ranunculeae.*

---

pag. 567.

Ad *Swartziam* W.

Poſt n. 3. *parviflora* Cand. 10. Sw. foliis ſimplicibus breviſſime petiolatis ovatis acuminatis emarginatis, pedunculis ſub-3floris, petalo ſubrotundo ſimbriato calycem aequante. *Cayenn.*

ochnacea Cand. 11. Sw. foliis ſimplicibus ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis 1floris. *Amer. auſtr.?*

Poſt n. 4. *aptera* Cand. 12. Sw. foliis ternatis ovato-ellipticis acuminatis emarginatis, petiolis teretibus, pedunculis 2–5floris. *Guiana.*

myrtifolia Sm. 13. Sw. foliis ternatis pinnatisque bijugis, foliolis oblongo-lanceolatis, petiolis marginatis, petalo

orbiculato calycem aequante, ſtaminibus numeroſiſſimis polyadelphis. *Caracas.*

Ad Sw. *pinnatam* W. adde: foliolis oblongis acuminatis, pedunculo ſubvilloſo, racemis geminis, petalo orbiculato calycem excedente, ſtaminibus plurimis. (S. brachyſtachya Cand.)

pag. 568.

Poſt n. 9. *tomentoſa* Cand. 14. Sw. foliis pinnatis oblongis acutis ſubtus ramisque villoſis, ſtipulis ſuborbiculatis, racemis multifloris, petalo orbiculato. *Guiana.* (Robinia Panacoco Aubl. Flores fructusque aliunde petitos eſſe, Cand. teſtatur. Ergo et Robinia tomentoſa W. Syſt. 3. 247. huc trahenda.)

polyphylla Cand. 15. Sw. foliis pinnatis multijugis glabris, petiolis teretibus, racemis ſubternis gracilibus ſpicaeformibus, petalo ſubrotundo. *Cayenn.*

Poſt *Doliocarpum:*

EMPEDOCLEA Hilar.

alniſolia Hilar. *Braſil.* Frutex ramis ferrugineis, foliis ellipticis ſerratis venoſis ſcaberrimis, floribus paniculatis albis.

pag. 569.

Ad *Papaver obtuſifolium* Desf. adde patriam: *Sardiniam.*

pag. 570.

Ad *Stylophorum* Nutt.

ſimplicifolium * 4. St. capſulis oblongis ſetoſis, foliis petiolatis oblongis obtuſis integerrimis ſcapoque 1floro ſetoſo-hirtis, flore cernuo. *Emodi montes.* (Papaver Don.)

nepalenſe * 5. St. capſula ſphaerica ſetis plumoſis denſe tecta, foliis oblongis ſeſſilibus indiviſis hiſpidis, caule ramoſo, floribus paniculatis. *Nepal.* (Meconopſis nepaulenſis Cand., Papaver paniculatum Don.)

pag. 571.

Ad *Glaucium* Tourn.

tricolor Bernh. 7. Gl. foliis lyrato-pinnatifidis piloſiusculis, ſiliqua hirſuta, petalis contiguis, baſi macula halonata. *Thuringia. Podolia.*

Ad *Calophyllum.*

parvifolium Choiſ. 8. C. foliis cordato-ovatis obtuſiusculis breviſſime petiolatis laevibus ſtriato-venoſis, ramis tortuoſis, paniculis laxis paucifloris. *Inſ. Molucc.* Act. ſoc. nat. pariſ. 1. 229.

pag. 572.

Poſt *Sparrmanniam* Thunb.:

ENTELEA R. Br.

arborefcens R. Br. *Nov. Zeeland.* Arbuscula ſtellato-tomentoſa, foliis cordatis inaequaliter dentatis 5nerviis, floribus umbellatis albis. Bot. mag. 2480.

ECHINOCARPUS Blum.

Sigun Blum. *Java.* Arbor proceriſſima, foliis alternis oblongis acutis, pedunculis 1floris lateralibus.

HASSELTIA Kunth.

floribunda Kunth. *Ad fl. Magdalen.* Arbor foliis alternis oblongis dentatis 5nerviis baſi 2glandulofis, cymis umbellatis terminalibus. Humb. nov. gen. 7. t. 651.

PORPA Blum.

repens Blum. *Inf. Javae vicina.* Suffrutex, foliis petiolatis ſubcordatis 3lobis dentatis ſcabris, ſtipulis oppoſitis lanceolatis, pedunculis oppoſitifoliis ſub-3floris.

pag. 573.

Ad *Capparin.*

Poſt n. 20. *Sodada* R. Br. 86. C. aphylla, ramis dichotomis, aculeis uncinatis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis. *Arabia. Aegyptus.* (Sodada decidua Forsk. Delil. fl. aeg. t. 26. Syſt. 2. p. 213.)

Ad C. *pubiflorum* Cand. (C. foetida Blum.)

micrantha Blum. 87. C. foliis ſubcordato-ovalibus glabris coriaceis apice ſcarioſis, ſpinulis rectis, pedunculis aggregatis petiolo brevioribus. *Java.* C. calloſa et flexuoſa Blum. varr.

pag. 576.

Poſt n. 62. *tylophylla* * 88. C. foliis ovalibus coriaceis glabris calloſo-mucronatis, ſpinis uncinatis, racemis elongatis, pedicellis umbellatis. *Java.* (C. callophylla Blum.)

Ad C. *lanceolarem* Cand. (C. ſalaccenſis Blum.)

pag. 577.

Poſt *Capparin:*

CORYNOPHORA Schrad.

pulchella Schrad. *Nepal. China.* Herba annua erecta, foliis inferioribus 5natis ſuperioribus ternatis lanceolato-linearibus, floribus corymboſis albis, filamentis roſcis.

pag. 578.

Ad *Diplophractum* Desf.

ſalicifolium * 2. D. foliis oblongis utrinque attenuatis ſubintegerrimis, ſtipulis nullis, pedunculis congeſtis terminalibus, petalis denis. *Nov. Caledon.* (Microſemma ſalicifolia Labill. t. 57.)

pag. 579.

Ad *Grewiam.*

Ad Gr. *laevigatam* Vahl. (Gr. glabra Blum.)

odorata Blum. 46. Gr. foliis oblongis ſubtus ſcabrinsculis inaequaliter crenulatis, crenis infimis glandulofis, pedunculis axillaribus ſubgeminis 3-5floris, pedicellis umbellatis, ſepalis 3nerviis. *Java.*

pag. 580.

Ad Gr. *guazumaefoliam* Juſſ. (Gr. oblongifolia Blum.)

Poſt n. 24. *oppoſitifolia* Hamilt. 47. Gr. foliis ovatis acuminatis ſerratis 3nerviis ſubtus ramulisque tomentoſis, pedunculis ſolitariis 3floris oppoſitifoliis. *Nepal.*

pag. 581.

Ad Gr. *arboream* Roxb. (Gr. inaequalis Blum.)

Poſt n. 42. *involucrata* Blum. 48. Gr. foliis inaequaliter cordatis oblongis acuminatis ſerrulatis ſubtus ſtellato-tomentoſis, paniculis axillaribus terminalibusque divaricatis, floribus involucratis. *Java.*

pumila Hamilt. 49. Gr. fruticoſa, foliis obovato-ſubrotundis 5nerviis ſerratis ramulisque villoſis, pedunculis axillaribus aggregatis 3floris. *Nepal.*

pag. 582.

Ad *Columbiam* Perſ.

javanica Blum. 2. C. foliis dimidiato-cordatis acuminatis ſubſerrulatis baſi 5nerviis ſupra ſcabris ſubtus ſtellato-tomentoſis, paniculis terminalibus divaricatis, capſulis villoſis, alis apice extus dilatatis. *Java.*

celebica Blum. 3. C. foliis baſi obliqua oblongis acuminatis ſerratis 3nerviis ſupra ſcabris ſubtus ſtellato-pubeſcentibus, racemis paniculatis terminalibus, capſulae alis rotundatis. *Celebes.*

n. 1905. *Alegria candida* Seſſ. deleatur, ſub *Lühea* reditura.

pag. 586.

Ad *Ciſtum.*

Poſt n. 23. *Sideritis* Presl. 27. C. caule decumbente, foliis petiolatis obovatis ſubrugoſis ſubtus caneſcenti-tomentoſis, pedunculis ſolitariis elongatis 1-2floris ſuperne articulatis calycibusque tomentoſis, floribus ante antheſin nutantibus. *Sicil.*

Cupanianus Presl. 28. C. caule erecto, foliis petiolatis subcordato-ovatis margine fimbriatis rugosis subtomentosis, petiolis dilatatis sulcatis, pedunculis sub-3floris superne bracteatis, calycibus villosis. *Sicil.*

pag. 592.

Ad *Helianthemum* Tourn.

Ad H. *bicolor* et *arcuatum* Presl., illud ab H. *croceo* Pers., hoc ab H. *vulgari* Gärtn. discernere nequeo.

pag. 594.

Post *Weiheam* *:

LUXEMBURGIA Hilar.

speciosa Hilar. 1. L. foliis spathulato-lanceolatis mucronatis serrato-ciliatis venosis, stipulis laciniato-ciliatis, floribus racemosis. *Brasil.* (Plectanthera floribunda Mart.) L. octandra Hilar. var.

corymbosa Hilar. 2. L. foliis longe petiolatis lanceolatis mucronatis serrato-ciliatis, stipulis pectinatis, corymbis paucifloris. *Brasil.* (Plectanthera ciliosa Mart., Luxemburgia polyandra Hilar.)

GODOYA R. et P.

gemmiflora Mart. G. foliis oblongis obtusis obsolete serrulatis, racemis compositis elongatis, calycibus gemmaceis 10sepalis. *Brasil.* Mart. nov. gen. t. 74.

G. *obovata* et *spathulata* R. et P. quas p. 330. cum manca auctorum phrasi citavi, nec a se invicem nec a Martiana optime stabilita satis differre videntur.

pag. 596.

Ad *Cleyeram ochnaceam* Cand. (Ternströmia Lushia Don.)

Ad *Cochlospermum* Kunth.

C. *vitifolium* mutetur in *serratifolium* Cand. (Bombax hibiscifolium W. herb., Wittelsbachia insignis Mart. nov. gen. t. 55.)

vitifolium * 8. C. foliis 5fidis crenato-serratis utrinque glabris. *Nov. Hispan.* (Bombax vitifolium W. enum., Wittelsbachia Mart.)

pag. 597.

Ad *Delimam tripetalam* Blum. D. intermedia Blum. var.

pag. 598.

Ad *Bonnetiam* Schreb.

B. *meridionalis* Sw. 2. melius sic definitur: B. foliis alternis longe petiolatis stipulatis oblongis coriaceis remote costato-venosis, floribus racemosis, seminibus pendulis.

venulosa Mart. 3. B. foliis alternis breviter petiolatis oblongis obtusiusculis subtus venulosis, floribus racemosis, seminibus erectis. *Brasil.*

anceps Mart. 4. B. foliis alternis subsessilibus spathulatis obtusis venosis, pedunculis axillaribus ancipitibus bracteatis 3floris. *Brasil.* (B. stricta Mart., Kieseria stricta Nees.)

corymbosa * 5. B. foliis obovatis obtusis coriaceis glaberrimis glaucescentibus parallele venosis, paniculae corymbosae ramis dichotomis, calycibus glabris. *Brasil.* (Kielmeyera corymbosa Mart. nov. gen. t. 72.)

coriacea * 6. B. foliis oblongis obtusis basi attenuatis coriaceis glaberrimis parallele venosis, corymbo paucifloro terminali, calycibus extus pubescentibus. *Brasil.* (Kielmeyera coriacea Mart. nov. gen. t. 70.)

variabilis * 7. B. foliis obovato-oblongis obtusis coriaceis, pedunculis elongatis subcorymbosis, calycibus obtusis glabris. *Brasil.* (Kielmeyera variabilis Mart. nov. gen. t. 71.)

petiolaris * 8. B. foliis longe petiolatis oblongis obtusis, racemis paucifloris, calycibus orbicularibus glabris, stigmatibus ternis. *Brasil.* (Kielmeyera petiolaris Mart. nov. gen. t. 69.)

rosea * 9. B. foliis subsessilibus oblongis obtusis, floribus terminalibus subternis, calycibus rotundatis extus pubescentibus. *Brasil.* (Kielmeyera rosea Mart. nov. gen. t. 68.)

CARAIPA Aubl.

parvifolia Aubl. 1. C. foliis alternis ovatis acutis subtus incano-tomentosis, floribus racemosis. *Guiana.*

grandifolia Mart. 2. C. foliis alternis oblongo-lanceolatis longissimis cuspidatis supra nitidis subtus glaucescentibus, floribus racemosis. *Brasil.*

densifolia Mart. 3. C. foliis alternis ovato-oblongis utrinque glabris subtus glaucescentibus, floribus racemosis. *Brasil.* (C. glabrata Mart. var.)

paniculata Mart. 4. C. foliis oppositis petiolatis oblongis subtus ramisque ferrugineo-tomentosis, panicula terminali, petalis extus dimidiato-tomentosis. *Brasil.* Mart. nov. gen. t. 64.

pag. 599.

Ad *Ascium* Schreb.

anomalum * 4. A. floribus subspicatis 8andris, cucullis pedicellatis hemisphaerico-galeatis, foliis oblongis obtusis mucronatis basi attenuatis subcoriaceis. *Amer. tropic.* (Norantea anomala Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 647. b.)

pag. 601.

Ad *Looſam palmatam* * (Treviran. in nov. act. nat. cur. 13. t. 12. Blumenbachia inſignis Schrad.)

pag. 602.

Poſt *Heptacam* Lour.:

MICRANTHERA Choiſ.

cluſioides Choiſ. *Guiana.* Arbor foliis oblongis acutis glaberrimis, floribus paniculatis bracteatis luteis. (Cluſia longifolia Rich.)

Ad *Lecythin.*

Poſt n. 3. *Couratari* * 12. L. foliis petiolatis oblongis glabris coriaceis, floribus racemoſo-ſpicatis, ſeminibus alatis. *Guiana.* (Couratari guianenſis Aubl.)

pag. 606.

Ad *Maeruam* Forsk.

angolenſis Cand. 3. M. floribus racemoſis, corona lacero-multipartita, foliis ovalibus. *Afric. occid.*

rigida R. Br. 4. M. corymbis terminalibus panciflоris, corona lacero-multipartita, foliis obovatis rigidis. *Afr. med.* Denham. et Clapperton. it. p. 226.

pag. 607.

Poſt *Ryaniam* Vahl.:

KUHLIA Kunth.

glauca Kunth. 1. K. foliis baſi dimidiata oblongis acutiusculis remote ſerratis ſubtus glaucis, floribus faſciculato-paniculatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 652.

ulmifolia Kunth. 2. K. foliis baſi dimidiata oblongo-lanceolatis acuminatis groſſe ſerratis utrinque concoloribus, floribus paniculatis. *Alpes Popayan.* Humb. nov. gen. 7. t. 653.

Ad *Flacourtiam* Commerſ.

Poſt n. 5. *flexuoſa* Kunth. 8. Fl. ramulis flexuoſis ſpinoſis, foliis ovato-oblongis remote ſerratis membranaceis glabris nitidulis, floribus ♂ axillaribus aggregatis. *Mexico.*

celaſtrina Kunth. 9. Fl. ſpinis ramorum longis rectis, foliis obovato-ſubrotundis membranaceis crenatis glabris nitidulis, pedunculis axillaribus ſubgeminis, fructibus ſubgloboſo-ellipticis. *Mexico.*

prunifolia Kunth. 10. Fl. trunco ſpinis horrido, ramis inermibus, foliis obovato-ellipticis obtuſis coriaceis glabris nitidis glanduloſo-crenatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gener. 7. t. 654.

Poſt

Poſt n. 7. † *cordata* Kunth. 11. Fl. inermis, foliis cordatis acutis crenatis coriaceis glabris nitidis, floribus ♂ aggregatis, ♀ ſolitariis. *Peru.*

pag. 608.

DAVILLA Vand.

rugoſa Poir. 1. D. ſcandens, foliis oblongis obtuſis obſolete ſerratis hirſutis, floribus ſubpaniculatis digitatis. *Braſil.* (D. braſiliana Cand.) Leſſert. ic. t. 71.

anguſtifolia Hilar. 2. D. ſcandens, foliis glabris oblongo-linearibus acutis integerrimis, coſta venisque ſubtus piloſiuſculis, floribus racemoſis 3petalis digynis. *Braſil.*

macrophylla Hilar. 3. D. ſcandens, foliis oblongis acuminatis repandis ſubtus pubeſcentibus, floribus racemoſis 5petalis. *Braſil.*

braſiliana Kunth. 4. D. arboreſcens, foliis oblongis obtuſis parallele venoſis coriaceis ſcabris, floribus faſciculato-paniculatis. *Nov. Granat. Braſil.*

caſtaneaefolia Hilar. 5. D. foliis oblongis acuminatis remote ſerratis parallele venoſis aſpero-piloſis, floribus racemoſis digynis. *Braſil.*

elliptica Hilar. 6. D. foliis ellipticis obtuſis integerrimis coriaceis ſubtus pubeſcentibus reticulatis, racemis compoſitis villoſis, floribus digynis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 23.

flexuoſa Hilar. 7. D. foliis oblongis obtuſis coriaceis glaberrimis integerrimis, pedunculis ſubracemoſis, capſulis ſubternis. *Braſil.*

pag. 610.

Ad *Curatellam.*

Çambaiba Hilar. 2. C. foliis ovato-oblongis obtuſiſſimis repando-dentatis ſubtus tomentoſis, floribus paniculatis. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſil. t. 24.

Ad *Baueram* Andr.

galioides Sieb. 2. B. foliis ternis elliptico-linearibus integerrimis ciliatis, pedunculis elongatis. *Nov. Holl.*

pag. 611.

Ad *Cliffortiam.*

Poſt n. 8. *ſerrata* Reichenb. 22. Cl. foliis ſpathulato-lanceolatis cuſpidato-ſerratis glabris, ſtipulis perſiſtentibus imbricatis ovatis, ramis flexuoſis virgatis. *C. B. S.*

pag. 612.

Poſt n. 15. *ſpicata* Reichenb. 23. Cl. caule ſimplici foliisque ſubverticillatis lanceolatis erectis hirſutis, ſpicis denſis terminalibus foliofis. *C. B. S.* Olim Anthoſpermum habui, licet nusquam deſcripſerim.

Poſt *Cliffortiam:*

TRICHOSPERMUM Blum.

javanicum Blum. *Java.* Arbor foliis alternis cordato-oblongis ſerrulatis ſubtus 2glandulofis, ſtipulis ovatis, cymis axillaribus.

Ad *Ablaniam* Aubl.

digitata * 2. A. foliis digitatis glabris ſupra nitidis, foliolis oblongis ſerrulatis, floribus corymbofis. *Rio grande.* Sello.

Ad *Lacida.*

foeniculacea * 2. L. foliis decompoſitis lineari-ſetaceis ſerrulatis, floribus ſolitariis ſpathaceis 8andris. *Nov. Granat.* (Marathrum foeniculaceum Humb. Syſt. 2. p. 246.)

Ad *Homalium.*

incanum Perſ. 3. H. foliis ſpathulato-lanceolatis apice ſerratis incano-tomentoſis, floribus 1gynis. *Peru.* (Pineda incana R. et P.)

anguſtifolium Sm. 4. H. foliis lanceolatis ſubintegerrimis, racemis ſpicatis axillaribus, laciniis calycis interioribus obtuſis. *Afric. occid.*

† *Napimoga* * 5. H. foliis ovali-oblongis crenatis laevibus, ſpicis pedunculatis axillaribus interruptis filiformibus, corolla pubeſcente eglanduloſa. *Guiana.* (Napimoga guianenſis Aubl.)

pag. 613.

Ad *Sauraviam* W.

S. *excelſa* W. (Palava ſcabra Kunth.)
S. *gigantea* Cand. (Ternſtrömia racemoſa Don.) *Nepal.*
S. *nepalenſis* Cand. (S. micrantha Blum.) *Java.*
S. *bracteoſa* Cand. (S. Reinwardtiana Blum.)
S. *bracteolata* Cand. (S. cuneata Blum.)
S. *ſerrata* Cand. (Palava glabrata R. et P. Apatelia Cand. Syſt. 3. 340.)
S. *lanceolata* Cand. (S. ſpadicea Blum.) Nonne et Palava lanceolata R. et P. (Apatelia Cand. Syſt. 3. 340.) *? Peru.*

Blumeana * 13. S. foliis cordato-oblongis acuminatis ſetaceo-ſerrulatis ſupra glabris ſubtus rufo-villoſis, ramulis hirſuto-ſtrigoſis, pedunculis axillaribus trichotomis cymiferis petiolo brevioribus bracteatis, bracteis lato-lanceolatis. *Java.* (S. gigantea Blum.)

Noronhiana Blum. 14. S. foliis ovato-oblongis acuminatis calloſo-ſerratis utrinque ſtrigoſo-ſquamuloſis, pedunculis axillaribus confertis 1floris nutantibus. *Java.*

pendula Blum. 15. S. foliis oblongis glanduloſo-ſerratis utrinque glabris, pedunculis axillaribus elongatis nutantibus 2-3floris, pedicellis ſub-3floris umbellatis. *Java.*

hirſuta Blum. 16. S. foliis baſi inaequali oblongis acuminatis ſupra ſcabris ſubtus ramulisque hirſutis, pedunculis axillaribus elongatis 3fido-umbellatis, bracteis ſpathulatis. *Java.*

tomentoſa * 17. S. foliis obovato-lanceolatis argute denticulatis ſupra calloſo-aſperis ſubtus ramulisque albido-tomentoſis, paniculis axillaribus bracteatis. *Nov. Granat. Quito.* (Palava tomentoſa Kunth.)

biſerrata * 18. S. foliis obovato-oblongis biſerratis, racemis brachiatis, pedicellis 3floris. *Peru.* (Palava biſerrata R. et P., Apatelia Cand. Syſt. 3. 340.)

cauliflora Blum. 19. S. foliis ovato-oblongis acuminatis ariſtato-ſerratis ſupra glabris ſubtus ſtrigoſo-tomentoſis dilute ſpadiceis, pedunculis 1floris in trunco aggregatis. *Java.*

pag. 614.

Ad *Hibbertiam* Salisb.

Poſt n. 14. *caneſcens* Sieb. 20. H. foliis ſpathulato-linearibus ſupra piloſis ſubtus glabris, ramis villoſis, germinibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.*

pag. 615.

Ad *Paeoniam peregrinam* Mill. P. *ſeſſiliflora* Bot. mag. 2648. var.

pag. 618.

Ad *Delphinium.*

Poſt n. 26. *paucifloruм* Don. 48. D. foliis multipartitis glabris, laciniis linearibus acutis, pedunculis remotis elongatis, calcare abbreviato, petalis ſuperioribus 2fidis, inferioribus obovatis unguiculatis. *Nepal.*

Poſt n. 31. *velutinum* Bertol. 49. D. petiolis baſi dilatatis vaginantibus, foliis 5partito-multifidis utrinque cauleque villoſis, laciniis linearibus, bracteis inferioribus flore longioribus. *Italia media.*

pag. 619.

Ad D. *ciliatum* Stev. D. ſcabrifolium et Carela Don. *Nepal.*

pag. 621.

Ad *Aconitum productum* Reichenb. (A. grandiflorum Pall. herb., delphinifolium *β.* ſibiricum Cand.)

pag. 625.

Ad *Begoniam.*

Poſt n. 12. *elliptica* Kunth. 39. B. herbacea glabra, foliis inaequilatero-ellipticis acuminatis ſubintegerrimis 5nerviis venoſis, corymbis dichotomis longe pedunculatis, capſulae ala exteriore ovato-deltoidea acuta aſcendente. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. t. 641.

umbellata Kunth. 40. B. fruticosa glabra, foliis inaequaliter ovatis acutis ciliato-serratis, nervis subtus pubescentibus, floribus superioribus ♂ umbellatis, inferioribus ♀ solitariis, capsulae alis aequalibus cornutis. *Nov. Granat.*

elegans Kunth. 41. B. suffruticosa glabra, foliis subsessilibus inaequaliter oblongis acuminatis setaceo-serratis reticulato-venosis, pedunculis pauciforis, capsulae alis inaequalibus coloratis. *Nov. Granat.*

pag. 626.

Post n. 19. *palmata* Don. 42. B. herbacea fusco-hirsuta, foliis inaequaliter cordatis palmato-lobatis, scapo trifloro, capsulae villosae alis obtusangulis, altera productiore. *Nepal.*

Post n. 26. *ciliata* Kunth. 43. B. herbacea pilosiuscula, foliis longe petiolatis semicordatis acutis grosse duplicato-serratis ciliatis, pedunculis axillaribus 6floris, capsulae alis inaequalibus rotundatis. *Nov. Granat.*

foliosa Kunth. 44. B. suffruticosa scandens ramosissima glabra, ramis foliosis, foliis subsessilibus semicordatis argute serratis obsolete venosis subtus papillosis, pedunculis paucifloris, capsulae alis inaequalibus, exteriore acuta. *Amer. tropic.?* Humb. nov. gen. 7. t. 642.

gracilis Kunth. 45. B. radice tuberosa, caule herbaceo simplici, foliis semicordatis duplicato-serratis acuminatis sub-7nerviis, pedunculis 1floris. *Mexico.*

populifolia Kunth. 46. B. caule herbaceo pilosiusculo, foliis semicordato-reniformibus serratis obsolete lobatis 9nerviis subtus ferrugineis, pedunculis 1floris. *Mexico.*

acerifolia Kunth. 47. B. herbacea dichotome ramosa glabra, foliis longe petiolatis semicordatis 6-7fidis acutis argute serrulatis hirsutiusculis, pedunculis terminalibus elongatis dichotomis. *Quito.*

Post n. 30. *Hatacoa* Hamilt. 48. B. herbacea, foliis amplis semiovato-oblongis acuminatis denticulatis subtus hirsutis, capsulae alis inaequalibus obtusis. *Nepal.*

B. *bidentata* Radd. (B. guaduensis Kunth.)

B. *scandens* Sw. (B. denticulata Kunth.)

†††† *Foliis subaequaliter cordatis.*

picta Sm. 49. B. radice tuberosa, caule brevi herbaceo, foliis profunde cordatis serratis acutis rugosis hirsutis subtus maculatis, pedunculis 3fidis, capsulae tomentosae alis inaequalibus abbreviatis. *Nepal.*

diocca Hamilt. 50. B. caule gracili, foliis aequaliter cordato-oblongis acuminatis inaequaliter dentatis glabris, capsulae alis subaequalibus acutis. *Nepal.*

rubella Hamilt. 51. B. foliis subaequaliter cordatis acuminatis erosо-dentatis glabris nitidis, petiolis filiformibus, pedunculis multifloris paniculatis, capsulae alis inaequalibus acutangulis. *Nepal.*

Poſt n. 37. *tenella* Don. 52. B. foliis ſubaequaliter cordatis acuminatis duplicato-ſerratis glabris, ſcapo filiformi ſubbifloro, capſulae alis inaequalibus obtusangulis. *Nepal.*

pag. 628.

Ad *Drimyn granatenſem* cf. Hilar. pl. uſ. braſil. t. 26-28.

pag. 629.

Ad *Tetraceram.*

** *Floribus* 3*gynis.*

dichotoma Blum. 20. T. foliis oblongis utrinque attenuatis apice denticulatis, venis ſubtus pedicellisque pubeſcentibus, pedunculis dichotomis, ſepalis glabris ciliolatis. *Java.*

gracilis Blum. 21. T. foliis ovalibus utrinque attenuatis apice ſerrulatis ſubtus ramulisque ſubvillosis, pedunculis 1-2floris, ſepalis 4 ciliatis. *Java.*

rigida Blum. 22. T. foliis ovalibus utrinque attenuatis apice repandis rigidis ſubtus ſcabris, panicula divaricata tomentoſa, ſepalis petalisque intus ſericeis. *Java.*

fagifolia Blum. 23. T. foliis ovato-ellipticis acutis apice ſerratis ſubtus ſcabriusculis, panicula pyramidata tomentoſa, ſepalis petalisque ciliatis. *Java.*

T. *Aſſa* Cand. (T. ſericea Blum.)

pag. 632.

Ad *Wormiam* Rottb.

obovata * 5. W. foliis obovatis ſerratis, pedunculis 1floris, floribus polygynis. *Java.* (Colbertia Blum.)

ſcabrella * 6. W. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis ſetaceo-ſerratis piloſis, pedunculis aggregatis elongatis, ſepalis petalisque rotundatis. *Nepal.* (Dillenia ſcabrella Roxb., Colbertia Don.)

Poſt *Gynocardiam* Roxb.:

GEERIA Blum.

ſerrata Blum. 1. G. ramulis tomentoſis, foliis lanceolatis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, floribus confertis axillaribus 5gynis. *Java.*

anguſtifolia Blum. 2. G. foliis lanceolatis acuminatis ſerratis ſubtus ramulisque ſericeis, floribus ♀ 3gynis. *Java.*

glabra Blum. 3. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus ramulisque glabris, floribus confertis axillaribus. *Java.*

obovata Blum. 4. G. foliis obovatis retuſis apice obtuſe ſerratis ſubtus ramulisque glabris, floribus paucis axillaribus. *Java.*

pag. 633.

Ad *Sagittariam.*

S. *guianenſis* l. guayanenſis.

Poſt n. 3. *palaefolia* Mart. 17. S. foliis obovatis obtuſis multinerviis, angulis baſeos obtuſis, ſcapo ſurſum ancipiti angulato, floribus verticillatis hermaphroditis, fructibus obovatis ſtriatis. *Braſil.*

pag. 634.

Poſt *Carpodonta:*

ROLLINIA Hilar.

longifolia Hilar. 1. R. foliis oblongo-lanceolatis ſubtus calycibusque rufo-tomentoſis. *Braſil.* (Anona dolabripetala Radd., xeſtropetala Syſt. 2. p. 641.)

fagifolia Hilar. 2. R. foliis ovatis cuſpidatis ſubtus pubeſcentibus, coſta venisque rufo-villoſis. *Braſil.*

parviflora Hilar. 3. R. foliis oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus. *Braſil.*

pag. 635.

Ad *Guatteriam* R. et P.

Poſt n. 13. *cuneiformis* Blum. 21. Gu. foliis obovatis baſi ſubcordatis glabris ſubtus glaucis, pedunculis 1floris petalisque ſubfalcatis elongatis, fructibus oblongis utrinque attenuatis. *Java.*

lateriflora Blum. 22. Gu. foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis ſolitariis 1floris, fructibus obovato-oblongis ſtipite brevioribus. *Java.*

pallida Blum. 23. Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris ſubtus pallidis, pedunculis ſolitariis 1floris elongatis, fructibus ſtipitatis oblongis utrinque attenuatis pubeſcentibus. *Java.*

auſtralis Hilar. 24. Gu. fruticoſa, foliis oblongis acuminatis glabris, petalis ſubaequalibus obtuſis. *Braſil.*

Poſt n. 19. *Gomeziana* Hilar. 25. Gu. arborea, foliis oblongis acuminatis ſubtus piloſis, petalis interioribus lanceolatis acutis. *Braſil.*

macrophylla Blum. 26. Gu. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis breviſſimis paucifloris, petalis exterioribus brevioribus. *Java.*

Bragma Blum. 27. Gu. foliis oblongis acuminatis ſupra lucidis, venis ſubtus ramulisque tomentoſis, pedunculis breviſſimis 1floris, petalis interioribus brevioribus. *Inſ. Javae vicinae.*

piſocarpa Blum. 28. Gu. foliis baſi inaequali ovato-oblongis obtuſiusculis, venis ſubtus ramulisque tomentoſis, pedunculis 1floris, fructibus globoſis ſubſeſſilibus. *Java.*

ferruginea Hilar. 29. Gu. foliis oblongis acutis ſubtus ferrugineo-pubeſcentibus, petalis interioribus latioribus bre-

vioribus. *Brafil.* Gu. eriopoda Cand. petala habet ſubaequalia.

villoſiſſima Hilar. 30. Gu. foliis oblongis acuminatis, venis ſubtus villoſiſſimis, pedunculis 2floris, petalis interioribus brevioribus. *Brafil.*

lutea Hilar. 31. Gu. fruticoſa, foliis oblongis acuminatis ſubpubeſcentibus, petalis interioribus elongatis acutis. *Brafil.*

pag. 636.

Ad *Xylopiam.*

grandiflora Hilar. 12. X. arborea, foliis lanceolatis ſubtus tomentoſis, pedunculis breviſſimis 2floris, petalis exterioribus linearibus, interioribus triquetris baſi 2auriculatis. *Brafil.*

ſericea Hilar. 13. X. arborea, foliis lanceolatis acuminatis ſubtus ſericeis, pedunculis breviſſimis 3floris, petalis exterioribus linearibus obtuſis, interioribus triquetris. *Brafil.* Hilar. pl. uſ. brafil. t. 33.

pag. 637.

Ad *Unonam.*

Cananga * 31. U. foliis inaequaliter ovato-oblongis acuminatis glabris, pedunculis axillaribus 1-multifloris demum foliоſis, pedicellis ſubcorymboſis, petalis lanceolatis, fructibus ovalibus ſtipitatis. *Java.* (U. odorata Blum.)

elliptica Blum. 32. U. foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis acutis glabris, pedunculis axillaribus 1floris bracteatis, petalis lineari-lanceolatis obtuſiusculis. *Java.*

litoralis Blum. 33. U. ramis ſubſcandentibus, foliis ovato-oblongis coriaceis glabris, pedunculis 1floris petiolo longioribus, fructibus ovalibus medio coarctatis breviter ſtipitatis. *Java.*

macrophylla Blum. 34. U. foliis ovato-oblongis acuminatis coriaceis glabris, pedunculis 1floris ſubaxillaribus, fructibus ovalibus 2ſpermis breviter ſtipitatis. *Java.*

ſuaveolens Blum. 35. U. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, pedunculis uncinatis multifloris, petalis linearibus ſericeis, fructibus oblongis utrinque attenuatis breviter ſtipitatis. *Java.*

U. *odorata* Dun. (U. virgata Blum.)

U. *nitidiſſima* Dun. (U. fulgens Labill. nov. Caled. t. 56.)

pag. 638.

Poſt n. 20. *biglanduloſa* Blum. 36. U. fruticoſa, foliis ſubcordatis ovato-lanceolatis margine 2glanduloſis ſubtus glaucis, pedunculis 1floris folio brevioribus, fructibus moniliformibus ſtipitatis. *Java.*

Poſt n. 25. *ſubcordata* Blum. 37. U. foliis ſubſeſſilibus ſubcordato-oblongis acuminatis ſubtus pubeſcentibus, pedunculis ſolitariis 1floris, baccis globoſis ſtipitatis 2ſpermis. *Java.*

Kentii Blum. 38. U. foliis oblongo-lanceolatis coriaceis nitidis, pedunculis 1floris nutantibus, baccis globosis breviter stipitatis 2spermis. *Java.*

humilis Blum. 39. U. foliis lato-lanceolatis, venis subtus fusco-sericeis, pedunculis oppositifoliis 3floris, baccis globosis stipitatis. *Java.*

pag. 639.

Ad *Uvariam.*

U. *dulcis* (*javana*) Dun. (U. purpurea Blum.)

rugosa Blum. 8. U. arborea, foliis oblongis acuminatis glabris, pedunculis paucifloris axillaribus, fructibus globosis rugosis 4spermis. *Java.*

Burahol Blum. 9. U. arborea, foliis oblongis nitidis, pedunculis confertis 1floris, floribus monoecis. *Java.*

longifolia Blum. 10. U. foliis oblongis retusis subtus ramulisque ferrugineo-tomentosis, racemis elongatis paucifloris, pedicellis medio bracteolatis. *Inf. Javae ab austro vicina.*

obtusa Blum. 11. U. foliis ovalibus obtusis subtus ramulisque ferrugineo-villosis, pedunculis elongatis 1floris, fructibus ovalibus tomentosis. *Java.*

†*sphaerocarpa* Blum. 12. U. sarmentosa, foliis ovato-oblongis acutis subtus ramulisque ferrugineo-villosis, fructibus longe stipitatis globosis laevibus 4spermis. *Java.*

pag. 640.

Ad *Anonam.*

Post n. 8. *australis* Hilar. 81. A. foliis ovatis cuspidatis glaberrimis punctatis, pedunculis solitariis. *Brasil.*

A. *squamosa* sponte nusquam in America crescere sed introducta a Lusitanis in Brasiliam dicitur. Hilar. pl. us. bras. ad t. 30.

pag. 641.

A. *xestropetala* * deleatur: militat enim supra sub Rollinia Hilar.

sylvatica Hilar. 82. A. foliis elliptico-oblongis acutis pubescentibus pellucido-punctatis, pedunculis solitariis axillaribus. *Brasil.* Hilar. pl. us. bras. t. 29.

cornifolia Hilar. 83. A. suffruticosa, foliis subrotundo-ovatis subtus pubescentibus, venis subtus rufis, pedunculis 1floris. *Brasil.*

dioeca Hilar. 84. A. suffruticosa, foliis obovatis pubescentibus subtus tomentosis, pedunculis 1floris. *Brasil.*

furfuracea Hilar. 85. A. fruticosa, foliis oblongis subtus ramulisque rufo-furfurosis, pedunculis oppositifoliis 2floris. *Brasil.*

pag. 642.

Ad *Magnoliam.*

Post n. 4. *Selloi* * 17. M. foliis obovatis obtusissimis, petalis ovatis obtusis. *Brasil.* (Talauma Hilar.)

ovata * 18. M. foliis ovatis obtuſiusculis, petalis ſubrotundis obtuſiſſimis. *Braſil.* (Talauma Hilar. fl. braſil. t. 4.)

pag. 643.

Ad M. *fuſcatam* Andr. (M. parviflora Blum.)

Ad M. *pumilam* Andr. add. (Talauma Candollii Blum.) del. ſyn. Liriodendron Liliifera L. Eſt enim ſpecies diſtinctiſſima:

Rumphii * 19. M. arborea, foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, pedunculis terminalibus erectis. *Inſ. Moluce.* (Sampacca montana Rumph. t. 2. t. 69., Liriodendron Liliifera L., Talauma Rumphii Blum.)

Ad *Micheliam.*

M. *Champaca* L. pedunculos habet ſpathasque ſericeas.

longifolia Blum. 8. M. foliis oblongis utrinque attenuatis glabris rigidis, pedunculis ſpathisque ſericeis. *Java.*

montana Blum. 9. M. foliis oblongis utrinque attenuatis coriaceis glabris, pedunculis ſpathisque nudis. *Java.*

rufinervia Blum. 10. M. foliis oblongis utrinque attenuatis, venis ſubtus ſpathisque rufo-villoſis, petalis exterioribus ſpathulatis obtuſis. *Java.*

Ad M. *Doltſopam* Buchan. (Manglietia glauca Blum.) *Java.*

macrophylla Don. 11. M. foliis lanceolatis utrinque attenuatis undulatis glabris, floribus terminalibus ſeſſilibus ſolitariis. *Nepal.*

SARCOCARPON Blum.

ſcandens Blum. *Java.* Frutex ſcandens, foliis ovato-oblongis, pedunculis confertis axillaribus 1floris.

pag. 644.

Poſt *Dilleniam:*

CAPELLIA Blum.

multiflora Blum. *Java.* Arbor excelſa, foliis oblongis repando-ſerrulatis glabris, pedunculis terminalibus multifloris.

AROMADENDRON Blum.

elegans Blum. *Java.* Arbor excelſa, foliis diſtichis oblongo-lanceolatis, floribus terminalibus ſolitariis.

pag. 645.

Ad *Adonida.*

Poſt n. 4. *davurica* Reichenb. 6. A. petalis duodenis ſpathulatis apice crenulatis calycem glabrum multo ſuperantibus, foliorum laciniis 3fidis linearibus. *Sibir.* Reichenb. ic. t. 321.

fibirica Patrin. 7. A. glaberrima, petalis numerofis obovatis apice crenulatis calycem multo fuperantibus, foliorum laciniis abbreviatis inciſis. *Sibir.* (A. ircutiana Fiſch.?)

pag. 646.

Ad *Ranunculum.*

Poſt n. 8. *Agerii* Bertolon. 148. R. foliis glabris, radicalibus cordatis fublobato-dentatis, ſequentibus 3partitis, laciniis cuneatis obtuſe dentatis inciſis, caule ſimplici ſub-1floro, calyce reflexo. *Ager bononienſis Ital.* Opuſc. ſcientif. di Bologn. 3. p. 182. t. 6.

pag. 647.

R. *cortuſaefolius* W. (R. heucheraefolius Presl. *Sicil.*)

Ad R. *millefoliatum* del. ſyn. Bertolonii.

Poſt n. 22. *ſcaber* Presl. 149. R. foliis decompoſitis multifidis ſcabris, laciniis lineari-oblongis obtuſis, calyce pubeſcente reflexo, caule erecto folioſo multifloro appreſſe pubeſcente, radice grumoſa. *Sicil.*

pag. 648.

Poſt n. 31. *cordifolius* * 150. R. foliis longe petiolatis cordatis crenatis, infimis orbiculatis, caule aſcendente gracili glaberrimo, pedunculis 1floris, floribus oligandris, ſepalis petalisque ſubternis. *Monte Video.* (Caſalea aſcendens Hilar.)

pag. 649.

R. *bonarienſis* Poir. melius ſic: R. foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtuſis crenatis, ſuperioribus ſubſeſſilibus ovatis, caule ramoſo, ſepalis petalisque minoribus ternis, floribus oligandris. *Buenos Ayres.* (Caſalea ficarifolia Hilar.)

phyteumaefolius * 151. R. glaberrimus erectus, foliis inferioribus cordatis obtuſis integerrimis, ſuperioribus oblongis ſubdentatis, ſummis linearibus, petalis calycem ſubaequantibus. *Braſil.* (R. bonarienſis Perſ., heterophyllus Sm., Caſalea phyteumaefolia Hilar.)

R. *flagelliformis* Sm. — floribus minutis oligandris. (Caſalea Hilar.) *Braſil.*

javanicus Blum. 152. R. foliis omnibus petiolatis cordato-ovatis crenatis, ſummis lanceolatis trifidisve, pedunculis oppoſitifoliis 1floris, petalis calyce duplo longioribus. *Java.*

fontanus Presl. 153. R. caule aſcendente ſiſtuloſo, foliis dentatis, inferioribus petiolatis cordato-ovatis obtuſis, ſuperioribus lineari-oblongis in petiolum attenuatis, pedunculis oppoſitifoliis, petalis calycem ſuperantibus. *Montes Sicil.*

Poſt n. 46. *hydrophilus* Gandich. 154. R. caule repente ſubnatante, foliis radicalibus orbiculato-ovatis longiſſime petiolatis, pedunculis 1floris. *Inſ. Falkland.*

pag. 650.

R. *apiifolius* Perſ. — calycibus coloratis, petalis minimis nectaria referentibus. (Aphanoſtemma Hilar.)

pag. 651.

Poſt n. 65. *Sabinii* R. Br. 155. R. foliis 3partitis, radicalibus longe petiolatis, laciniis ellipticis, lateralibus ſemibifidis, caulinis ſeſſilibus linearibus, calycibus hirſutis petala retuſa ſubaequantibus. *Inſ. Melville.*

arcticus Richardſ. 156. R. foliis glaberrimis, radicalibus longe petiolatis haſtatis 3partitis, laciniis 3-4fidis obtuſis, caulinis linearibus partitis, caule ſimpliciſſimo 1floro, calyce villoſo reflexo petalis obtuſiſſimis breviori. *Amer. arctic.*

Purſhii Richardſ. 157. R. caule repente foliisque petiolatis glaberrimis, depreſſis ternatim decompoſitis, laciniis divaricatis linearibus acutis, elevatis ſubuniformibus, laciniis cuneatis apice inciſo-dentatis, calycibus glaberrimis reflexis corolla nervoſa brevioribus. *Amer. arctic.*

Poſt n. 72. *affinis* R. Br. 158. R. caule erecto 1-2floro pubeſcente, foliis radicalibus petiolatis pedato-multifidis, caulinis ſubſeſſilibus digitatis, laciniis linearibus, fructibus recurvo-roſtratis. *Inſ. Melville.*

Poſt n. 73. 74. *angulatus* Presl. 159. R. caule ramoſo appreſſe piloſo, foliis radicalibus longe petiolatis cordato-ſubrotundis angulato-lobatis dentatis, caulinis 3partitis inciſo-dentatis, fructibus roſtratis glaberrimis. *Sicil.*

pag. 652.

R. *Villarſii* Cand. (R. inſularis Viv.)

pag. 653.

R. *geranioides* Humb. habitat et in *Java*. Blum. flor. jav. p. 2.

pag. 654.

R. *acris*. (R. ſiculus Presl.)

pag. 655.

R. *nepalenſis* Cand. (R. trilobatus Don.)

pag. 656.

Poſt n. 127. *ſeſſiliflorus* * 160. R. caule proſtrato hirſuto, foliis piloſis, radicalibus ſuborbiculatis, ſuperioribus 3partitis inciſis ciliatis, ſummis ſubtriangulari-

bus, floribus ſubſeſſilibus oppoſitifoliis oligandris, ſepalis petalisque ſubternis. *In paludibus ad fl. Platam.* (Caſalea ſeſſiliflora Hilar.)

pag. 657.

R. *Philonotis* Retz. (R. pratenſis Presl.)

pag. 658.

Ad *Trollium.*

Ledebourii Reichenb. 6. Tr. ſepalis 5 patentibus, nectariis 10-12 linearibus ſtamina ſuperantibus. *Sibir.* Reichenb. ic. t. 272.

pumilus Don. 7. Tr. ſepalis patentibus ſubrotundo-ovalibus, ſtaminibus nectaria 12 lineari-lingulata duplo ſuperantibus. *Emodi montes.*

pag. 659.

Ad *Caltham.*

Poſt n. 1. *Emodorum* * 14. C. caule aſcendente dichotomo, ramis 2floris, foliis longe petiolatis ſagittato-cordatis crenatis, angulis poſticis ſubtruncatis dentatis, fructibus longe roſtratis. *Emodi montes.* (C. himalenſis Don.)

arctica R. Br. 15. C. caule repente, foliis reniformibus repandis crenatis, fructibus imbricatis recurvo-roſtratis. *Inſ. Melville.*

pag. 660.

Poſt *Caltham:*

HYDRASTIS.

canadenſis *Amer. bor.* Herba e radice tuberoſa lutea, foliis binis ternisve petiolatis palmatis inciſo-ſerratis, flore ſolitario pedunculato rubeſcente, fructibus rubris Rubo ſimilibus. (Warneria canadenſis Mill.)

pag. 662.

Ad *Anemonem.*

A. *penſylvanica.* (A. borealis Richardſ.)

Hudſoniana Richardſ. 37. A. foliis villoſis, involucri ternatim decompoſitis breviter petiolatis, radicalibus multipartitis, laciniis palmatis linearibus, pedunculis binis, ſepalis 5-8 ovatis acutiuſculis. *Amer. bor.*

elongata Don. 38. A. foliis glabris, involucri binis baſi connatis 3lobis inciſo-dentatis, inferioribus 3partitis, laciniis cuneatis inciſo-lobatis, pedunculis ternis ſimplicibus 3fidisve piloſis, ſepalis 5 ovalibus, germinibus glabris roſtratis. *Nepal.*

obtuſiloba Don. 39. A. foliis villoſiſſimis, involucri ternis 3fidis, inferioribus cordatis 3lobis, lobis cuneatis inci-

ſo-crenatis, ſepalis obovatis, germinibus piloſis roſtratis. *Nepal.*

pag. 663.

Poſt n. 36. *polyanthes* Don. 40. A. foliis villoſiſſimis, radicalibus longe petiolatis cordatis 3partitis, lobis late cuneatis 3lobis inciſo-dentatis, involucro 3phyllo 3partito, laciniis 3fidis pinnatifidisve, pedunculis umbellatis, ſepalis obovatis, germinibus glabris. *Nepal.*

pag. 664.

Ad *Clematida.*

Cl. *nepalenſis* Cand. (Cl. montana Don.)

pag. 665.

Poſt n. 7. *ſmilacina* Blum. 80. Cl. foliis ovatis coriaceis glabris integerrimis 5nerviis. *Java.*

glandulosa Blum. 81. Cl. foliis ovatis glandulosо-dentatis glabris 5nerviis, pedunculis paniculatis 3fidis, floribus monoecis. *Java.*

Cl. *montana* Buchan. (Cl. anemonaeflora Don.)

pag. 667.

Poſt n. 36. *campeſtris* Hilar. 82. Cl. caule ſcandente 5gono foliisque ternato-pinnatis pubeſcentibus, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis axillaribus ſolitariis, terminalibus ſubternis, ſepalis patulis villoſis. *Braſil.*

pag. 669.

Poſt n. 64. *triloba* Hilar. 83. Cl. foliis ternatis glabris, foliolis 3fidis acuminatis, pedunculis 3fidis 2bracteatis. *Braſil.*

pag. 671.

Ad *Thalictrum.*

Poſt n. 15. † *javanicum* Blum. 53. Th. caule ſubtetragono ſtriato, foliolis orbiculatis glabris ſubtus glaucis 3fidis, panicula dichotoma corymboſa erecta. *Java.*

CLASSIS XIV.

pag. 675.

Poſt n. 2061. *Stenarrhena* Don. Cal. $\frac{1}{2}$. Cor. $\frac{1}{1}$, lab. ſup. galeato, labii infer. lobo medio maximo. Antherae longiſſimae 1loculares. Stigma 2fidum.

pag. 676.

Poſt n. 2078. *Perilla*. Cal. 5fidus, lacinia ſuprema breviſſima. Cor. $\frac{1}{3}$, lab. ſup. emarginato, lobis labii inf. ſubaequalibus. Filamenta diſtantia corolla breviora. Styli 2 connexi.

pag. 677.

Poſt n. 2089. *Pycnoſtachys* Hook. Cal. dentibus 5 ſpinuloſis, ſinubus involutis. Cor. lab. ſup. 4crenatum, infer. integrum cucullatum. Stam. declinata approximata.

Glechon *. Cal. tubuloſus 5-dentatus, ore villoſiſſimo. Cor. ringens, lab. ſup. fornicato, dentibus ad latera faucis: lab. infer. indiviſum.

pag. 678.

Poſt n. 2113. *Caſſelia* Nees. Cal. campanulatus 5fidus perſiſtens. Cor. infundibuliformis, limbo 5lobo. Antherae in fundo corollae, filamentis breviſſimis. Capſ. reticulata 2locularis 2ſperma, receptaculo ſeminum duplici ſeptiformi, altero margine libero.

pag. 679.

Poſt n. 2125. *Aſaphes* *. Cal. duplex involucratus, exter. campanulatus truncatus ore ſpinuloſus, interior tubuloſus, dentibus 3 ſpinuloſis. Cor. tubo curvato, limbo 4lobo. Stam. tubo inſerta. Antherae 2loculares. Stigma peltatum.

Ad n. 2140. *Hemiphragma* add. Wallich.

pag. 680.

Poſt n. 2149. inſeratur *Vrolikia* e ſyſt. 3. p. 149.

Poſt n. 2153. *Campyleia* Thuars. Cal. cylindricus angulatus 5dentatus. Cor. tubo incurvo, limbo ſub-2labiato 4lobo. Capſ. compreſſa ovalis ſtylo coronata 2valvis 2locularis polyſperma.

pag. 682.

Poſt n. 2189. *Sopubia* Hamilt. Cal. campanulatus 5dentatus. Cor. campanulata aequaliter 5loba. Stam. exſerta. Antherae 2partitae, loculis ſterilibus tubuloſis.

Stigma indivisum. Capſ. 2locularis 2valvis polyſperma. Diſſepimentum parallelum continuum.

Ad n. 2196. *Chelone.* Capſ. 2-(non 5-)locularis.

pag. 683.

n. 2204. *Sibthorpia*, hinc exul, in Cl. V. collocata eſt.

pag. 685.

n. 2235. *Didymocarpus* Jack., hinc exul, in Cl. II. collocatus eſt.

n. 2236. *Aeſchynanthus* Jack. femina habet utrinque comoſa, non ariſtata.

n. 2239. *Parentucellia* Viv. ad R. Brown. eſt Euphraſia.

Sinningia Nees. Cal. 5angularis, angulis alatis. Cor. 2labiata. Rudimentum filamenti quinti. Glandulae 5, cum filamentis alternae. Capſ. ſubcarnoſa 5angularis, placentis duabus 2fidis.

pag. 686.

Poſt n. 2251. *Abelia* R. Br. Involucrum 2-multiflorum. Cal. ſuperus foliaceus. Cor. infundibuliformis 5loba. Germen 3loculare, loculis 2 abortientibus.

n. 2254. *Melianthus* melius *Rutaceis* Juſſ. accenſendus.

---

pag. 687.

Ad *Lumnitzeram* Jacqu.

caeſia * 10. L. ramis glabriusculis teretibus, foliis ovatis dentato-crenatis, pedunculis ſubverticillatis baſi bracteatis. *Patria?*

carnoſa * 11. L. ramis glabriusculis 4gonis, foliis ovatis ſubcoriaceis dentato-crenatis, verticillis racemoſis nudis. *Monte Video.*

rubicunda * 12. L. caule fruticoſo, foliis longe petiolatis ovalibus ſerratis ramulisque tomentoſis, verticillis remotis paucifloris, bracteis minimis, tubo corollae calycem ſetaceo-dentatum ter ſuperante. *Nepal.* (Plectranthus rubicunda Don.)

virgata * 13. L. caule ſuffruticoſo, foliis elliptico-oblongis obtuſis dentatis utrinque piloſis, verticillis remotis paucifloris, dentibus calycis infer. inaequalibus mucronatis. *Nepal.* (Plectranthus virgata Don.)

pag. 688.

Ad *Ocimum.*

Poſt n. 11. *ſtamineum* Sims. 28. O. foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis incanis, verticillis ſub-6floris, ſtaminibus longe exſertis. *China.* Bot. mag. 2452.

Coetſa * 29. O. foliis ovatis acutis ſerratis piloſis ſubtus caneſcentibus, pedicellis oppoſitis 3fidis paucifloris ſpicato-racemoſis, calycibus piloſis. *Nepal.* (Plectranthus Don.)

ternifolium * 30. O. foliis ternis oblongo-lanceolatis acuminatis ferratis hirſutiſſimis ſubtus tomentoſis, ſpicis ternis verticillatis multifloris, calycibus corollisque lanatis. *Nepal.* (Plectranthus Don.) Pl. ternatus Sims. e *Madagaſcar* huc?

pag. 689.

Ad *Plectranthum.*

Pl. *mollis* *. (Pl. cordifolius Don.)

coloratus Don. 29. Pl. caule fruticoſo, ramis ſulcatis, foliis ellipticis acutis ferratis hiſpidis, verticillis multifloris contiguis ſpicatis, calycibus cylindricis fauce bimaculatis, bracteis ovatis coloratis. *Nepal.*

pag. 692.

Ad *Meliſſam.*

Poſt n. 4. *coccinea* * 6. M. foliis obovatis integerrimis glabris ſubtus punctatis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis, corollis clavatis pendulis. *Florida.* (Cunila coccinea Hook. exot. fl. t. 163.)

pag. 697.

Ad *Thymum.*

Poſt n. 35. *origanifolius* Don. 55. Th. caule erecto ramoſo villoſo, foliis ſubrotundo-ovatis acutis ferratis utrinque hirſutis, verticillis multifloris, floribus pedicellatis, dentibus calycis inaequalibus plumoſis. *Nepal.*

pag. 698.

Poſt n. 43. *megapotamicus* * 56. Th. caule erecto herbaceo, foliis linearibus convolutis aſpero-punctatis, pedunculis confertis folia ſubſuperantibus. *Rio grande.* Sello.

Poſt n. 44. *biflorus* Don. 57. Th. caule ſuffruticoſo filiformi decumbente piloſo, foliis elliptico-ovatis obtuſis integerrimis marginatis nervoſis ſubtus punctatis nudiusculis, pedunculis oppoſitis ſub-3floris, calycis cylindrici ſulcati dentibus ſetaceis. *Nepal.*

piperitus Don. 58. Th caule fruticoſo erecto ramoſo, foliis ovatis obtuſis ſubcrenulatis piloſiusculis, pedunculis oppoſitis 3floris, calycis dentibus ſubulatis. *Nepal.*

repens Don. 59. Th. caule repente 4gono, foliis cordatis crenatis nervoſis hirſutis, corymbis ſubſeſſilibus 5floris, dentibus calycis ſuperioribus ovatis obtuſis. *Nepal.* (Clinopodium repens Roxb.)

paroiflorus Requien. 60. Th. caule decumbente caeſpitoſo, foliis ſubrotundis glabris, pedunculis 3floris, corolla regulari. *Corſica.*

pag. 699.

Ad Th. *Calamintham.* Th. *glanduloſus* Requien. var.

61.

nepetoides Don. 61. Th. caule erecto foliisque cordato-ovatis obtusis crenatis villosis, pedunculis multifloris, bracteis subulatis, calycibus basi ventricosis. *Nepal.* (Glechoma erecta Roxb.)

pag. 700.

Ad *Gardoquiam* R. et P.

capitata * 13. G. capitulis ovatis longe pedunculatis, bracteis calycibusque spinosis pilosis, foliis fasciculatis lineari-oblongis margine revolutis integerrimis cauleque ramoso hispidis. *Rio grande.* Sello.

origanoides Reichenb. 14. G. capitulis pedunculatis bracteatis, foliis obovatis apice subdentatis venoso-lineatis pubescentibus. *Inf. Trinit.*

spicata * 15. G. spicis terminalibus villosis, foliis subfasciculatis spathulatis subintegerrimis asperis. *Rio grande.* Sello.

Post *Lepechiniam* W.:

STENARRHENA Don.

lanata Don. *Nepal.* Herba simplex villosissima, foliis subsessilibus lanceolatis acutis crenulatis rugosis subtus niveo-lanatis, verticillis distantibus, bracteis integerrimis, floribus rubris.

pag. 701.

Ad *Scutellariam.*

Post n. 1. *scordifolia* Fisch. 39. Sc. caule erecto simplici sursum pubescente, foliis cordato-ellipticis subcrenatis pubescentibus punctatis, floribus axillaribus oppositis solitariis. *Sibir.*

barbata Don. 40. Sc. caule erecto simplici foliisque ovato-oblongis obtusis inferioribus serratis glabris, floribus solitariis, corollis villosis. *Nepal.*

repens Hamilt. 41. Sc. caule suffruticoso decumbente ramosissimo, foliis cordatis acutis inciso-serratis hirsutis, floribus axillaribus solitariis secundis, corollis tomentosis. *Nepal.*

pag. 702.

Post n. 17. *scandens* Hamilt. 42. Sc. caule erecto volubili foliisque ovatis acuminatis serrato-crenatis glabris, racemis axillaribus secundis multifloris, bracteis cordatis integerrimis pedicellos superantibus. *Nepal.*

Post n. 19. *indica* 43. Sc. racemis spicatis terminalibus, bracteis linearibus, tubo corollae filiformi, foliis cordatis obtusis crenatis pubescentibus subtus purpureis, caule simplici. *China. Ind. or. Nepal.* (Scutellaria sinica Plukn. t. 441. f. 1., sed nequaquam Serratula amara Rumph., quae Gratiola amara Roxb.)

pag. 703.

Poſt n. 85. *Felisberti* Mart. 44. Sc. foliis cordato-ovatis dentatis ſupra piloſis ſubtus cauleque pubeſcentibus, racemis terminalibus trichotomis folioſis, labio corollae inferiori emarginato. *Braſil.*

Ad *Proſtantheram* Labill.

Poſt n. 1. *empetrifolia* Sieb. 13. Pr. foliis linearibus cuſpidatis revolutis glabris, ramulis villoſis, calycibus ciliatis. *Nov. Holl.*

pag. 705.

Ad *Ajugam.*

Poſt n. 7. *integrifolia* Don. 15. A. hirſutiſſima, caule erecto, foliis inferioribus ſpathulato-oblongis repando-crenatis in petiolum attenuatis, verticillis 10floris, laciniis calycis ovato-lanceolatis acutis. *Nepal.*

A. *decumbens* Thunb. provenit et in *Nepal.*

pag. 706.

Ante n. 18. *lobata* Don. 16. A. furculis reptantibus, foliis longe petiolatis cordatis obtuſis inciſo-lobatis, floribus verticillato-ſpicatis ſecundis, laciniis calycis lineari-lanceolatis acutis bractea brevioribus. *Nepal.*

Ad *Aniſomelem* R. Br.

A. *nepalenſis* * (Nepeta verſicolor Trevir.)

† *auſtralis* * 7. A. foliis 3fidis cauleque glabriusculis, cymis axillaribus paucifloris erectis, calycibus pubeſcentibus. *Nov. Holl.* (Teucrium auſtrale Sieb.)

pag. 710.

Ad *Teucrium.*

quadrifarium Hamilt. 80. T. hirſutiſſimum, foliis petiolatis cordato-ovatis acutis inaequaliter crenatis, ſpicis elongatis oppoſitis multifloris, bracteis ſtipitatis cordatis acuminatis integerrimis coloratis decuſſatis, caule ſtricto tomentoſo. *Nepal.*

laxum Don. 81. T. foliis petiolatis ovato-oblongis acuminatis ſerratis utrinque piloſiusculis, racemis ſpicatis ſecundis multifloris, bracteis calyce hiſpido brevioribus. *Nepal.*

pag. 712.

Weſtringia rosmariniformis Sm. (Cunila fruticoſa W.)

pag. 713.

Poſt *Leucoſceptrum* Sm.:

PERILLA.

elata Don. 1. P. fruticoſa, foliis ellipticis acutis crenatis ſupra ſcabris ſubtus ramulisque tomentoſis, ſpicis terminalibus paniculatis, calycibus tomentoſis. *Nepal.*

fruticoſa Don. 2. P. fruticoſa, foliis oblongis utrinque attenuatis ſerratis pubeſcentibus, ſpicis linearibus paniculatis decuſſatis, bracteolis minutis ſubulatis, calycis hiſpidi dentibus ſubulatis. *Nepal.*

leptoſtachya Don. 3. P. fruticoſa, foliis longe petiolatis ovatis utrinque attenuatis inciſo-ſerratis pubeſcentibus, ſpicis linearibus ſolitariis, bracteis ſubulatis calycem tomentoſum aequantibus. *Nepal.*

ocimoides 4. P. herbacea elata hirſuta, foliis ovatis acuminatis ſerratis, ſpicis ſecundis, bracteis ovatis acuminatis flore longioribus. *Ind. orient.* (Meliſſa maxima Arduin.)

polyſtachya Don. 5. P. herbacea glabra, foliis ovatis acuminatis ſerratis, ſpicis numeroſis, bracteis lanceolatis acuminatis flores ſubaequantibus, calycibus hiſpidis. *Nepal.*

pag. 716.

Ad *Origanum vulgare.* O. normale Don. var.

pag. 721.

Ad *Hyſſopum.*

Poſt n. 3. *lophanthoides* Don. 6. H. foliis ovatis acutis crenatis pubeſcentibus, pedunculis axillaribus capillaceis multifloris paniculatis folia ſuperantibus, dentibus calycis ovatis obtuſis. *Nepal.*

Poſt *Elsholtziam* W.:

PYCNOSTACHYS Hook.

coerulea Hook. *Madagaſcar.* Herba erecta glabra, caule 4gono, foliis lanceolatis ſubſerratis, ſpicis denſis, floribus coeruleis. Hook. exot. fl. t. 202.

GLECHON *.

thymoides * *Rio grande Amer. auſtr.* Suffrutex erectus, foliis obovatis obtuſe dentatis venoſis glabriusculis, floribus axillaribus ſubſeſſilibus ſubſolitariis.

pag. 722.

Ad *Mentham.*

A M. *ſtellata* Lour. M. *verticillata* Roxb. Don. haud differre videtur.

Poſt n. 4. *blanda* Wallich. 36. M. ſpicis cylindricis gracilibus, calycibus pubeſcentibus corollam aequantibus, ſtaminibus incluſis nudis, foliis petiolatis rhombeo-ovatis groſſe dentatis ſubtus punctatis glabris. *Nepal.* Cand. ic. hort. genev. t. 8.

pag. 723.

macroſtachya Tenor. 37. M. verticillis ſpicatis continuis elongatis, calycibus glabriusculis, ſtaminibus corollam aequantibus, ſtylo exſerto, foliis ſeſſilibus ſubcordato-ovatis dentatis rugoſis villoſiusculis. *Neapol.* Ergo removeatur e ſyn. M. rotundifoliae.

† *origanoides* Tenor. 38. M. floribus capitato-ſpicatis, bracteis confertis ovatis integerrimis, ſtaminibus corolla longioribus, foliis ſubcordato-ovatis obtuſis ſerratis, caule hirto. *Neapol.*

urticaefolia Tenor. 39. M. floribus verticillato-ſpicatis, infimis ſubcapitatis pedunculatis, bracteis cuſpidatis inciſo-dentatis, ſtaminibus corolla brevioribus, foliis ovato-ellipticis conduplicatis divergenti-dentatis hirſutis, caule hirto. *Neapol.*

pag. 725.

Ad *Galeopſin Tetrahit* var. G. *bifida* Bönninghauſ. fl. monaſter. p. 178., lacinia media labii inf. bifida poſtice lineis duabus aureis notata.

pag. 726.

Ad *Lamium.*

L. *rugoſum* Ait., lobo medio lab. inf. corollae obcordato variegato. *Europ. med. et auſtr.* Reichenb. ic. t. 217. (L. maculatum Sm. engl. bot. 2550. Hornem. fl. dan. 1649. fl. hal., L. longiflorum Tenor.?)

maculatum, foliis cordatis acutis inaequaliter dentatis medio albo-vittatis cauleque piloſiusculis, verticillis 6-10floris, lobo medio labii infer. obovato inciſo-crenato. *Italia.* Reichenb. ic. t. 215.

flexuoſum Tenor. 20. L. foliis cordato-ovatis acutis groſſe inaequaliter dentatis piloſiusculis, caule flexuoſo elato deorſum piloſo, verticillis ſub-10floris, calycibus ariſtatis tubum corollae aequantibus, lobo medio lab. inf. replicato. *In ſepibus Italiae, Saxoniae et Palatinatus.* Tenore. Zeyher. Ergo removeatur e ſyn. L. maculati. L. laevigatum Reichenb. ic. t. 216. huc potius pertinet, cum verum L. laevigatum L. et glabros habeat caulem calycesque et hos multo breviores tubo corollae et dentes corollae latiores lanceolatos nec ſetaceos, lobum medium denique labii infer. patentem nec latere replicatum. A b. Aitonio accepta exemplaria magnopere differunt et ſtatura minore.

pag. 727.

Ad *Lamium amplexicaule* L. L. intermedium et moluccellaefolium Fries. varr.

pag. 731.

Ad *Hyptin atrorubentem* Poit. H. racemosa Zuccagn. Bertolon. negli opusc. scient. di Bologn. 4. p. 333.

pag. 734.

Ad *Stachya.*

St. *hirta.* (St. divaricata Viv. append. ad fl. corf.)

Post n. 24. *marrubiifolia* Viv. 54. St. hirta, caule brachiato, foliis cordatis subrotundis crenatis, floralibus ovato-ellipticis apice spinulosis, verticillis laxis 6floris, corollae galea loboque labii infer. medio emarginato. *Corsica.*

pag. 738.

Ad *Ballotam.*

cinerea Don. 3. B. foliis ovatis obtuse serratis subtus cauleque cinereo-tomentosis, pedunculis axillaribus oppositis 3-6floris, laciniis calycis foliaceis spathulatis corolla longioribus. *Nepal.*

pag. 739.

Ad *Betonicam.*

Post n. 7. *laevigata* Don. 10. B. spica oblonga, floribus confertis incurvis, dentibus calycis longissimis aristatis, foliis cordato-ovatis serratis cauleque glabris. *Nepal.*

Ad *Marrubium.*

M. *leonuroides* Desr. potius ad M. *astracanicum* Jacqu., quam ad M. *catariaefolium* Desr.

M. *peregrinum* melius sic: M. caule ramosissimo, ramis patentibus, foliis oblongis basi attenuatis dentatis rugoso-venosis sericeo-tomentosis, bracteis dentibusque calycis subulatis divergentibus. M. creticum Mill., paniculatum Desr. et remotum Kit. e synonymis reiicienda.

creticum Mill. 17. M. caule ramosissimo, ramis divaricatis, foliis oblongo-lanceolatis rugoso-venosis albo-tomentosis, dentibus calycis rectis, duobus minoribus. *Creta. Austria. Ager halensis.* (M. peregrinum Jacqu.) Reichenb. ic. t. 288.

pag. 740.

Post n. 8. *paniculatum* Desr. 18. M. caule ramoso, foliis oblongis dentatis canescentibus, dentibus calycis subdenis erectis. *German. Hungar.* (M. remotum Kit.) Reichenb. ic. t. 300.

† *molliſſimum* Don. 19. M. caule ramoſo, foliis ovalibus obtuſis crenatis utrinque ſericeo-lanatis, dentibus denis breviſſimis, alternis minoribus, galea corollae villoſiſſima, genitalibus exſertis. *Nepal.*

pag. 741.

Ad *Phlomida.*

Poſt n. 9. *Bruguierii* Desf. 24. Phl. ſuffruticoſa tomentoſa, foliis ovato-oblongis ſubcrenatis, verticillis contiguis, bracteis laciniisque calycis elongatis denſe tomentoſis. *Perſia.*

pag. 742.

Ad *Leucadam* R. Br.

Poſt n. 2. *helianthemifolia* Desf. 18. L. foliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis integerrimis ſubtus revolutis tomentoſis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.* Mém. du muſ. 11. t. 1.

pag. 743.

Ad L. *cephaloten* * (L. capitata Desf.)

Poſt n. 11. *lamiifolia* Desf. 19. L. caule rufo-villoſo, foliis breviter petiolatis cordato-ovatis crenatis ſupra rufo-ſericeis ſubtus ſtellato-villoſis, verticillis terminalibus, dentibus calycis ſubulatis elongatis. *Ind. or.*

† *marrubioides* Desf. 20. L. foliis ovato-oblongis crenatis cauleque pubeſcentibus, verticillis multifloris, bracteis linearibus. *Ceilon.*

lanceaefolia Desf. 21. L. foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis venoſis ſubtus canеſcentibus, verticillis denſifloris, dentibus calycis abbreviatis. *Ind. or.*

ternifolia Desf. 22. L. foliis ternis ſubſeſſilibus lanceolatis integerrimis ſubtus tomentoſis, verticillis approximatis terminalibus. *Ind. or.*

pag. 744.

Ad L. *biſloram* R. Br. L. *procumbens* Desf. e *Bengal.*

pag. 748.

Ad *Verbenam.*

Poſt n. 13. *Pſeudo-Geroūū* Hilar. 46. V. caule ſuffruticoſo, foliis ovato-oblongis acuminatis ſerratis glabris, ſpica ſolitaria laxa, bracteis calyce brevioribus. *Braſil.* Hilar. fl. braſil. t. 40.

rigida * 47. V. caule herbaceo ſimplici, foliis ſubſeſſilibus oblongo-lanceolatis groſſe dentatis rigidis aſperis, cymis terminalibus compoſitis, laciniis calycis ſetaceis elongatis. *Rio grande.* Sello.

megapotamica * 48. V. caule herbaceo erecto pubeſcente, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis ſerratis baſi cuneatis glabriuſculis, capitulis terminalibus, brac-

teis minutis ciliatis, calyce elongato glabro. *Rio grande.* Sello.

pag. 751.

Ad *Lippiam.*

L. *montevidenſis* * (Lantana Selloi Link. et Ott. ic. hort. berol. t. 50.)

pag. 752.

Poſt n. 17. *megapotamica* * 27. L. capitulis hemiſphaericis terminalibus, bracteis late ovatis integerrimis, foliis ovatis ſerratis ſubtus ad venas piloſiusculis, caule erecto herbaceo. *Rio grande.* Sello.

Echinus * 28. L. capitulis globoſis longe pedunculatis, pedunculis hirſutis 2ſpinoſis, bracteis ſetaceis, calycibus multiſetis, foliis ovato-oblongis dentatis cauleque procumbente hirſutiſſimis. *Braſil.* (Zapania Echinus Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 5.)

pag. 754.

Poſt *Hebenſtreitiam:*

CASSELIA Nees.

ſerrata Nees. 1. C. caule fruticoſo erecto ramoſo, foliis oblongis groſſe ferratis. *Braſil.* Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

integrifolia Nees. 2. C. caule herbaceo ſimpliciusculo, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis. *Braſil.* Mart. nov. act. nat. 11. t. 6.

Ad *Tamoneam muticam* Perſ. (T. ſpicata Aubl., Leptocarpus chamaedryfolius Link.)

pag. 758.

Ad *Clerodendron.*

Poſt n. 9. *macrophyllum* Sims. 35. Cl. foliis oppoſitis ſubſeſſilibus late ovatis acuminatis ſerratis ſubtus tomentoſis, floribus paniculatis. *Inſ. Maſcaren.* Bot. mag. 2536.

pag. 760.

Poſt n. 30. *lividum* Lindl. 36. Cl. foliis oblongis repando-crenatis utrinque lividis, coſta ſubtus petiolisque hirſutis, cymis pedunculatis axillaribus, calycibus pentagonis inflatis coloratis. *China.* Bot. reg. 945.

pag. 761.

Ad *Petream oblongam* * (P. racemoſa Mart. in nov. act. cur. 11. p. 72.)

Poſt *Petream*:

ASAPHES *.

nepalenſis * *Nepal.* Herba erecta villoſa, foliis oppoſitis oblongis obtuſis integerrimis baſi vaginantibus, floribus verticillatis rubris. (Morina perſica Don.)

pag. 769.

Ad *Linderniam*.

† *micrantha* Don. 8, L. caule erecto ſimplici glabro, foliis linearibus obtuſis integerrimis, pedunculis capillaribus 1floris. *Nepal.*

pag. 771.

Ad *Conobeam* Aubl.

punctata Mart. 5. C. caule baſi radicante aſcendente, foliis ovatis acutis ſerratis punctatis ſupra ſcabris, floribus axillaribus geminis breviſſime pedunculatis. *Braſil.*

Ad *Rhinanthum orientalem*. (Rh. biſidus Don.) *Nepal.*

pag. 772.

Alectorolophus hirſutus Allion. differt omnino calycibus hirſutis, maxime vero feminibus ſolidis haud marginatis.

pag. 773.

Poſt *Bartſiam*:

CAMPYLEIA Thuars.

coccinea Hook. *Inſ. Maſcaren.* Herba paraſitica ſcabra ſimplex, foliis linearibus rigidis, floribus axillaribus ſeſſilibus coccineis. Hook. exot. fl. t. 203.

pag. 774.

Caſtilleia pallida * dilabitur in duas ſpecies:

ſeptentrionalis Lindl. C. glabra, foliis lineari-lanceolatis integerrimis 3nerviis, ſpica paniculata, calyce piloſo. *Labrador.* (Bartſia pallida Mx.)

ſibirica Lindl. C. tomentoſa, foliis radicalibus linearibus acuminatis, ſuperioribus ovato-lanceolatis 3nerviis, ſpica ſimplici, calyce villoſo. *Sibir.* (Bartſia pallida L.) Cf. Bot. reg. 925.

pag. 776.

Ad *Euphraſiam*.

Poſt n. 20, *ſimplex* Don. 32. E. caule ſtricto ſimplici, foliis petiolatis ſcabris, calycibus acutis piloſis, labio infer. corollae maximo. *Nepal.*

pag. 777.

Ad *Pedicularem.*

P. *longiflora* Rudolph. (P. tubiflora Fiſch. Stev., ſiphonantha Don.) Habitat in *Imao* et *Emodis.*

teucriifolia M. B. Stev. 58. P. galea falcata acuminata corollam claudente, calyce inaequaliter bifido, floribus congeſtis longe bracteatis, foliis oblongis duplicato-ſerratis utrinque tomentoſis. *Inſ. Curil.* Mém. de Moſc. 6. t. 10. f. 1.

pag. 778.

Poſt n. 5. *brevifolia* Don. 59. P. galea porrecta roſtrata emarginata labium inferius longe ſuperante, calyce inaequaliter 5fido ſerrato, floribus verticillato-ſpicatis, foliis oppoſitis vel quaternis pinnatifidis cauleque villoſis. *Emodi montes.*

Poſt n. 9. *proboſcidea* Stev. 60. P. galea ovata acuminata margine villoſa, calyce campanulato 2labiato 5dentato, ſpica elongata, foliis pinnatifidis argute ſerratis. *Sibir.*

macrantha * 61. P. galea falcata acuta ſubhorizontali labium inferius aequante, calycibus obtuſis bracteatis, floribus remotiusculis, foliis 3pinnatifidis glabris. *Davuria.* (P. grandiflora Fiſch. Stev.)

P. *compacta* W. calycem potius habet 5dentatum ſubinflatum (haud obtuſum).

P. *Romanzovii* Chamiſſ. galeam potius habet porrectam quam abbreviatam, folia quaterna. Habitat et in *inſul. Aleut.* (P. Chamiſſonis Stev. mém. de Moſc. 6. t. 4.)

Poſt n. 13. *naſuta* M. B. Stev. 62. P. galea arcuata breviſſime roſtrata emarginato-2dentata, calyce pubeſcente 5fido, floribus congeſto-ſpicatis, foliis 2pinnatifidis, caule ſubaphyllo. *Inſ. Curil.*

pag. 779.

Ad P. *euphraſioidem* Steph. pertinere P. *ramoſam* Wormſk. Stev. mém. de Moſc. 6. p. 42.

adunca M. B. Stev. 63. P. galea falcata obtuſiuscula baſi 2dentata hiante, calyce foliaceo ſerrulato, floribus terminalibus congeſtis, foliis alternis 2pinnatifidis. *Sibir. Camſchatca.* Mém. de Moſc. 6. t. 5. f. 2.

macrodon Richardſ. 64. P. galea obtuſiſſima ad faucem 2dentata, calyce 2lobo dentato, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis pinnatifidis crenulatis. *Ad ſinum Hudſon.*

Poſt n. 26. *Wlaſſoviana* Stev. 65. P. galea obtuſiſſima intra medium ſubbidentata, calyce ſubſerrato, floribus ſolitariis axillaribus bracteatis, foliis alternis pinnatifidis. *Sibir.* Mém. de Moſc. 6. t. 9.

pag. 780.

P. *alopecuroides* Adam., haud Stev. (P. Langsdorffii Stev. mém. de Moſc. 6. t. 9. f. 2.) Male galea dicitur edentula, ipſo pictore dentes delineante.

Ad P. *comosam* pertinere P. rubentem Steph., achillacifoliam Ej. et fasciculatam Bellard. Steven.

In charactere P. *caucasicae* M. B. deleatur (calycibus) *subulatis.*

pag. 781.

Post n. 45. *amoena* Adam. 66. P. galea recta obtusa lobis labii infer. breviore, calyce 5fido, verticillis pauciforis remotis, foliis quaternis pinnatifidis, laciniis distantibus linearibus serratis. *Sibir. Camtschatca.* Mém. de Mosc. 6. t. 7.

pag. 788.

Digitalis micrantha Roth. ad *sinum neapolitanum* lecta, D. *australis* nomine a Tenorio missa.

pag. 797.

Linaria aphylla * del. quae *Utricularia capensis*, v. supra p. 16.

pag. 799.

Mimulus pilosiusculus Kunth. (M. parviflorus Lindl. in bot. reg. 874.) *Chili.*

pag. 800.

Ad *Toreniam.*

diffusa Don. 6. T. caule diffuso pilosiusculo, foliis ovatis acutis serratis asperis, floribus terminalibus solitariis breviter pedunculatis, calyce spathaceo 3fido 5alato. *Nepal.*

Ad *Vandelliam.*

nummularifolia Don. 3. V. caule simplicissimo 4gono, foliis sessilibus cordato-subrotundis serratis, pedunculis folio brevioribus, laciniis calycis linearibus acutis. *Nepal.*

pag. 801.

Ad *Herpestim* Gärtn.

connata * 17. H. caule erecto ramoso foliisque connatis ovatis crenulatis nervosis glabris, floribus alternis sessilibus 3bracteatis. *Nepal.* (Cybbanthera connata Hamilt. Don.)

pag. 802.

Post n. 10. *glechomoides* * 18. H. caule herbaceo ascendente, foliis obovatis crenatis glabriusculis, pedunculis axillaribus oppositis, calycibus pilosissimis. *Itio grande.* Sello.

pag. 803.

Ad *Mazum* Lour.

furculosus Don. 3. M. acaulis hirsutus, furculis procumbentibus, foliis longe petiolatis cuneatis dentatis basi sinuatis pilosis, racemis radicalibus pilosis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal.*

pag. 804.

Ad *Centrantheram* R. Br.

C. *nepalenſis* Don. eadem cum C. *hiſpida* R. Br.

Ad *Büchneram*.

Poſt n. 3. *hiſpida* Hamilt. 33. B. ſimpliciſſima hiſpida, foliis radicalibus ſpathulatis integerrimis 3nerviis, caulinis lanceolatis obtuſis, floribus alternis, bracteis acuminatis calycem ſubaequantibus. *Nepal.*

cruciata Hamilt. 34. B. ſimplex ſcabra, foliis radicalibus obovatis dentatis 3nerviis, caulinis lineari-lanceolatis integerrimis, ſpica abbreviata 4fariam imbricata, bracteis lanceolatis calycem aequantibus. *Nepal.*

anguſtifolia Don. 35. B. ſimplex ſcabra, foliis linearibus integerrimis, inferioribus oppoſitis, floribus alternis remotis, bracteis flores ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 810.

Poſt *Seymeriam* Purſh.:

SORUBIA Hamilt.

triſida Hamilt. *Nepal.* Herba aſpera, foliis oppoſitis linearibus anguſtiſſimis ſub-3fidis, floribus pedunculatis purpureis.

Ad *Angeloniam* Humb.

A *ſalicariaefolia* Humb. (A. campeſtris Nees.) *Braſil.*

procumbens Mart. 2. A. foliis elliptico-lanceolatis argute ſerratis baſi ciliatis, pedunculis axillaribus folio brevioribus, caule procumbente. *Braſil.* (Phyſidium procumbens Schrad., Schelveria arguta Nees.)

integerrima * 3. A. foliis ſparſis lanceolatis integerrimis, pedunculis racemoſis, caule erecto. *Rio grande.* Sello.

Ad *Stemodiam*.

Poſt n. 2. *muraria* Roxb. Don. 14. St. hirſutiſſima, foliis petiolatis ovatis acutis ſerratis, pedunculis ſolitariis, laciniis calycis ovatis mucronatis, corolla villoſa. *Nepal.*

grandiflora Hamilt. Don. 15. St. hirſutiſſima viſcoſa, foliis petiolatis ovatis acutis groſſe ſerratis, floribus oppoſitis breviter pedunculatis, bracteis maximis ovatis crenatis, laciniis calycis rotundatis. *Nepal.*

pag. 813.

Ad *Cheloncm*.

Poſt n. 10. *alpina* * 17. Ch. glaberrima, foliis oblongo-lanceolatis denticulatis, pedunculis multifloris, corolla ſubregulari, antheris hirſutis. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.* (Pentſtemon Torr.)

Poſt n. 13. *Digitalis* * 18. Ch. caule elato ſtricto, foliis amplexicaulibus lanceolatis acutis ſerratis glabris, panicula terminali trichotoma multiflora, corolla glanduloſo-pubeſcente. *Ditio Arcanſa Amer. bor.* (Pentſtemon Nuttall. Bot. mag. 2587.)

pag. 814.

Ad *Caprariam.*

Poſt n. 5. *puſilla* Torr. 7. C. pubeſcens ſubramoſa, foliis oppoſitis petiolatis cordatis repando-dentatis, pedunculis axillaribus elongatis 1floris. *Montes ſcopuloſi Amer. bor.*

pag. 815.

Sibthorpia hinc exul, jam ſupra p. 63. melius collocata.

pag. 821.

Ad *Ruelliam.*

Poſt n. 18. *surviflora* Nees. 81. R. caule fruticoſo glabro, foliis petiolatis lanceolatis acutis venoſo-lineatis integerrimis, pedunculis terminalibus elongatis ſub-1floris, laciniis calycis linearibus ciliatis, corolla ringente. *Braſil.*

pag. 823.

Poſt n. 48. *aniſophylla* Wallich. 82. R. caule erecto herbaceo, foliis alternis oblongo-lanceolatis acuminatis elongatis ſerratis, ſtipulis oppoſitifoliis linearibus integerrimis ſtipitatis, pedunculis ſub-3floris. *Nepal.* Hook. exot. fl. t. 191.

pag. 824.

Poſt n. 52. *perſicifolia* Lindl. 83. R. caule herbaceo glabro nodoſo, foliis lanceolatis acuminatis elongatis ſerratis venoſis laevibus, pedunculis baſilaribus corymbiferis erectis, corollae limbo 5lobo. *Bengal.* Bot. reg. 955.

Poſt n. 60. *capitata* Don. 84. R. caule fruticoſo ramoſo, foliis lanceolatis acuminatis denticulatis utrinque piloſiusculis, ſpicis capitatis, bracteis calycibusque obtuſis. *Nepal.*

pag. 825.

Poſt n. 70. *rotundifolia* Don. 85. R. caule erecto ramoſo pubeſcente, foliis ſubrotundo-ovatis acutiusculis crenatis, ſpica abbreviata, bracteis acuminatis, intermediis latiſſimis flore brevioribus. *Nepal.*

pag. 826.

Ad *Aphelandram* R. Br.

A. *nitida* Nees. nov. act. nat. cur. 11. p. 51. varietas levis A. *criſtatae.*

marginata Nees. 2. A. fruticoſa glabra, foliis oblongis retuſis margine cartilagineo-ciliatis, ſpica terminali, bracteis ovato-lanceolatis calyce brevioribus corollaque pubeſcentibus. *Braſil.*

Ad *Actheilema* R. Br.

longifolium * 4. Ae. caule erecto, foliis oblongis acuminatis integerrimis reflexis, ſpicis axillaribus abbreviatis. *Senegambia.* (Phaylopſis longifolia Bot. mag. 2438.)

pag. 827.

Ad *Lepidagathin* W.

incurva Hamilt. 3. L. caule herbaceo erecto follisque integerrimis acutis aſperis, inferioribus ovato-oblongis, ſuperioribus lanceolatis elongatis, ſpicis terminalibus ſubquaternis denſis ſecundis, bracteis ovato-lanceolatis mucronatis villoſiſſimis, corollis incurvis. *Nepal.*

pag. 828.

Ad *Hygrophilam* R. Br.

braſilienſis * 4. H. fruticoſa hirſuta, foliis oblongis integerrimis, altero minori, ſpicis terminalibus ſecundis villoſis, bracteis dorſalibus ovatis cuſpidatis trinerviis. *Braſil.* (Dicliptera tetrandra Nees.)

Ad *Thunbergiam.*

coccinea Wallich. 4. Th. volubilis glabra, foliis ſubhaſtato-cordatis acuminatis 5nerviis, inferioribus repandis, racemis pendulis, bracteis integerrimis caducis. *Bengal.* Hook. exot. fl. t. 195.

alata Hook. 5. Th. volubilis villoſo-ſericea, foliis ſagittato-cordatis repandis, petiolis marginatis, pedunculis 1floris, bracteis calyce majoribus. *Afric. or.* 5-6° lat. auſtr. Hook. exot. fl. t. 177.

angulata Hook. 6. Th. ſcandens glabra, foliis ſubhaſtato-cordatis baſi angulatis, petiolis teretibus, pedunculis 1floris, bracteis ciliatis. *Madagaſcar.* Hook. exot. fl. t. 166.

pag. 829.

Ad *Bignoniam.*

Poſt n. 3. *pallida* Lindl. 70. B. arboreſcens, foliis oppoſitis ovali-oblongis utrinque rotundatis glabris ſubtus reticulatis, pedunculis axillaribus ſolitariis erectis ſubbifloris lepidotis. *Inſ. Carib.* Bot. reg. 965.

pag. 832.

Poſt n. 51. *megapotamica* * 71. B. foliis quinatis glabris, foliolis petiolatis obovato-oblongis integerrimis, pedunculis 2fidis axillaribus cymoſis, calycibus 5dentatis, corolla pubeſcente. *Rio grande.* Sello.

pag. 835.

Ad *Spathodeam* P. B.

Poſt n. 5. *montana* * 14. Sp. arboreſcens, foliis quinato-digitatis lanceolatis ſubtus ramisque 4gonis lepidotis, panicula terminali fulvo-farinacea. *Braſil.* (Zeyheria montana Mart. nov. gen. t. 159.)

pag. 836.

Ad *Eccremocarpum ſcabrum* R. et P. Bot. reg. 939.
Incarvillea paraſitica Roxb. eſt Aeſchynanthus Jack.

pag. 837.

Ad *Martyniam.*

lutea Lindl. 6. M. caule annuo tereti glanduloſo-piloſo, foliis cordato-orbiculatis dentatis, calyce 2bracteato, fructibus longe roſtratis. *Braſil.* Bot. reg. 934.

ſpathacea * 7. M. caule perenni herbaceo viſcoſo-villoſo, foliis cordato-deltoideis acutiusculis angulato-dentatis, floribus racemoſis, calyce 1bracteato infra fiſſo campanulato. *Braſil.* (Craniolaria 1bracteata Nees et Mart. in nov. act. nat. cur. 11. t. 4. Holoregmia viſcida Nees.)

Didymocarpus Jack., exul, jam ſupra p. 13. 14. ſub *Henckelia* * militat.

pag. 838.

Ad *Aeſchynanthum* Jack.

grandiflorus * 3. Ae. caule fruticoſo, foliis lanceolatis carnoſis enerviis, umbella multiflora, ſtylo exſerto. *Ad arbores, Bengal.* (Incarvillea parafitica Roxb., Trichoſporum grandiflorum Don.)

parviflorus * 4. Ae. caule fruticoſo, foliis ellipticis acuminatis nervoſis, umbella pauciflora, ſtylo incluſo. *Ad truncos arborum, Nepal.* (Trichoſporum parviflorum Don.)

pag. 839.

Ad *Gesneram.*

Poſt n. 18. *barbata* Mart. 27. G. herbacea, foliis oppoſitis oblongis acuminatis petiolatis ſubcrenatis ſubtus ſcabris, pedunculis ſubſolitariis, corolla extus villoſa. *Braſil.*

pag. 840.

Ad *Besleriam.*

Poſt n. 6. *flavo-virens* Mart. 20. B. fruticoſa, foliis oppoſitis oblongis utrinque attenuatis denticulatis glabris, pedunculis axillaribus confertis bifido-cymoſis. *Braſil.*

pag. 841.

Parentucelliam floribundam Viv. libyc. t. 21. f. 2. eſſe Bartſiam latifoliam Sm. p. 773. aſſeverant R. Brownius et Meratus. (Bulletin des ſcienc. nat. 1825. Febr. p. 225.)

SINNINGIA Nees.

Helleri Nees. *Braſil.* Planta ſuffruticoſa, foliis petiolatis oppoſitis cordato-ovatis ſerratis pubeſcentibus, floribus racemoſis viridi-flavicantibus. Annal. des ſcienc. nat. 6. p. 297., Gloxinia Schottii Mikan. del. braſil. faſc. 4.)

pag. 843.

Poſt *Linnaeam:*

ABELIA R. Br.

chinenſis R. Br. *China.* Frutex decumbens, ramis virgatis, foliis oppoſitis petiolatis ovatis acutiusculis crenato-ſerratis, floribus thyrſoideis involucratis. Abel's journ. in China, p. 377.

pag. 844.

Ad *Gloxiniam* Herit.

macrophylla Mart. 3. Gl. ſubacaulis, foliis ſeſſilibus cordato-oblongis obtuſis crenatis utrinque hirſutis, calycibus acutis, limbi corollae lobis retuſis. *Braſil.* (Gl. hirſuta Lindl. in bot. reg. 1004.)

CLASSIS XV.

pag. 848.

Ad *Eutrema* R. Br. add. Septum apice feneſtratum vel obſoletum.

Poſt id: *Oreas* Chamiſſ. Silicula lanceolata compreſſa plana 1locularis. Semina plura funiculis elongatis pendula. Cotyledones incumbentes.

Ad *Brayam* Sternb. Cotyledones incumbentes R. Br. Hook.

Poſt eam: *Platypetalum* R. Br. Silicula ovalis polyſperma, valvis convexis. Cotyledones incumbentes. Stylus breviſſimus. Calyx ſubpatens. Petalorum laminae dilatatae.

Poſt n. 2313. *Oudneya* R. Br. Cal. clauſus baſi ſaccatus. Stigmata connata, apicibus diſtinctis. Siliqua linearis roſtrata, valvis inerviis. Semina 1ſeriata.

---

pag. 855.

Ad *Raphanum Raphaniſtrum.* R. fugax Presl. var.

albiflorus Presl. 8. R. ſiliquis 1locularibus 1-3ſpermis ſtylo brevioribus, foliis ſimpliciter lyratis, radice bienni. *Sicil.*

pag. 858.

Ad *Biſcutellam raphanifoliam* Poir. B. laxiflora Presl.

pag. 862.

Ad *Alyſſum maritimum* Lam. (Lobularia Desv., Koniga R. Br. in Denham. et Clappert. it. p. 214.)

†*arenarium* Presl. 43. A. caule ſuffruticoſo procumbente, foliis linear-lanceolatis acutis ſubincanis, ſiliculis ellipticis ſubinflatis piloſiusculis 1-ſpermis ſtylo brevi mucronatis. *Sicil.*

pag. 863.

Ad *Hutchinſiam rotundifoliam* R. Br. (H. pygmaea Viv.)

pag. 864.

Ad *Iberim ſemperflorentem.* (I. humilis Presl.)

pag. 865.

Ad *Iberim linifoliam.* (I. tennifolia Presl.)

pag. 866.

Ad *Lepidium ſuffruticoſum.* (L. lanceolatum Presl.)

pag. 867.

Ad *Lepidium hirtum* Hook. (Lepia Bonanniana Presl.)

pag. 868.

Ad *Lepidium Piſcidium* Forſt. (L. owaihienſe Chamiſſ.)

pag. 869.

Poſt n. 48. *humifuſum* Requien. 51. L. caule proſtrato ſuperne pubeſcente, foliis inferioribus lyratis, ſuperioribus ſagittatis integerrimis, petalis calycem triplo ſuperantibus, ſiliculis glabris. *Corſica.*

pag. 871.

Ad *Farſetiam parviflorum* * (Cotyledones conduplicatae. R. Brown ad Denham. it. p. 213.) Cf. Linn. philoſ. bot. §. 170.

Ad *Farſetiam libycam* * (Koniga R. Brown ad Denham. it. p. 214.)

pag. 872.

Ad *Drabam.*

Poſt n. 5. *Sauteri* Hopp. 56. Dr. foliis ſpathulatis rigidis ciliatis, ſcapo glabro, ſtaminibus corolla brevioribus, ſiliculis ovalibus glabris ſtylo brevi coronatis. *Alp. noric.*

pag. 874.

Ad Dr. *Wahlenbergii* Hartm. Dr. laevigata Hopp. Koch. var.

Dr. *ſtellata* Jacqu. mutetur in Dr. *frigidam* Sant. Synonyma omnia deleantur: ſola appoſita Dr. *carinthiaca* Hopp. Koch. Siliculae ſunt aſtylae. Omnis haec ſpecies varietas eſt Dr. *hirtae* L., quod optime jam monuit Wahlenb. fl. lappon. p. 175.

auſtriaca Crantz. 57. Dr. foliis obovatis 2dentatis ſtellato-pubeſcentibus, ſcapo 1phyllo, ſiliculis patulis glabris ſtylo coronatis. *Auſtria.* (Dr. ſtellata et hirta Jacqu., ſaxatilis Koch.)

[Nec Drabam laevigatam, nec Redowskiam ſophiaefoliam Chamiſſ. et Schlechtend. in Linnaea, 1. p. 25. 33., utpote magnopere dubias, recipere auſim.]

pag. 878.

Ad *Thlaſpi montanum* L. Thl. ſcapiflorum Viv. var.

Ad Thl. *alpeſtre* L. (Thl. rivale Presl.)

pag.

pag. 880.

Poſt *Eutrema* R. Br.:

OREAS Chamiſſ.

involucrata Chamiſſ. *Inſ. Aleut.* Herba perennis, foliis longe petiolatis erectis ſpathulatis glabris, ſcapo folia ſubſuperante, floribus ſubracemoſis bracteatis albis.

pag. 881.

Poſt *Brayam:*

PLATYPETALUM R. Br.

purpuraſcens R. Br. *Inſ. Melvill.* Herba ſimplex, foliis ſpathulatis ſuculentis glabriusculis, floribus corymboſis purpuraſcentibus.

Ad *Naſturtium* R. Br.

heterophyllum Don. 28. N. caule erecto ramoſo foliisque denticulatis glabris, inferioribus lyratis, ſuperioribus ellipticis, corymbis multifloris, ſiliquis teretibus pedicellos ſuperantibus. *Nepal.*

pag. 882.

Ad N. *diffuſum* Cand. (N. heterophyllum Blum.)
Ad N. *micranthum* Cand. (N. ſparſum Don.)

pag. 884.

Ad *Pteroneuron* Cand.

Pt. *carnoſum* Cand. cum *Cardamine glauca* * Syſt. 2. p. 888. jungit Treviranus in nov. act. nat. cur. 18. p. 191.

decurrens Blum. 3. Pt. foliis pinnatis, foliolis ovatis repando-dentatis ſubciliatis baſi decurrentibus. *Java.*

javanicum Blum. 4. Pt. foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis inciſo-dentatis, lateralibus baſi inaequalibus. *Java.*

pag. 886.

Ad *Cardaminem.*

C. *reſedaefolia* L. (C. debilis Don.) *Nepal.*

Poſt n. 13. *Naſturtii* * 43. C. caule procumbente ramoſo foliisque glabris, inferioribus ternatis, foliolo impari maximo ſubrotundo obſolete 3lobo, ſuperioribus ſimplicibus obovatis 3lobis. *Nepal.* (C. naſturtioides Don.)

In C. *Bocconi* Viv. ſuscipienda magnopere haereo. Naſturtium enim rotundo thalictri folio Bocc. muſ. t. 116. (non 118.) ſatis bene C. thalictroidem Allion. refert, neque ſiliquas deflexas habet, quas Vivianius indicat.

pag. 887.

Poſt n. 27. *flaccida* Chamiſſ. 44. C. caule proſtrato ramoſo, ſarmentis radicantibus, foliis pinnatis ſparſe hirſutiusculis, foliolis petiolatis angulato-dentatis, pedicellis ſubpatulis, inferioribus bracteatis, ſiliquis erectis. *Chili.*

maritima Portenſchl. 45. C. caule diffuſo foliisque pinnatis ſubcarnoſis viridibus glabris, foliolis petiolatis obovatis 3lobis, ſiliquis lanceolatis ſtylo tereti coronatis. *Dalmatia.* Treviranus in nov. act. nat. cur. 18. p. 190.

Poſt n. 33. †*polyphylla* Don. 46. C. foliis pinnatis ſubtus caulequе erecto ſimplici piloſiusculis, foliolis oppoſitis lanceolatis obtuſe ſerratis mucronulatis, racemo multifloro pubeſcente. *Nepal.*

†*purpurea* Chamiſſ. 47. C. foliis pinnatis cauleque erecto paucifolio parce hirſutiusculis, foliolis ſubrotundis, impari maximo ſub-3lobo, floribus racemoſis, ſiliquis ſtylo coronatis. *Aſia arctica verſus Caeciam.*

pag. 888.

C. *glauca* * v. ſupra ad *Pteroneuron.*

pag. 889.

Ad *Arabim.*

A. *ciliata* R. Br. (A. madonia Presl.)

pag. 891.

Poſt n. 26. *owaihenſis* Chamiſſ. 51. A. foliis repando-dentatis ſcabriusculis, radicalibus petiolatis lyrato-pinnatis ſub-3jugis, caulinis ſubnullis, caule aſcendente glabro a baſi fere florifero, ſiliquis erecto-patentibus pedicellos triplo ſuperantibus. *Inſ. Sandwich.*

pag. 892.

A. *Thaliana* L. (Siſymbrium Thalianum Monnard. Gay.) Cotyledones incumbentes.

pag. 893.

Poſt n. 49. *longiſiliqua* Presl. 52. A. caule ſimpliciſſimo foliisque pube furcata ſubcaneſcentibus, radicalibus oblongo-lanceolatis dentatis, caulinis ovato-lanceolatis integerrimis, pedicellis erecto-appreſſis ſiliqua multo brevioribus. *Sicilia.* Flores purpuraſcentes. A. purpuraſcens Presl. var.

Poſt *Arabim:*

OUDNEYA R. Br.

africana R. Br. *Numidia* et *Afric. med.* Planta ſuffruticoſa ramoſiſſima glaberrima, foliis ſeſſilibus oblongo-linearibus obtuſis integerrimis, floribus racemoſis purpureis. (Heſperis nitens Viv. libyc. t. 5. f. 3. Syſt. 2. p. 900.)

pag. 895.

Cheiranthus ochroleucus Hall. fil. melius *Eryſimum* ochroleucum Cand. Monnard.

pag. 896.

Ad *Matthiolam* R. Br.

Poſt n. 3. *patens* Presl. 22. M. caule herbaceo diffuſe ramoſo foliisque lanceolatis integerrimis ſtellato-tomentoſis, ſiliquis teretibus patentibus muricato-glanduloſis tomentoſis. *Sicil.*

pag. 898.

Malcolmia R. Br. Licet ipſe ſtator hujus generis (hort. kew. 4. p. 121.) Malcomiam ſcribat, quod omnes repetunt, credo tamen ſphalma ſubeſſe, ſimile *Hiberniae* et *Mathiolae*. Gul. *Malcolm* hortulanus fuit Londinenſis 1771, cujus indices exſtant.

pag. 900.

Heſperis nitens Viv. exſul ſupra jam *Oudneya* R. Br. dicta.

pag. 903.

Siſymbrium pannonicum Jacqu. in agro Francofurtenſi ad Viadrum invenit Steinkopf.

pag. 905.

Ad *Eryſimum helveticum* Cand. (E. Bonannianum Presl.)

Ad E. *caneſcens* Roth. (E. craſſiſtylum Presl.)

pag. 906.

Ad *Eryſimum hieracifolium*. E. *Marſchallianum* Andrz. varietas memorabilis.

robuſtum Don. 37. E. caule ſtricto angulato foliisque lanceolatis mucronatis dentatis utrinque ſubſericeis, ſiliquis aſcendentibus pubeſcentibus pedicellos multo ſuperantibus. *Emodi montes.*

violaceum Don. 38. E. caule ſtricto ſimpliciſſimo foliisque ſagittato-lanceolatis acutis denticulatis piloſis, racemo congeſto, ſiliquis patulis. *Emodi montes.* Flores purpurei.

pag. 907.

Eryſimum aſperum Cand. melius *Cheiranthus aſper* Nuttall.

Ad E. *cuſpidatum* Cand. E. glabrum Presl. ſic.. Sinapis tetraëdra Presl. del. prag.)

Maclovianum Gay. 39. E. foliis lanceolatis denticulatis glaucis apice barbatis, calycibus deciduis, ſiliquis glaberrimis ſtylo multo longioribus. *Inſ. Falkland.* (Braſſica magellanica Gaudich., macloviana Urv.)

pag. 910.

Ad *Braſſicam.*

Poſt n. 8. *villoſa* Biv. 34. Br. ſuffruticoſa villoſa, foliis omnibus petiolatis lyratis dentatis, floribus paniculatis, laciniis calycis erectis, ſiliquis ſub-4gonis. *Sicil.*

pag. 911.

Poſt n. 23. *rectangularis* Viv. 35. Br. glabra, foliis rectangulo-pinnatis, foliolis ſeſſilibus lineari-lanceolatis profunde ſerratis, extimis confluentibus, roſtro ſiliquam glabram aequante. *Corſica.*

pag. 912.

Ad *Sinapim laevigatam.* (Sinapis virgata Presl. delic. prag., Erucaſtrum virgatum et oleraceum Presl. ſic.)

panormitana * 27. S. ſiliquis glabris toroſis appreſſis roſtro longioribus, caule ſubramoſo baſi hiſpido, foliis petiolatis lanceolatis denticulatis ſcabris. *Ad Panormum Sicil.* (Hirſchfeldia integrifolia Presl.)

pag. 913.

Ad *Sinapim albam* L. (Bonannia officinalis Presl.)

Ad S. *diſſectam* Lag. (Bonannia diſſecta Presl.)

Ad S. *heterophyllam* Lag. (Hirſchfeldia inflexa Presl.)

pag. 918.

Ad *Heliophilam.*

Poſt n. 29. *ſtricta* Sims. 35. H. foliis hirſutis, inferioribus lanceolatis pinnatifidis, ſuperioribus linearibus integerrimis, ſiliquis ſtrictis mucronatis pubeſcentibus. *Afric. auſtr.* Bot. mag. 2526.

AD

VOLUMEN III.

CLASSIS XVI.

pag. 3.

DIANDRIA.

Crenias *. Cal. 0. Cor. 0. Spatha fiffa. Stamina 3, baſi connata, lateralia ſterilia, medium bifidum, cruribus 2antheriferis. Stigmata 3. Capſ. 2locularis 2valvis.

Ad *Momordicam* l. Antherae flexuoſae didymae.

pag. 4.

Poſt n. 2346. *Salomonia* Lour. huc e ſyſt. 1. p. 5. n. 26. Cal. 5fidus, laciniis aequalibus. Petalum 3lobum, lobis lateralibus falcatis, intermedio cucullato genitalia includente. Filamenta in vaginam ſtyli coalita. Antherae 4 1loculares, circa ſtigma conglutinatae. Capſ. 2locularis, loculis 1ſpermis. *Polygaleae.*

pag. 5.

Poſt n. 2369. *Aglaia* Lour. Flores polygami. Cal. 5dentatus. Petala 5 in globum conniventia. Stam. 5 in urceolum connata intus antherifera. Bacca exſucca 1-2ſperma. *Aurantia.*

pag. 6.

Poſt n. 2373. *Gynoſtemma* Blum. Flores dioeci. Cal. 10ſepalus, duplici ſerie. Cor. 0. Antherae 2loculares. Stigmata 3, 4. Drupa baccata globoſa 3-4ſperma. *Meniſpermeae.*

Poſt n. 2376. *Euphronia* Mart. Cal. inferus 5partitus perſiſtens. Filamenta baſi complanata. Cor. 0? Capſ. 3locularis 3valvis, feminibus ſolitariis.

HEXANDRIA.

Aphanamixis Blum. Cal. 5ſepalus imbricatus. Pet. 3. Stamina in globum connata. Antherae 3gonae. Stigma ſimplex. Capſ. 2-3locularis. Sem. ſolitaria axillata. *Meliceae.*

Schizochiton * (Chiſocheton Blum.) Cal. urceolatus ſubintegerrimus. Pet. 4 linearia. Tubus conicus 6fidus intus antherifer. Capſ. 2-3locularis. Sem. ſolitaria arillata. *Meliceae.*

Poſt n. 2383. *Cytinus* huc e ſyſt. 2. p. 171. Flores monoeci. Cal. corollinus tubuloſus 4lobus 2ſquamatus. Columna

ſolida antherifera. Stigma capitatum ſulcatum. Capſ. 8locularis polyſperma. Hook. exot. fl. t. 153.

pag. 7.

Trichiliae capſula eſt 3-4locularis.

Didymochiton Blum. Cal. 5ſepalus imbricatus. Pet. 5 cum tubo ſtaminifero arcte connata. Stigma capitatum. Bacca corticata, abortu 2-3locularis. Sem. ſolitaria exarillata. *Meliceae.*

pag. 8.

Poſt n. 2401. *Parkia* R. Br. Cal. tubuloſus ☿. Petala 5 inaequalia. Legumen in loculos transverſos farina farctos diviſum.

Amaria Seb. Mut. Cal. cylindricus 5fidus latere dehiſcens. Pet. 5 obovata patentia carinata. Stamina 10 in tubum coalita. Stylus filiformis, ſtigmate capitato. Legumen pedicellatum longiſſimum 2valve, polyſpermum.

Schotia Jacqu. Cal. 5partitus coloratus. Pet. 5 unguiculata. Stam. baſi in tubum coalita. Germen pedicellatum. Legumen 2-4ſpermum. Sem. baſi arillata.

Poſt n. 2407. *Amphinomia* Cand. Cal. ventricoſus perſiſtens 5fidus. Pet. 5 ſpathulata unguiculata. Stylus 1 lateralis. Fructus leguminoſus 2valvis polyſpermus.

Omphalobium Gärtn. Cal. 5partitus perſiſtens. Pet. 5 unguiculata. Stam. baſi ſubcoalita. Capſ. leguminoſa ſub-1ſperma. Sem. ad ſuturam fixa baſi arillata. (*Connarus* proximus habet ſtylos plures, folliculos vix dehiſcentes, ſem. baſi fixa arillata.)

pag. 12.

Poſt n. 2465. *Calpandria* Blum. Cal. 4ſepalus inaequalis perſiſtens. Pet. 4. Filamenta infer. diſtincta, ſumma in tubum cylindricum intus antheriferum coalita. Stigma ſemi-3fidum. Capſ. lignoſa 3locularis, valvis ſeptiferis. Sem. ſolitaria. *Meliceae.*

Sphaeroſtema Blum. Flores diocci. Cal. 3ſepalus bracteatus. Petala ſub-9, triplici ſerie diſpoſita. Stamina diſco globoſo impoſita, filamentis connatis. Baccae ſpicatae diſtantes 2ſpermae. *Anoneae.*

Poſt n. 2471. *Cordyla* Lour. Cal. inferus campanulatus 4fidus. Cor. 0. Filamenta baſi in orbem coalita. Bacca pedicellata 1locularis 6ſperma. *Leguminoſis aff.*

---

pag. 14.

DIANDRIA.

CRENIAS *.

Scopulorum * *Ad ſcopulos ſcaturiginum Braſil.* Plantula ſubmerſa caeſpitoſa erecta ramoſa folioſa, foliis imbrica-

tis amplexicaulibus ſubſemiorbicularibus bilobis denticulatis. (Mniopſis ſcaturiginum Mart.) Linnaeus *Mniopſis* nomen genericum reprehenſurus fuiſſet: phil. bot. §. 225. 227.

pag. 16.

n. 26. *ſicifolia* l. filifolia.

pag. 19.

Ad *Bradleiam* Gärtn.

Br. *philippica* Cav. Br. zeylanica Labill. nov. Caled. t. 76.?

glauca Labill. 7. Br. foliis elliptico-oblongis utrinque rotundatis undulato-repandis mucronatis ſubtus glaucis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris. *Nov. Caledon.*

macrophylla Labill. 8. Br. foliis late obovato-ellipticis obtuſis coriaceis, pedunculis ♀ aggregatis. *Nov. Caledon.*

pag. 25.

Poſt *Matthiſſoniam* Radd.:

SALOMONIA Lour.

petiolata Don. 1. S. foliis petiolatis cordatis acutis integerrimis glabris 3nerviis, alis carinae aequalibus, capſulis truncatis denticulatis, caule diffuſe ramoſo. *China auſtr. Nepal.* (S. cantonienſis Lour., edentula Cand.)

ſeſſilifolia Don. 2. S. foliis ſeſſilibus ovalibus mucronulatis, alis carina brevioribus, capſulis lunatis duplici ſerie ſpinuloſo-ciliatis, caule ſimplici recto. *Nepal.* (S. oblongifolia Cand.)

pag. 30.

Ad *Viſeniam* Houtt.

Poſt n. 8. *Ulmariae* * 19. V. caule virgato, foliis cordato-ovatis acutis dentato-ſerratis ſupra glabriuſculis ſubtus pubeſcentibus, panicula terminali cymoſa. *Rio grande.* (Melochia ulmarioides Hilar.)

ſericea * 20. V. foliis cordatis inaequaliter ſerratis ſericeis, panicula terminali. *Braſil.* (Melochia Hilar.)

V. *corchorifolia* * (Melochia corchorifolia L., Riedlea corchorifolia Cand., radiata Blum.)

pag. 31.

Poſt n. 18. *graminifolia* * 21. V. foliis linearibus elongatis remote ſerratis glabris, panicula terminali, caule ſimplici. *Braſil.* (Melochia graminifolia Hilar. fl. braſil. t. 31.)

Ad *Waltheriam.*

W. *corchorifolia* Perſ. eſt potius ſyn. W. *ellipticae* Cav., quam *crioceladae* Cand.)

W. *glabriuscula* Hilar. pertinet ad W. *glabram* Poir. Patria et *Braſil.*

ferruginea Hilar. 10. W. arboreſcens, foliis oblongis acutis ſerrulatis ſupra villoſis ſubtus ferrugineo-tomentoſis, capitulis axillaribus breviter pedunculatis, petalis calyce brevioribus. *Braſil.*

cinerascens Hilar. 11. W. fruteſcens, foliis ſubimbricatis cordato-ſubrotundis groſſe ſerratis utrinque cinereo-tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

viscosissima Hilar. 12. W. ſuffruticoſa viſcoſiſſima, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis utrinque villoſo-tomentoſis, panicula folioſa, floribus glomeratis. *Braſil.*

maritima Hilar. 13. W. ſuffruteſcens, foliis ſubimbricatis ovatis obtuſis inciſo-ſerratis utrinque piloſis glanduloſo-tuberculoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

Douradinha Hilar. 14. W. ſuffruteſcens, foliis cordato-ſubrotundis obtuſis glaucis utrinque tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.* Hilar. pl. uſ. braſ. t. 34.

lanata Hilar. 15. W. ſuffruticoſa, foliis ovatis acutiusculis plicatis inaequaliter ſerratis villoſis, ſuperioribus lanatis incano-glaucis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

gracilis Hilar. 16. W. ſuffruticoſa, foliis ovatis obtuſis plicatis, inferioribus piloſis, ſuperioribus tomentoſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

communis Hilar. 17. W. ſuffruticoſa hirſuta, foliis ſubcordato-ovatis obtuſis, capitulis terminalibus. *Braſil.*

pag. 32.

Ad *Erodium.*

E. *Bocconi* Viv. magnopere dubium. Bocconi enim Geranium minimum muſ. t. 128. eſt Erodium chamaedryoides Herit. Deſcriptio tamen Viviani differt.

pag. 33.

Poſt n. 15. *geoides* Hilar. 43. E. caule herbaceo proſtrato hirſuto, foliis ternatis, foliolis ovatis lobatis inciſo-dentatis, ſtipulis ovatis cuſpidatis, umbellis pauciforis. *Ad fl. Platam.*

E. *cuneatum* Viv. ad gruinum Ait. pertinere videtur.

pag. 34.

Poſt n. 27. *hiſpidum* Presl. 44. E. caule proſtrato retrorſum hiſpido, foliis 2pinnatifidis utrinque incano-pubeſcentibus, laciniis linearibus acutis, ſtipulis ovatis ſcarioſis, pedunculis multifloris, petalis calycem ſubaequantibus. *Sicil.* (Geranium laciniatum Bivon.)

pag. 40.

Ad *Paſſifloram.*

P. *glauca* Ait. (P. amethyſtina Mikan.) *Braſil.*

pag. 41.

Poſt n. 68. *aurantia* Forſt. 85. P. foliis baſi cuneatis 8lobis obtuſis glabris, petiolis 2glandulosis, pedunculis ſolitariis, glandulis ſtipitatis, corona duplici, inter. tubuloſo-conica apice 10dentata. *Nov. Caledon.* (Murucuja Perſ. Syſt. 3. p. 43. Diſcemma Labill. nov. Caled. t. 79.)

pag. 43.

Murucuja aurantia Perſ. deleatur.

pag. 45.

Ad *Feuillaeam.*

F. *cordifolia* L. foliis cordatis acutis baſi angulatis coriaceis glabris, paniculis axillaribus, corollae lobis rotundis.

tamnifolia Kunth. 5. F. foliis profunde cordatis acuminatis integerrimis membranaceis utrinque incano-tomentoſis, paniculis axillaribus ramoſiſſimis gracilibus, laciniis corollae acuminatis. *Ad fl. Magdalen.* Humb. nov. gen. 7. t. 640.

pag. 48.

Poſt *Leoniam* R. et P.:

AGLAIA Lour.

odorata Lour. 1. A. foliis ſub-2jugis obovato-oblongis obtuſis racemisque compoſitis glabris, caule fruticoſo. *China. Cochinchina.* (Camunium ſinenſe Rumph. amboin. 5. t. 18. f. 1. Jack. in Mal. miſc. 1. 83., Opilia odorata * Syſt. 1. 766.)

odoratiſſima Blum. 2. A. foliis ſub-2jugis oblongis obtuſiusculis ſubtus paniculisque pyramidatis tenuiſſime lepidotis. *Java.*

†*polyſtachya* Wallich. 3. A. foliis paucijugis baſi obliquis oblongo-lanceolatis glaberrimis, racemis paniculatis axillaribus. *Silhet, prov. Ind. or.*

Sulingi Blum. 4. A. foliis ſub-3jugis elliptico-oblongis obtuſiusculis paniculisque corymboſis glabris. *Java.*

elliptica Blum. 5. A. foliis ſub-3jugis elliptico-oblongis ſubtus paniculisque laxis elongatis ruſo-tomentoſis. *Java.*

ſpecioſa Blum. 6. A. foliis ſub-4jugis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus paniculisque ruſo-lepidotis. *Java.*

decandra Wallich. 7. A. foliis ſub-6jugis oblongis acuminatis utrinque paniculisque axillaribus pubeſcentibus, floribus 10andris, fructibus 5ſpermis. *Nepal.*

argentea Blum. 8. A. foliis multijugis cordato-oblongis acuminatis ſubtus argenteo-leproſis, paniculis elongatis divaricatis. *Java.*

pag. 49.

Post *Clutiam:*

GYNOSTEMMA Blum.

pedatum Blum. 1. G. foliis pedato-palmatis, laciniis ovato-oblongis groſſe ſerratis, panicula axillari. *Java.*

ſimplicifolium Blum. 2. G. foliis ovato-oblongis acuminatis ſerrulatis glabris, racemis paniculatis. *Java.*

pag. 50.

Post *Jürgenſiam:*

EUPHRONIA Mart.

hirtelloides Mart. *Braſil.* Arbor foliis alternis petiolatis ovato-oblongis ſubtus tomentoſis, floribus racemoſis. Mart. nov. gen. t. 73.

HEXANDRIA.

APHANAMIXIS Blum.

grandifolia Blum. *Java.* Arbor excelſa, foliis impari-pinnatis multijugis, foliolis oppoſitis oblongis, paniculis elongatis axillaribus.

SCHIZOCHITON *.

patens * 1. Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis patentibus ramoſiſſimis. *Java.* (Chiſocheton Blum.)

divergens * 2. Sch. foliis pinnatis oblongis, paniculis divaricatis virgatis. *Java.* (Chiſocheton Blum.)

pag. 64.

Ad *Guaream.*

excelſa Bonpl. 5. Gu. foliis 2-3jugis ovalibus obtuſis coriaceis ſupra glabris ſubtus ad axillas venarum villoſis, paniculis axillaribus ſubſimplicibus abbreviatis. *Nov. Hiſpan.* Humb. nov. gen. 7. p. 227.

denſiflora * 6. Gu. foliis 5-8jugis ſubtus pubeſcentibus, foliolis alternis baſi obliqua oblongis acuminatis, racemis confertis axillaribus. *Java.* (Epicharis Blum.)

cauliflora * 7. Gu. foliis multijugis ſubtus villoſis, foliolis oppoſitis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. *Java.* (Epicharis Blum.)

ſericea Blum. 8. Gu. foliis multijugis ſubtus ad coſtam pubeſcentibus, foliolis oblongis acuminatis, racemis confertis lateralibus. *Java.* (Epicharis ſericea Blum.) E. altiſſima Blum., arbor 140 pedes alta, floribus ignotis, varietas videtur.

Ad *Alchorneam* Sw.

caſtaneaefolia Adr. Juſſ. 2. A. foliis lanceolatis acutis mucronato-ſerratis utrinque glabris, floribus ſpicato-paniculatis.

Ad Orinocum. (Hermeſia W. Humb. aequinoct. 1. t. 46. Syſt. 2. p. 246.)

Ad *Myriſticam moſchatam* Thunb. Hook. exot. fl. t. 155. 156.

pag. 66.

Ad *Lanſium domeſticum* Jack. (Cipadeſſa fruticoſa Blum.)

Ad *Heyneam* Roxb.

quinquejuga * 2. H. foliis abrupte pinnatis 5-7jugis, foliolis ovato-oblongis ſubtus ad venas paniculisque virgatis rufo-tomentoſis. *Java.* (Trichilia rufinervis Blum.)

† *multijuga* Blum. 3. H. foliis ſub-6jugis, foliolis oblongis utrinque baſi inaequaliter attenuatis, racemis axillaribus ſolitariis. *Java.*

pag. 67.

Ad *Trichiliam.*

Poſt n. 1. *excelſa* * 20. Tr. foliis impari-pinnatis 4jugis baſi inaequalibus ovato-oblongis acuminatis, paniculis axillaribus coarctatis, floribus 8andris, capſulis globoſis. *Java. Inſ. freti Malacc.* (Melia excelſa Cand., Dysoxylon excelſum Blum.)

arboreſcens * 21. Tr. foliis impari-pinnatis oblongis utrinque attenuatis, racemis compoſitis axillaribus, floribus 10andris. *Java.* (Goniocheton Blum.)

bijuga Labill. 22. Tr. foliis abrupte pinnatis 2jugis, foliolis oblongis undulatis glabris, paniculis laxis folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

montana Kunth. 23. Tr. foliis impari-pinnatis ſub-2jugis oblongis acuminatis glabris ſubtus reticulatis, paniculis axillaribus ſubſimplicibus petiolo longioribus. *Alp. nov. Granat.* Humb. nov. gen. 7. p. 226.

pag. 68.

Ad Tr. *moſchatam* Sw. dele ſyn. Andrewſii.

Tr. *alliacea* Forſt. *Inſ. Molucc. Java.* (Dysoxylon alliaceum et longifolium Blum.)

Poſt n. 8. *macrocarpa* * 24. Tr. foliis alternatim pinnatis oblongis, floribus paniculatis, capſulis globoſis. *Java.* (Dysoxylon macrocarpon et laxiflorum Blum.)

ſimilis * 25. Tr. foliis oppoſite pinnatis inaequaliter oblongis obtuſiusculis, floribus paniculatis, capſulis globoſis. *Java.* (Dysoxylon ſimile Blum.)

odorata Andr. 26. Tr. foliis oppoſite impari-pinnatis 4jugis glabris, foliolis ovato-oblongis undulatis, racemis axillaribus glomeratis, ſtaminibus 2fidis diſtinctis. *Inſ. Carib.* Hook. exot. fl. t. 128.

Tr. *emetica* Vahl. gaudet floribus 10andris.

molliſſima * 27. Tr. foliis ſuboppoſite pinnatis ſubtus paniculisque divaricatis villoſis, foliolis ovato-oblongis obtuſiusculis, floribus 8andris. *Java.* (Dysoxylon molliſſimum Blum.)

pag. 69.

Poſt *Trichiliam:*

DIDYMOCHITON Blum.

nutans Blum. *Java.* Frutex, foliis impari-pinnatis oblongo-lanceolatis ſubtus ad coſtam pubeſcentibus, ſpicis paniculatis axillaribus nutantibus, floribus glomeratis.

pag. 70.

Ad *Chorisiam insignem* Kunth. (Ch. ventricoſa Nees et Mart. nov. act. nat. cur. 11. t. 20.)

Philotheca australis Rudg. foliis lineari-teretiusculis obtuſis.

Reichenbachii Sieb. 2. Ph. foliis confertis lineari-filiformibus acutis punctato-aſperis, floribus terminalibus. *Nov. Holl.*

pag. 71.

Ad *Geranium.*

Poſt n. 12. *arachnoideum* Hilar. 63. G. caule decumbente ramoſo dupliciter villoſo, foliis 7partitis, laciniis angnſte lanceolatis 3fidis, pedunculis filiformibus elongatis, fructibus villoſis. *Braſil.*

pag. 72.

G. *erioſtemon* Fiſch. habitat in *alpibus Nepal.* Don. fl. nepal. p. 208.

pag. 74.

Poſt n. 44. *multifidum* Don. 64. G. acaule, foliis profunde 5partitis ſubtus piloſis, laciniis multifidis linearibus obtuſis, ſcapo 4gono aſcendente apice ſubtrichomo villoſo. *Nepal.*

pag. 75.

Ad G. *rotundifolium* L. G. albicans Hilar. var.

Ad *Browneam* Jacqu.

racemoſa Jacqu. 5. Br. foliis abrupte pinnatis 4jugis glabris, foliolis obovato-oblongis acuminatis integerrimis baſi hinc glanduliferis, floribus racemoſis, calyce exteriori tomentoſo, ſtaminibus corollam ſubſuperantibus. *Caracas.*

pag. 76.

Poſt *Browneam:*

PARKIA R. Br.

africana R. Br. *Afric. occid.* Arbor foliis 2pinnatis multijugis glabris, foliolis linearibus obtuſis, petiolo communi baſi glandulifero, floribus ſpicatis. (Mimoſa

biglobosa Jacqu., taxifolia Pers., Inga biglobosa W., senegalensis Cand.)

AMARIA Seb. Mut.

petiolata Seb. Mut. 1. A. foliis petiolatis cordatis, floribus terminalibus. *Nov. Granat.*

sessilifolia Seb. Mut. 2. A. foliis subamplexicaulibus oblongis, pedunculis axillaribus multifloris. *Nov. Granat.*

Huc SCHOTIA Jacqu. e vol. 2. p. 326.

latifolia Jacqu. 1. Sch. foliis abrupte pinnatis 3-4jugis obovatis obtusis, stipulis minutis subulatis deciduis, corolla 4petala, leguminibus 2-4spermis. *Afric. austr.* Hook. exot. fl. t. 159. (Omphalobium Schotia Jacqu. fil. ecl. 2. t. 126. ined.) Calyx non coloratus.

speciosa Jacqu. 2. Sch. foliis abrupte pinnatis lucidis, foliolis ovali-lanceolatis mucronatis, stipulis subulatis, corolla 5petala. *Afric. austr.* (Guajacum afrum L., Theodora speciosa Medic.)

tamarindifolia Afzel. 3. Sch. foliis abrupte pinnatis sub-8jugis, foliolis ellipticis retusis altero margine excavatis. *Afric. austr.* Bot. mag. 1153. (Sch. alata Thunb.?)

stipulata R. Br. 4. Sch. foliis 5jugis foliolis oblongis acutis cuspidatis, stipulis dimidiato-ovatis falcatis mucronatis. *Afric. austr.*

simplicifolia Vahl. Cand. 5. Sch. foliis simplicibus ovalibus emarginatis nitidis 3nerviis venoso-reticulatis, racemo terminali subvilloso. *Patria?*

[Huc *Metrocynia* Thuarii e Madagascar pertinere videtur.]

pag. 78.

CONNARUS L. Cand.

monocarpus L. 1. C. foliis ternatis coriaceis glaberrimis, foliolis oblongis acuminatis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali rufo-pubescente. *Ceylon.*

pubescens Cand. 2. C. foliis impari-pinnatis bijugis supra glabris subtus ferrugineo-pubescentibus, foliolis ovalibus acutis, extremo maximo, paniculis axillaribus terminalibusque. *Guiana.* Act. soc. hist. nat. paris. 2. t. 15. ? Rourea frutescens Aubl., Robergia Schreb. Syst. 2. 439.

santaloides Vahl. 3. C. foliis pinnatis sub-3jugis glaberrimis, foliolis ovatis acuminatis reticulato-venosis, pedunculis axillaribus aggregatis. *Ind. or.* (Aegiceras minus Gärtn. de fruct. 1. p. 216. t. 46. excl. syn. Rumph.)

† *mimosoides* Vahl. 4. C. foliis pinnatis sub-10jugis glabris, foliolis oblongis emarginatis, racemis axillaribus. *Inf. Nicobar.*

OMPHALOBIUM Gärtn.

* *Fructibus solitariis.*

† *Foliis ternatis.*

indicum Gärtn. 1. O. foliolis subrotundo-ovatis acutiusculis glaberrimis venoso-reticulatis coriaceis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Ceilon. Insul. Molucc.* (Rhus zeylanicus Burm. zeyl. t. 89. Connarus asiaticus L., Omphalobium Gaudichaudii Cand.)

africanum Cand. 2. O. foliolis oblongis acuminatis glaberrimis membranaceis venosis, paniculis axillaribus terminalibusque. *Afric. occid.* (Connarus africanus Lam., Cav. diff. t. 221.) O. Lamberti Cand. idem videtur.

†† *Foliis impari-pinnatis.*

pinnatum Cand. 3. O. foliolis 2jugis ovali-oblongis acutis utrinque glaberrimis, venis apice confluentibus, panicula terminali, petalis basi biappendiculatis, germinibus tomentosis. *Ind. or.* (Connarus pinnatus Lam. Cav. diff. t. 222.)

Patrisii Cand. 4. O. foliolis 3-4jugis ovali-oblongis acutis coriaceis glaberrimis venosis, ramis glandulosis, panicula terminali. *Cayenna.* Act. soc. hist. nat. par. 2. t. 16. A.

Thonningii Cand. 5. O. foliolis sub-2jugis ellipticis acutis submembranaceis glaberrimis, panicula terminali, germinibus hirsutis. *Guinea.*

Smeathmanni Cand. 6. O. foliolis sub-2jugis ovali-oblongis acutis coriaceis supra nitidis subtus ferrugineo-villosis, panicula terminali, germinibus subpubescentibus. *Afric. occid.*

Perrottetii Cand. 7. O. foliolis 2-3jugis oblongis utrinque attenuatis supra nitidis subtus ferrugineo pubescentibus, panicula terminali, fructibus glabratis. *Guiana.*

** *Fructibus aggregatis.*

villosum Cand. 8. O. foliis ternatis oblongis utrinque attenuatis supra glabris subtus paniculaque terminali fructibusque ferrugineo-villosis. *Afric. occid.* (Cnestis trifolia Lam.)

pentagynum Cand. 9. O. foliis ternatis glabris coriaceis subrotundo-ovatis 3nerviis, paniculis axillaribus terminalibusque, fructibus villosis. *Madagascar.* (Connarus pentagynus Lam. Cav. diff. t. 223.)

Post *Serraeam* *:

AMPHINOMIA Cand.

decumbens Cand. *C. B. S.* Herba decumbens hirsuta, foliis ternatis obovatis, capitulis pedunculatis. (Hermannia triphylla L., Connarus decumbens Thunb. in Röm. arch. 1. t. 1.)

pag. 79.

Ad *Pentapetem phoeniceam.* P. anguſtifolia Blum. var.

Ad *Dombeyam* Cav.

†*diverſifolia* * 11. D. foliis oblique cordatis ſinuato-lobatis integerrimis, junioribus peltatis 3-5lobis. *Java.* (Pteroſpermum diverſifolium Blum.)

pag. 80.

Ad *Pteroſpermum* Schreb.

lanceaefolium Roxb. 8. Pt. foliis inaequilateris oblongis acuminatis integerrimis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis petiolos multo ſuperantibus. *Java.*

Ad *Helicterem.*

H. *baruenſis* L. (H. braſilienſis Mikan.) *Braſil.*

Poſt n. 4. *viſcida* Blum. 15. H. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis ſub-3lobis inaequaliter ſerratis ſubtus ſtellato-villoſis viſcidis, pedunculis axillaribus multifloris reflexis, fructibus oblongis hirſutiſſimis. *Java.*

javenſis Blum. 16. H. foliis obſolete cordatis lanceolatis crenulatis ſupra glabris ſubtus glaucis ramulisque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus geminis multifloris. *Java.*

pag. 81.

H. *hirſuta* Lour. et *anguſtifolia* L. habitat et in *Java.*

Sterculia lanceolata Cav. habitat et in *Java.*

pag. 82.

Poſt n. 15. *ſubpeltata* Blum. 28. St. foliis ſubpeltatis ovato-oblongis acuminatis integerrimis ſubtus arachnoideo-tomentoſis, racemis ſimplicibus, fructibus oblongis utrinque attenuatis. *Java.*

St. *macrophylla* Vent. (St. cordata Blum.)

pag. 84.

Ad *Haleſiam.*

parviflora Mx. 8. H. foliis ovato-oblongis acutis utrinque petiolisque pubeſcentibus, racemis ſubcompoſitis pendulis, floribus 8andris. *Amer. bor.* Bot. reg. 952.

Ad *Nepenthem.*

Gymnamphora Reinw. 4. N. foliis petiolatis oblongis ſubtus ad coſtam aſperis, cantharis radicalibus aphyllis nervoſo-reticulatis ovatis ſuperne criſtatis. *Java.*

pag.

pag. 88.

Ad *Malvam.*

Poſt n. 11. *ruderalis* Blum. 68. M. foliis ovato-lanceolatis acutis groſſe ſerratis ſubtus ramulisque ſtrigoſis, floribus axillaribus glomeratis, capſulis 5mucronatis. *Java.*

timorenſis Blum. 69. M. foliis ſubcordato-ovatis groſſe dentatis utrinque ramisque ſtellato-hiſpidis, floribus ſpicatis, capſulis apice barbatis muticis. *Timor. Java.*

pag. 90.

M. *circinata* Viv. ad M. *nicaeenſem* All. referenda.

Poſt n. 41. *tomentella* Presl. 70. M. caule proſtrato foliisque cordato-orbiculatis obtuſis 5angularibus dentatis ſtellato-tomentoſis caneſcentibus, pedunculis petiolo brevioribus. *Sicil.*

hirſuta Presl. 71. M. caule erecto ramoſo hirſutiſſimo, foliis cordato-orbiculatis denticulatis utrinque tomentoſis, inferioribus ſubangulatis, ſuperioribus 5lobis obtuſis, pedunculis quaternis hirſutis erecto-patulis petiolo triplo brevioribus, capſulis rugulosis tomentoſis. *Sicil.*

† *Bivoniana* Presl. 72. M. caule erecto foliisque cordato-orbiculatis obtuſe angulatis dentatis ſtellato-pubeſcentibus, pedunculis aggregatis breviſſimis, fructiferis deflexis, capſulis tomentoſis. *Sicil.*

† *ribifolia* Viv. 73. M. ſtellato-pubeſcens, foliis inferioribus cordatis 5lobis, ſuperioribus palmato-5fidis, laciniis obtuſis crenatis, pedunculis ſolitariis folia ſuperantibus, petalis calycem triplo ſuperantibus. *Corſica.*

pag. 95.

Ad *Goſſypium herbaceum.* (G. javanicum Blum.)

pag. 96.

Ad *Theſpeſiam* Corr.

Th *populnea* Corr. — foliis 7nerviis ſubtus lepidotis, pedunculis petiolos aequantibus.

macrophylla Blum. 3. Th. foliis cordatis acuminatis 5nerviis ſubcoriaceis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java. Inſ. Molucc.* (Novella litorea Rumph. amboin. 2. t. 74.)

altiſſima * 4. Th. foliis oblongis retuſis integerrimis, pedunculis lateralibus multifloris, ſtaminibus ſubliberis. *Java.* (Eſenbeckia Blum.)

Ad *Urenam.*

Poſt n. 4. 5. *repanda* Blum. 19. U. foliis ſubrotundis repando-dentatis ſubtus 1glandulosis glaucis pubeſcentibus, caule ſtellato-pubeſcente, involucro calycem ſuperante. *Java.*

† *tomentoſa* Blum. 20. U. foliis late ovatis angulatis ferratis ſub-5nerviis 1glandulofis tomentoſis ſubtus caneſcentibus, ſummis ovato-lanceolatis 3nerviis, involucro calycem ſubaequante. *Java.*

pag. 101.

Ad *Hibiſcum.*

H. *Lampas* Cav. et in *Java.* H. calloſus Blum. var.

pag. 102.

H. *longifolius* W. (H. Pſeud-Abelmoſchus Blum.)

pag. 104.

H. *laſiocarpus* Cav. habitat ad *fl. Platam.*

racemoſus Lindl. 86. H. pube ſtellato-hiſpida pruriente, foliis longe petiolatis 5fidis acutis ſerratis tomentoſis, racemis terminalibus, involucro calycem aequante petalis multo brevioribus. *Nepal.* Bot. reg. 917.

mauritianus * 87. H. humilis ſuffruticoſus pubeſcens, foliis longe petiolatis ſubcordato-ſubrotundis obtuſis ſub-3lobis repando-dentatis, pedunculis ſubfolitariis. *Inſ. Majcaren. Ind. or.* (H. ficulneoides Lindl. in bot. reg. 938.)

venuſtus Blum. 88. H. foliis cordato-ſubrotundis ſemi-3lobis acutis groſſe dentatis ſubtus ſtellato-tomentoſis, pedunculis petiolo brevioribus, involucro ſub-5phyllo, capſulis 5gonis hiſpidiſſimis. *In hortis Javae.*

virgatus Blum. 89. H. foliis lineari-lanceolatis acuminatis apice remote dentatis, infimis obovatis 3lobis, pedunculis folio brevioribus, involucro 8-10phyllo. *In hortis Javae.*

pag. 105.

Poſt n. 56. *unicaulis* Cand. 90. H. caule ſimplici villoſiſſimo, foliis profunde cordato-ſubrotundis angulatis ſinuato-denticulatis ſupra hirſutis ſubtus candido-villoſiſſimis, pedunculis ſolitariis petiolo brevioribus, involucri foliolis ſpathulatis calycem aequantibus, capſula hiſpidiſſima. *Patria?*

fugax Mart. 91. H. foliis ſubſeſſilibus oblongis acuminatis ſubtus ramisque tomentoſis, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Bráſil.*

pag. 106.

hiſpidus Mill. Bot. reg. 806. var. H. *Trioni.*

Poſt n. 78. *ſimilis* Blum. 92. H. foliis cordato-orbiculatis acuminatis crenulatis ſubtus albidis ſtellato-tomentoſis 3-5glandulofis, involucro 10fido. *Java.*

pag. 112.

Ad *Sidam.*

Poſt n. 35. *vifcidula* Blum. 177. S. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis dentatis ſubtus ſtellato-villoſis, ramis vifcidis, pedunculis petiolo brevioribus. *Java.*

pag. 116.

Poſt n. 87. *centrota* * 178. S. caule procumbente ramoſo hiſpido, foliis inferioribus 5lobis, ſuperioribus haſtato-3fidis glabris, laciniis acutis integerrimis, pedunculis folia ſuperantibus, capſulis 2ariſtatis ſetoſo-aculeatis. *Patria?* Hort. hal. 1826. (S. haſtata ex hort. anglic.)

pag. 119.

S. *Sonneratia* Cav. (S. ciſtiflora Blum.) *Java.*

pag. 121.

Poſt n. 158. *elongata* Blum. 179. S. foliis cordatis groſſe dentatis utrinque glabris, petiolis ſtipulisque piloſis, racemis axillaribus paucifloris foliatis, calycibus campanulatis. *Java.*

atropurpurea Blum. 180. S. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis crenatis ſupra pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, ſtipulis foliaceis inaequaliter cordatis, panicula terminali, capſulis acuminatis calycem ſuperantibus. *Java.*

fundenſis * 181. S. foliis cordato-ſubrotundis acuminatis dentatis ſubtus incano-tomentoſis, ſtipulis ſetaceis, floribus racemoſo-paniculatis. *Java.* (S. fundaica Blum.)

pag. 122.

Poſt n. 171. *digitata* * 182. S. radice tuberoſa, caule herbaceo foliisque palmato-digitatis glaucis, laciniis lincaribus elongatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris longiſſimis. *Ditio Arcanſa Amer. bor.* (Callirrhoë digitata Nuttall. in Journ. of Philadelph. 2. p. 181. Nuttallia Hook. exot. fl. t. 171.)

pedata * 183. S. herbacea glabra, foliis pedatis, laciniis lanceolatis inciſis, pedunculis longiſſimis ſubcorymboſis. *Ditio Arcanſa Amer. bor.* (Nuttallia pedata Hook. exot. fl. t. 172.)

pag. 124.

Ad *Bombax.*.

Ad B. *orientale* * Eriodendron anfractuoſum Blum.

Samaüma * 10. B. foliis 7-5natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, floribus ſolitariis, petalis ſpathulatis elongatis extus fulvo-lanatis, antheris 5 anfractuoſis. *Braſil.* (Eriodendron Mart.)

Poſt n. 7. *paviflorum* Mart. 11. B. foliis 5-8natisque coriaceis, foliolis ſpathulatis emarginatis, pedunculis calycibusque glabris, petalis calyce longioribus tomentoſis, fructibus glabris. *Braſil.*

pubeſcens Mart. 12. B. foliis 5-8natisque coriaceis pubeſcentibus, foliolis obovatis emarginatis, pedunculis calycibus petalisque tomentoſis, germinibus glabris. *Braſil.*

retuſum Mart. 13. B. foliis 5-8natisque glabris, foliolis obovatis retuſis, pedunculis calycibusque glabris, petalis elongatis germinibusque tomentoſis. *Braſil.*

†*Mungaba* Mart. 14. B. foliis 8natis glabris, foliolis oblongis acuminatis integerrimis, calyce cupulari, petalis coriaceis reflexis, ſtaminibus polyadelphis apice 2fidis. *Ad fl. Amazonum.*

pag. 125.

Ad *Carolineam.*

tomentoſa Mart. 5. C. foliis 9natis tomentoſo-hirtis coriaceis, foliolis obovatis obtuſis, calyce baſi multiglanduloſo, petalis erectis ſtamina aequantibus. *Braſil.*

Ad *Gordoniam.*

Poſt n. 1. *excelſa* Blum. 6. G. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſerrulatis, pedunculis axillaribus 1floris folio brevioribus. *Java.* (Schima excelſa Reinw.)

Ad G. *Wallichii* Cand. G. Chilanneä Don. — Schima Noronhae Reinw. var. *Java.*

pag. 126.

Poſt n. 4. *ſemiſerrata* * 7. G. foliis ſubtrapezoideis baſi cuneatis latere latiori verſus apicem ſerratis coriaceis glabris, floribus terminalibus congeſtis polypetalis. *Braſil.* (Wikſtrömia fruticoſa Schrad., Lindleya Nees., Haemocharis ſemiſerrata Mart.)

tomentoſa * 8. G. foliis ſubſeſſilibus obovato-oblongis ſubintegerrimis ſubtus tomentoſis, ramis hirſutis, floribus ſolitariis terminalibus. *Braſil.* (Haemocharis Mart.)

Ad *Camelliam.*

Ad C. *Kiſſi* Wall. (C. Keina Don)

oleifera Abel. 4. C. foliis elliptico-oblongis acutis ſerratis coriaceis nitidis, floribus ſolitariis, calycibus ſericeis deciduis, petalis 2lobis. *China.*

euryoides Lindl. 5. C. foliis ovato-lanceolatis acuminatis ſerratis ſubtus ſericeis, ramis piloſis, pedunculis lateralibus 1floris ſquamoſis. *China.* Bot. reg. 983.

pag. 127.

Poſt *Meſuam:*

CALPANDRIA Blum.

lanceolata Blum. *Java.* Frutex foliis ſimplicibus lanceolatis ſerratis, floribus ſolitariis geminisve lateralibus.

SPHAEROSTEMA Blum.

axillare Blum. 1. Sph. foliis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis, pedunculis axillaribus 1floris petiolum aequantibus, filamentis exterioribus liberis. *Java.*

elongatum Blum. 2. Sph. foliis ovatis acuminatis tenuiſſime denticulatis, pedunculis axillaribus 1floris petiolos longe ſuperantibus, filamentis omnibus connatis. *Java.*

pag. 129.

Ad *Ingam.*

Poſt n. 16. *candida* Kunth. 69. I. aculeata, foliis conjugato-pinnatis, foliolis 2jugis oblique-obovatis utrinque rotundatis ſubmucronatis ſubcoriaceis glabris, capitulis axillaribus ſubglobooſis longe pedunculatis, leguminibus circinatis. *Quito.*

Poſt n. 18. *Catarrhactae* Kunth. 70. I. foliolis dimidiato-ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis glabris, petiolo communi glandulifero, pedunculis axillaribus geminis, leguminibus circinatis, caule ſcandente. *Ad Orinocum.*

Ad I. *quaſſiaefoliam* W. (I. lucida Kunth.)

Poſt n. 25. *lapida* Kunth. 71. I. foliolis 2jugis oblongis utrinque attenuatis membranaceis glaberrimis ſupra nitidis, petiolo communi alato glanduloſo, leguminibus ſubarcuatis. *Ad fl. Magdalen.*

pag. 130.

Poſt n. 32. *Bonplandiana* Kunth. 72. I. foliolis 5jugis ſubcordato-oblongis acutis glabris ſupra nitidis, petiolo communi alato glanduloſo, ſpicis ſeſſilibus, corollis ſericeis, leguminibus glabris. *Nov. Granat.*

Ad I. *rhoifoliam* W. (I. ornifolia Kunth.)

pag. 131.

Ad I. *nobilem* W. (I. Humboldtiana Kunth. *Nov. Granat.*)

pag. 132.

Ad I. *Saman* W. (I. ſalutaris Kunth.)

pag. 136.

Ad *Acaciam* W.

Poſt n. 51. *ſpirorbis* Labill. 189. A. petiolis falcato-lanceolatis obtuſis 3nerviis, ſpicis axillaribus binis, leguminibus cochleatis. *Nov. Caledon.*

pag. 137.

Poſt n. 70. *Thibaudiana* Cand. 190. A. foliis partialibus 4-propriis 7-9jugis baſi obliquis ſubrhombeo-ovatis ſubtus petiolisque villoſis, glandula petiolari ſeſ-

fili. *Amer. auſtr.* (Sophora obliqua Perſ. Syſt. 1. 346.)

Rohriana Cand. 191. A. foliis partialibus 4-propriis 10jugis trapezoideis obtuſis glabris, coſta flavido-villoſa, petiolo communi glandulifero, ſpicis axillaribus pedunculatis ſolitariis folia aequantibus. *Amer. auſtr.* (Mimoſa nigricans Vahl.)

Ad A. *muricatam* W. (A. granuloſa Labill. nov. Caledon. t. 66.)

fulgens Labill. 192. A. ramis teretibus cinereis, petiolis glanduliferis, foliis partialibus 2-propriis 3jugis oblongis utrinque attenuatis ſubtus cinereis, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Nov. Caledon.*

pag. 138.

Aleurites laccifera W. deleatur: redit enim ut varietas *Crotonis aromatici* p. 869.

pag. 139.

Poſt n. 89. *multiflora* Kunth. 193. A. petiolis pubeſcentibus eglanduloſis, foliis partialibus 3-propriis 8jugis oblique oblongis nervoſo-venoſis glabris, capitulis faſciculatis in racemos digeſtis. *Nov. Granat.*

pag. 141.

A. *brachyloba* et *glanduloſa* W. (Darlingtonia Cand.)

pag. 143.

A. *faſciculata* Kunth. hinc ad p. 146. poſt n. 178. transferenda: ejus loco ponatur:

ſubtilifolia Kunth. 194. A. ſpinis ſtipularibus rectis, petiolis glanduliferis, foliis partialibus 5-10-propriis multijugis linearibus obtuſis ſubtus pubeſcentibus, ſpicis axillaribus ſolitariis. *Nov. Granat.*

pag. 146.

Poſt n. 178. *riparia* Kunth. 195. A. aculeis ſparſis uncinatis, petiolis glanduliferis ſubaculeatis, foliis partialibus 12-propriis multijugis linearibus ciliatis, capitulis axillaribus ſolitariis, leguminibus apice uncinatis. *Nov. Granat.*

pag. 147.

Poſt n. 186. *Arrufula* Don. 196. A. aculeis ſparſis recurvis, petiolis aculeatis medio glanduliferis, foliis partialibus propriisque multijugis oblique linearibus obtuſis ciliatis, capitulis pedunculatis ſubaggregatis. *Nepal.*

Poſt *Acaciam:*

CORDYLA Lour.

africana Lour. *Afric. or.* Arbor foliis pinnatis glabris, pedunculis multifloris, ſtaminibus longis croceis, fructibus eſculentis.

CLASSIS XVII.

pag. 150.

Soulamea Lam. del. ſupra in Cl. VI. collocata.

pag. 151.

Poſt n. 2498. *Heylandia* Cand. Cal. 5fidus. Carina obliqne truncata acuta. Stylus refractus. Legumen compreſſum 1ſpermum.

Hallia Thunb. n. 2518. huc transferatur, ab Heylandia carina obtuſa ſtyloque non refracto diverſa.

pag. 152.

Poſt n. 2524. *Carmichaëlia* R. Br. Cal. cyathiformis 5dentatus. Vexillum latum ſtriatum. Legumen ſub-3ſpermum compreſſum, ſuturis (replo R. Br.) poſt valvarum lapſum ſuperſtitibus.

Poſt n. 2530. *Carpopogon* Roxb. Cal. $\frac{4}{5}$. Vexillum abbreviatum incumbens ovatum. Alae conniventes. Carina elongata.

Dichilos Cand. Cal. $\frac{2}{3}$, laciniis profunde partitis. Vexillum carina brevius. Legumen lineare 8ſpermum.

pag. 153.

Poſt n. 2546. *Pueraria* Cand. Cal. campanulatus 2labiatus, lab. ſup. ſubintegro, inf. 3fido. Carina obtuſa. Vexillum obovatum. Legumen ſubſtipitatum compreſſum ſtylo coronatum.

Poſt n. 2557. *Parochetus* Hamilt. Cal. 4fidus nudus. Vexillum incumbens 2lobum. Carina obtuſa alis tecta. Legumen gibboſum.

Odonia Bertol. Cal. 4partitus ſubaequalis. Alae ſuperne 1dentatae. Carina 2partita. Legumen 4-8ſpermum.

Dumaſia Cand. Cal. cylindricus truncatus 2bracteatus. Stylus medio dilatatus. Legumen oligoſpermum.

Sabinea Cand. Cal. campanulatus truncatus. Carina obtuſiſſima. Stylus filiformis cum ſtaminibus circinatus incurvus. Legumen ſtipitatum compreſſum.

Poſt n. 2558. *Caragana* Lam. Cal. tubuloſus 5dentatus. Pet. ſubaequalia. Legumen ſeſſile ſubcylindricum polyſpermum.

Corynitis *. (Corynella Cand.) Cal. ſubbilabiatus 5dentatus, dentibus patulis ſubulatis. Carina obtuſa. Stylus clavaeformis. Legumen compreſſum polyſpermum.

Halimodendron Cand. Cal. campanulatus 5dentatus. Carina obtuſa. Stylus filiformis. Legumen inflatum ſubcoriaceum oligoſpermum.

pag. 154.

Poſt n. 2564. *Pachyrrhizos* Rich. Cal. 4lobus, lobo ſuper. latiori emarginato. Vexillum baſi biplicatum. Legumen compreſſum elongatum.

Poſt n. 2569. *Hymenoſpron* *. Cal. campanulatus ſemi-4fidus, lacinia ſuprema aſcendente. Vexillum reflexum. Stigma ſubclavatum. Diſcus urceolatus. Legumen compreſſum utrinque ad ſuturam alato-marginatum.

Poſt n. 2575. *Prieſtleya* Cand. Cal. 5dentatus. Vexillum ſubrotundum. Alae planae ſubfalcatae. Carina biceps, dorſo incurvo. Legumen ſeſſile compreſſum.

Poſt n. 2581. *Neurocarpon* Desv. Cal. campanulatus 5fidus bracteatus. Vexillum 2lobum complicatum, alas carinamque amplectens. Legumen ſtipitatum 4gonum, valvis 1nerviis.

Brongniartia Kunth. Cal. ⅔ 2bracteatus. Vexillum orbiculatum alas carinamque ſubaequans. Diſcus annularis. Legumen ſtipitatum ſubcultriforme angulatum.

pag. 155.

Poſt n. 2600. *Amicia* Kunth. Cal. campanulatus 5fidus, laciniis 2 ſuperioribus maximis rotundatis, 2 lateralibus minutis, inferiore oblonga concava. Vexillum alas carinamque ſuperans. Legumen compreſſum 5articulatum.

Pictetia Cand. Cal. bracteatus 5fidus, dentibus ſuper. brevioribus obtuſis. Vexillum complicatum carina obtuſa. Legumen ſtipitatum oligoſpermum ſubarticulatum.

---

pag. 159.

Ad *Fumariam*.

Poſt n. 6. *Mundtii* * 8. F. caule erecto foliisque 2pinnatifidis cirroſis ſubtus glaucis, lobis obtuſis, racemis oppoſitifoliis, fructibus compreſſis marginatis 1nerviis. *Afric. auſtr.* (Diſcocapnos Mundtii Schlechtend.)

pag. 160.

Ad *Corydalida*.

C. *Halleri* W. (C. denſiflora Presl.)

perſica Schlechtend. 88. C. foliis ternis ternatis, foliolis cuneiformibus argute incisis, bracteis integris ovatis, capſulis nutantibus. *Hyrcania*. S. G. Gmelin.

pag. 162.

Poſt n. 26. *Cracca* Schlechtend. 89. C. caule ſcandente, foliis bipinnatifidis, laciniis obovatis integris incisisve,

petiolis cirriferis, bracteis lanceolatis pedicellos aequantibus, siliquis pendulis polyspermis. *C. B. S.*

Post n. 36. *scandens* * 40. C. caule scandente, foliis 2pinnatis subtus glaucis, foliolis ovalibus mucronulatis, petiolis 2partitis divaricatis, ramulo altero cirrifero, corymbis simplicibus oppositifoliis. *Nepal.* (Diclytra Don.)

pag. 164.

Ad *Polygalam.*

Post n. 21. *densiflora* Blum. 120. P. foliis lineari-lanceolatis mucronatis margine revolutis ciliatis, infimis obovatis, racemis supraxillaribus abbreviatis densifloris, alis falcatis capsula orbiculari longioribus. *Java.*

pag. 165.

Post n. 35. *straminea* Presl. 121. P. caule erecto subramoso, foliis lanceolato-linearibus acutissimis, bracteis deciduis, alis ovato-ellipticis 3nerviis corolla capsulaque sessili duplo longioribus. *Sicil. Ad Brundisium.* Boccon. mus. t. 99.

elongata Presl. 122. P. caule ascendente, foliis serrulatis, infimis obovatis, superioribus oblongis, alis ellipticis corolla brevioribus. *Sicil.*

pag. 167.

Post n. 57. *arillata* Hamilt. 123. P. fruticosa ramosa, foliis oblongis acuminatis subtus ramulisque pubescentibus, racemis oppositifoliis, alis obovato-oblongis, stigmate 2dentato, capsulis subbaccatis margine alatis. *Nepal.*

Ad P. *leptalcam* Cand. (P. discolor Hamilt. Don.)

pag. 171.

Post n. 114. *triphylla* Hamilt. 124. P. caule herbaceo apice trichotomo, ramis triphyllis, foliis petiolatis ovatis acutis serrulatis glabris, alis obovatis, petali lobis lateralibus falcatis apice truncatis 2dentatisque. *Nepal.*

pag. 174.

Ad *Monninam* R. et P.

Ante n. 1. *vitellina* * 21. M. arborea ramosissima, foliis oblongis acutis, racemis compositis folia superantibus. *Java.* (Jackia Blum.)

excelsa * 22. M. arborea, foliis elliptico-oblongis undulatis, racemis compositis confertis. *Java.* (Jackia Blum.)

longifolia * 23. M. fruticosa, foliis oblongis acuminatis, racemis compositis folio brevioribus. *Java.* (Jackia Blum.)

pag. 176.

Ad *Spartium.*

Sp. *nudum* W. habitat et in *Sardinia.*

pag. 177.

Poſt n. 11. *ſeſſilifolium* * 27. Sp. ramis gracilibus ſtriatis, foliolis ſeſſilibus ſubfiliformibus ſericeis, ſpicis elongatis interruptis bracteatis, leguminibus ovalibus pubeſcentibus. *Aſia minor.* (Geniſta ſeſſilifolia Cand.)

Sp. *thebaicum* Delil. (Crotalaria Cand.)

Sp. *Cupani* * (Geniſta Salzmanni Cand. Sp. gymnopterum Viv. *Corſica.*)

acanthocladon * 28. Sp. ramis oppoſitis ſpineſcentibus, foliolis ſeſſilibus linearibus ſericeis complicatis, floribus ſuboppoſitis interrupte ſpicatis, leguminibus pubeſcentibus. *Graecia. Aſia minor.* (Geniſta acanthoclada Cand.)

ephedroides * 29. Sp. ramis rigidis ſpineſcentibus, foliis paucis ſeſſilibus linearibus ſericeis, racemis terminalibus ſubſpicatis ſtrictis. *Sardinia. Corſica.* (Geniſta ephedroides Cand. legumin. t. 36.)

cuſpidoſum Burch. 30. Sp. ramis teretibus divaricatis ſpinoſis, foliolis oblongis, floribus alternis. *Afric. auſtr.* (Geniſta Cand.)

dalmaticum * 31. Sp. ramis angulatis ſpinoſis foliisque linearibus piloſis, ſpinis ramoſis patentibus, racemis terminalibus, leguminibus hirſutis. *Inſ. Creſſa in mari adriatico.* (Geniſta Bartling.)

pag. 183.

Ad *Ononida.*

Ad O. *viſcoſam.* O. brachycarpa et breviflora Cand. varr.

pag. 185.

Ad *Anthyllida.*

chilenſis Cand. 19. A. foliis pinnatis cauleque decumbente herbaceo hirſutis, foliolis oblongis ſubaequalibus, leguminibus rectis hirtis. *Chili.* (Lotus ſubpinnatus Lag. Syſt. 3. p. 279.)

Poſt *Anthyllida:*

HEYLANDIA Cand.

hebecarpa Cand. 1. H. foliis ſemiamplexicaulibus cordato-ellipticis obtuſis ramulisque virgatis hirſutis, floribus axillaribus ſolitariis ſubſeſſilibus, leguminibus hirtis. *Ceylon.* Cand. legum. t. 34.

leiocarpa Cand. 2. H. foliis breviter petiolatis cordato-ſubrotundis obtuſis hirſutis, pedunculis axillaribus ſolitariis abbreviatis, leguminibus glabris. *Ind. or.* (Hallia hirta W.)

latebrosa Cand. 3. H. foliis petiolatis ovatis serrulatis glabris, floribus pedunculatis axillaribus geminis bractea cymbiformi occultis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.* (Hedysarum latebrosum L. mant., Lespedezia Pers.)

†*Perrottetii* * 4. H. foliis lineari-subulatis paucissimis, ramis virgatis calycibusque hirsutis, racemis confertis, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Crotalaria Cand.)

Ad *Borboniam.*

obcordata * 9. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis lineatis, stipulis subulatis calyces sessiles solitarios acquantibus, leguminibus villosis. *Senegambia.* (Podaliria obcordata Poir., Requienia Cand. legum. t. 37.)

sphaerosperma * 10. B. foliis sessilibus obovatis mucronatis, stipulis subulatis calyce brevioribus, leguminibus pubescentibus. *Afric. austr.* (Requienia Cand.)

pag. 186.

Borbonia ericaefolia L. *Priestleiae* Cand. potius adnumeratur.

Ad *Hoveam.*

elliptica Cand. 5. H. foliis elliptico-oblongis emarginatis supra lucidis subtus subpubescentibus, pedunculis folio brevioribus geminis. *Nov. Holland. versus Africum.*

chorizemaefolia Cand. 6. H. foliis oblongo-lanceolatis sinuato-spinosis mucronatis coriaceis glabris, stipulis spinescentibus, calycibus villosis. *Nov. Holland. versus Notum.*

Ad *Goodiam.*

simplicifolia * 3. G. foliis simplicibus lanceolatis, racemis axillaribus paniculatis. *Nov. Holl.* (Platychilum Celsianum Delaun. herb. amat. t. 187. Cand.)

pag. 187.

Ad *Aspalathum.*

A. *Hystrix* Thunb. A. microcarpus Burch. var.

frankenioides Burch. 67. A. foliis fasciculatis teretibus obtusiusculis pilosis, ramis villosis, floribus subsolitariis axillaribus terminalibusque sericeis. *Afric. austr.*

pag. 189.

Post n. 45. *suffruticosus* Cand. 68. A. foliis subfasciculatis linearisubulatis subpubescentibus erectis, pedunculis elongatis racemosis. *C. B. S.*

pag. 190.

Post n. 57. *cymbaeformis* Cand. 69. A. foliis fasciculatis teretibus hirsutis, floribus subsolitariis axillaribus termi-

nalibusque, calycibus cymbaeformibus obtusis. *C. B. S.* (A. uniflorus Lam.)

Ad *Nissoliam.*

N. *arborea.* (Machaerium acuminatum Kunth.)

pag. 191.

Ad *Amerimnum.*

Post n. 3. *strigulosum* Kunth. 8. A. inerme, ramis ferrugineo-tomentosis, foliis subcordato-ovatis obtusis utrinque strigillosis, racemis axillaribus solitariis petiolos superantibus. *Ad Orinocum.*

Post n. 5. *polystachyon* * 9. A. fruticosum, foliis multijugis ovatis, racemis paniculatis. *Mexico.* (Viborquia Ort. dec. 5. t. 9. Varennea Cand.)

pag. 192.

Ad *Pterocarpum.*

Pt. *Ecastaphyllum* Berg. (Ecastaphyllum Brownei Rich. Pers. Hecastophyllum Kunth.)

dubius * 11. Pt. foliis simplicibus subcordato-oblongis acutiusculis reticulatis pellucido-lineolatis, fructibus reniformibus rugulosis. *Curacas.* (Hecastophyllum dubium Kunth.)

Post n. 6. *pubescens* * 12. Pt. foliis pinnatis 3jugis membranaceis subtus pubescentibus, foliolis ellipticis acutis, stipulis falcatis, ramis fructibusque orbiculatis tomentosis. *Mexico.* (Amphymenium pubescens Kunth.)

pag. 193.

Ad *Dalbergiam.*

Post n. 7. *amorphoides* * 15. D. arborea ramosissima, foliis petiolatis submultijugis membranaceis pubescentibus pellucido-punctatis, foliolis parvis ellipticis mucronatis, racemis terminalibus pedunculatis. *Mexico.* (Eysenhardtia amorphoides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 592.)

punctata * 16. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis glabris supra nitidis pellucido-punctatis, foliolis oblongis obtusis membranaceis, racemis compositis. *Caracas.* (Lonchocarpus punctatus Kunth.)

guineensis * 17. D. arborea, foliis pinnatis sub-3jugis coriaceis glabris, foliolis ovalibus acutiusculis, racemis paniculatis, calycibus fructibusque sericeis, staminibus monadelphis. *Guinea.* (Robinia violacea P. B., Lonchocarpus formosianus Cand.)

macrophylla * 18. D. arborea, foliis pinnatis 4jugis epunctatis glabris, foliolis oblongis acuminatis supra nitidis, racemis subspicatis, calycibus fusco-tomentosis. *Ad fl. Magdalen.* (Lonchocarpus macrophyllus Kunth.)

pag. 194.

D. *domingenſis* Perſ. (Lonchocarpus violaceus Cand.)

Ad *Degueliam* Aubl.

arborcſcens * 2. D. arboreſcens, foliis pinnatis 2jugis lanceolatis nitidis parallele venulofis, petiolo marginato, pedunculis paucifloris. *Nov. Granat.* (Riveria nitens Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 659.)

Ad *Andiram* Lechen.

excelſa Kunth. 2. A. foliis 6jugis glabris, foliolis ovato-oblongis acutis membranaceis reticulatis, paniculis terminalibus, calycibus urceolatis ſubtomentoſis. *Mexico.*

riparia Kunth. 3. A. foliis 6jugis glaberrimis ſupra nitidis, foliolis ovato-oblongis acuminatis, ſtipulis geminis ſubulatis, paniculis terminalibus ferruginco-tomentoſis. *Ad fl. Magdalen.*

Ad *Cyliſtam* Ait.

polyſtachya Cand. 5. C. labio calycis inf. 3dentato, pedunculis racemoſis villoſis. *Afric. occ.* Cand. legum. p. 382.

pag. 195.

Ad *Halliam* Thunb.

Poſt n. 2. *anguſtifolia* Cand. 8. H. caule filiformi, foliis lincaribus acutis glabris, ſtipulis lanceolatis petiolo longioribus, pedunculis 1floris folio brevioribus. *Afric. auſtr.*

Ad H. *cordatam* Thunb. (Rafnia cordata Mart. Thunb.)

H. *hirta* W. ad *Heylandiam* reducta.

H. *ſororia* W. (Eleiotis Cand.)

Ad *Glycinem.*

Poſt n. 1. *ſimplicifolia* Kunth. 36. Gl. ſuffruticoſa diffuſa, foliis petiolatis cordato-lanceolatis mucronatis glabris, ſtipulis nervoſis, pedunculis axillaribus ſub-3floris, calycibus appreſſo piloſis bracteatis. *Ad Orinocum.*

Poſt n. 3. *diffuſa* Kunth. 37. Gl. procumbens diffuſa, foliis breviter petiolatis ſupra pubeſcentibus ſubtus glanduloſo-punctatis, foliolis lanceolatis mucronatis venoſis, corymbis axillaribus abbreviatis, leguminibus piloſis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 572.

crinita Kunth. 38. Gl. ſuffruticoſa erecta, foliis breviſſime petiolatis ramisque longiſſime villoſis, foliolis lineari-lanceolatis elongatis mucronatis, ſtipulis lanceolatis cuſpidatis ſtriatis, pedunculis paucifloris abbreviatis, leguminibus rufo-hirſutis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 573.

rufa Kunth. 39. Gl. ſuffruticoſa erecta, foliis coriaceis reticulato-rugoſis ramisque rufo-hirſutis, foliolis elliptico-oblongis obtuſis mucronatis, ſtipulis lan-

ceolatis, racemis axillaribus abbreviatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 574.

pulchella Kunth. 40. Gl. ſuffruticoſa, foliis villoſis, foliolis ovato-lanceolatis acutis, pedunculis brevibus axillaribus ſub-6floris. *Nov. Granat.*

pag. 196.

Poſt n. 13. *Lamarckii* Kunth. 41. Gl. volubilis, foliis pubeſcentibus punctatis, foliolis lateralibus ſubrotundo-ovatis inaequilateris, racemis laxifloris longiſſimis, leguminibus 2ſpermis. *Cuba. Jamaica.* (Dolichos minimus L. Syſt. 3. p. 251.)

macrophylla Kunth. 42. Gl. volubilis, foliis glandulоſo-punctatis ramisque triangularibus villoſis, foliolis ſubcordatis 3nerviis, intermedio rhombeo-ovato, lateralibus inaequilateris, racemis multifloris, calycibus ſericeis. *Cuba.*

malacophylla * 43. Gl. volubilis, foliolis ovatis acutiusculis villoſis reſinoſo-punctatis, racemis breviter pedunculatis folio brevioribus, vexillo obcordato. *Afr. or.* (Gl. mollis Hook. exot. fl. t. 201.)

Poſt n. 17. *meniſpermoides* * 44. Gl. volubilis, foliolis reniformibus pubeſcentibus, ſtipulis ovatis, racemis ſubſeſſilibus paucifloris, laciniis calycis lanceolatis 3nerviis. *Nov. Hiſpan.* (Rhynchoſia meniſpermoidea Cand.)

pag. 197.

Gl. *ſagittata* Humb. del., reditura ſub *Rudolphia.*

pag. 198.

Ad *Pſoraleam.*

Poſt n. 3. *lathyriſolia* Balb. 54. Pſ. foliis ovali-oblongis ciliatis, ſtipulis coalitis 2fidis, caule decumbente diffuſo, floribus axillaribus ſubſeſſilibus ſubſolitariis. *Patria?*

Poſt n. 7. *faſcicularis* Cand. 55. Pſ. foliis ſubternatis linearibus acuminatis, pedunculis axillaribus faſciculatis 1floris. *C. B. S.* (Lotus tenuifolius Burm.)

Mutiſii Kunth. 56. Pſ. foliolis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris, nervo medio petiolis ramisque piloſis, ſpicis axillaribus denſifloris folio brevioribus, calycibus appreſſo-piloſis. *Nov. Granat.* (Indigofera mexicana Mutis. L. ſuppl. Syſt. 3. 274.)

pag. 199.

Ad Pſ. *melilotoidem* Mx. Pſ. eglandulоſa Ell.

pag. 200.

Poſt n. 41. *macroſtachys* Cand. 57. Pſ. foliis ternato-pinnatis pubeſcentibus, foliolis ovatis mucronatis, petiolis glandulоſo-ſcabris, pedunculis axillaribus ſo-

lia ſuperantibus, ſpicis ramoſis hirſutiſſimis. *Ora occid. Amer. bor.*

pag. 201.

Pſ. *tetraphylla* Poir. eſt Turpinia Perſ.

Poſt n. 51. *multijuga* Ell. 58. Pſ. caule ramoſo glabriusculo, foliis 9-10jugis pubeſcentibus, foliolis oblongo-lanceolatis obtuſis, ſpicis oblongis, bracteis exilibus membranaceis eglandulosis. *Carolina auſtr.*

pag. 202.

Ad *Leſpedeziam* Mx.

eriocarpa Cand. 14. L. foliolis obovatis retuſis reticulatis ſupra glabris ſubtus ſtrigillosis, racemis faſciculatis ſubſeſſilibus, leguminibus hirſutis calycem excedentibus. *Nepal.* (Aſpalathus cuneata Don.)

pag. 205.

Poſt *Dorycnium:*

CARMICHAËLIA R. Br.

auſtralis R. Br. *Nov. Zeeland.* Frutex ramoſiſſimus, ramis ancipitibus, foliis ternato-pinnatis glabris, foliolis obcordatis, floribus racemoſis violaceis. Bot. reg. 912. (Lotus arboreus Forſt., Achyronia arborea Syſt. 3. 285.)

pag. 206.

Ad *Melilotum.*

ſuaveolens Ledeb. 25. M. leguminibus ſub-2ſpermis ovatis mucronatis rugulosis, vexillo alas carinamque ſuperante, racemis laxis, ſtipulis ſubulatis, foliolis oblongo-lanceolatis apice dentatis, caule elato. *Sibir.*

pag. 207.

M. *ſibirica* Poir. (Medicago ſibirica Cand.)

pag. 208.

M. *cretica* Desr. (Pocockia Ser. Cand.)

pag. 209.

Ad *Trifolium.*

Poſt n. 16. *amabile* Kunth. 111. Tr. floribus faſciculatis ebracteatis, dentibus calycis acutis ſubaequalibus, leguminibus rugulosis, foliolis ſubrotundis denticulatis venoſis glabris, caule caeſpitoſo erecto, ramis pubeſcentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 593.

Burchellianum Ser. Cand. 112. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis foliaceis 1nerviis tubo corollae longioribus, foliolis obcordatis argute dentatis glabris, ſtipulis lanceolatis elongatis obtuſiusculis nervoſis. *Afric. auſtr.*

africanum Ser. Cand. 113. Tr. capitulis longe pedunculatis, laciniis calycis 4gonis tubum corollae aequantibus, foliolis obovatis ſerrulatis piloſis, ſtipulis lanceolatis elongatis acutis nervoſis. *Afric. auſtr.* Burchell.

pag. 210.

Ad Tr. *campeſtre* Schreb. (Tr. agrarium C. C. Gmel. et pſeudo-procumbens Ej. var.)

pag. 211.

Ad Tr. *carolinianum* Mx. (Tr. umbellatum Ser. Cand.)

pag. 213.

Poſt n. 53. *praetutianum* Guſſon. 114. Tr. capitulis globoſis ſolitariis bracteatis, dentibus calycis corolla brevioribus, foliis lanceolatis denticulatis glaucis hirſutis, ſtipulis membranaceis nervoſis, caule ſuffruticoſo. *Samnium Italiae.* (Sav. bot. etruſc. 4. p. 16. n. 7.)

pag. 218.

Ad Tr. *grandiflorum* Ledeb. (Tr. eximium Fiſch.) Tr. nanum Torr. ad montes ſcopuloſos Amer. bor. var.

Ad Tr. *uniflorum.* Tr. *Buxbaumii* Sav.

pag. 222.

Ad *Cytiſum tomentoſum* Andr. (Goodia polyſperma Cand.)

pag. 225.

Cytiſi dubii.

Poſt n. 39. *orientalis* Loiſ. 45. C. caule erecto hirſuto, foliis ſubſeſſilibus ternatis villoſis, foliolis linearibus acutis, floribus ſubterminalibus paucis leguminibusque glabris, calycibus ſub-5fidis. *Aſia minor.*

africanus Loiſ. 46. C. ramis erectis hirſutis, foliis petiolatis ternatis, foliolis linearibus piloſis, umbellis terminalibus pedunculatis. *Afric. bor.*

Poſt *Cytiſum:*

CARPOPOGON Roxb.

volubilis Roxb. *Ind. or.* Herba volubilis, foliis ternatis ovatis glabriusculis, pedunculis 3floris, floribus atropurpureis. Hort. hal. 1826.

DI-

DICHILOS Cand.

lebeckioides Cand. 1. D. ſuffruticoſum erectum glabriuſculum, foliis ternatis linearibus, floribus terminalibus pedunculatis ſubſolitariis pendulis. *Afric. auſtr.* Cand. legum. t. 35.

hypotrichum * 2. D. ſcandens, foliis ternatis ſubtus ſtrigilloſo-villoſis, foliolis oblongis, ſtipulis lanceolatis, pedunculis elongatis ſub-2floris, leguminibus ſericeo-villoſis. *Afric. auſtr.*

pag. 226.

Ad *Adenocarpum volgenſem* * (Calophaca wolgarica Fiſch. Cand.)

Ad *Lupinum.*

Poſt n. 4. *rupeſtris* Kunth. 30. L. ſuffruticoſus procumbens, foliis ſubſeptenis lanceolatis acutis ſubtus ſericeis, racemis pedunculatis, floribus ſubverticillatis 1bracteatis, calycibus ſericeis. *Alp. Quito.*

Smithianus Kunth. 31. L. fruticuloſus ramoſiſſimus, foliolis exiguis ſpathulatis ſericeo-hirſutis, racemis pedunculatis, floribus ſubverticillatis, calycis 2bracteati labio inf. integro, leguminibus hirſutis. *Alp. Quito.*

pag. 227.

Poſt n. 15. *elegans* Kunth. 32. L. herbaceus erectus villoſus, foliolis lanceolatis acutis ſubtus ſericeis, ſtipulis ſetaceis, racemis elongatis, floribus ſubverticillatis, calycis bracteati labio inf. integro, leguminibus hirſutis. *Mexico.*

montanus Kunth. 33. L. herbaceus tomentoſus, foliolis lanceolato-linearibus acutis ſubtus appreſſo piloſis, ſtipulis lanceolatis, racemis elongatis, floribus ſubverticillatis, calycis bracteati villoſi labio inf. integro, leguminibus hirſutis. *Nov. Hiſpan.*

microcarpus Sims. 34. L. foliolis lineari-lanceolatis ſubtus pubeſcentibus, racemi pedicellis verticillatis, calycibus ebracteatis $\frac{1}{2}$, leguminibus rhombeis mucronatis 2ſpermis. *Chili.* Bot. mag. 2413.

pag. 228.

Ad *Piſcidiam puniceam* Cav. (Aeſchynomene miniata Ort., Daubentonia punicea Cand.)

pag. 229.

Ad *Piſcidiam longifoliam* W. (Daubentonia Cand.)

Ad *Lebeckiam.*

Poſt n. 7. *Burchellii* * 10. L. caule ſubſcandente gracili, foliis ternatis remotis longe petiolatis, foliolis lineari-lanceolatis longe acuminatis, ſtipulis ſemiſagittatis, pedunculis 2floris axillaribus elongatis. *Afric. auſtr.* (Otoptera Burchellii Cand. legum.

t. 42. Nil vulgatius in papilionaceis quam alas basi esse appendiculatas s. hinc dentatas.)

Ad *Rafniam amplexicaulem* Thunb. (Vascoa Cand.)

pag. 230.

Sarcophyllum carnosum Thunb. habet flores laterales sparsos flavos. Bot. mag. 2502.

pag. 231.

Platylobium reticulatum Sieb. ad *Chorizema* Cand.

Ad *Bossiaeam* Vent.

rotundifolia Cand. 10. B. ramis compressis foliosis, foliis obovato-subrotundis mucronatis glaberrimis. *Nov. Holl.*

Ad B. *microphyllam* R. Br. (Platylobium microphyllum Sims. bot. mag. 863., obcordatum Vent.)

pag. 233.

Ad *Tephrosiam* Pers.

hypargyra Cand. 41. T. caule suffruticoso erecto angulato villoso, foliis 2-4jugis supra glabris subtus argenteo-sericeis, foliolis infimis subrotundis, reliquis ovali-oblongis, terminali maximo, pedunculis axillaribus, staminibus monadelphis, leguminibus pubescentibus. *Ind. or.*

sophoroides Cand. 42. T. caule fruticoso, foliis 2-4jugis elliptico-oblongis acuminatis glaberrimis, racemis axillaribus. *Nepal.*

Senna Kunth. 43. T. caule fruticoso erecto, foliis 4jugis obovato-oblongis retusis glaucescentibus pubescentibus, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus pubescentibus. *Nov. Granat.*

venustula Kunth. 44. T. caule fruticoso elato, foliis 6jugis lanceolatis obtusis mucronatis pubescentibus subtus incanis, racemis oppositifoliis, floribus fasciculatis, leguminibus subcultriformibus pubescentibus. *Cumana.*

fruticosa Cand. 45. T. caule fruticoso scandente, foliis 5jugis ovato-oblongis acutis glabris, racemis paniculatis abbreviatis, leguminibus oblongis compressis villosis. *Ind. or.*

brachystachys Cand. 46. T. caule fruticoso, foliis 7jugis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis paniculatis. *Nepal.*

suberosa Cand. 47. T. caule fruticoso, foliis 8jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus pubescentibus, racemis axillaribus. *Bengal.* (Robinia Roxb.)

candida Cand. 48. T. caule fruticoso, foliis 10jugis elliptico-oblongis mucronulatis subtus fericeis, racemis axillaribus, leguminibus stylo elongato coronatis. *Bengal.* (Robinia Roxb.)

Mariana Cand. 49. T. caule suffruticoso villoso, foliis 4jugis oblongis subtus argenteo-fericeis, stipulis lanceolatis

elongatis villosis, racemis abbreviatis subsessilibus, leguminibus villosis. *Inf. Marian.*

leucantha Kunth. 50. T. caule fruticoso erecto pubescente, foliis sub-8jugis oblongo-linearibus obtusis mucronatis subtus canescentibus, racemis terminalibus subgeminis, leguminibus tomentosis. *Nov. Hispan.* Humb. nov. gen. 6. t. 577.

emarginata Kunth. 51. T. arborescens, foliis multijugis oblongo-linearibus profunde emarginatis supra appresse pubescentibus subtus argenteo-sericeis, racemis terminalibus, floribus fasciculatis, leguminibus tomentosis. *Ad Orinocum.*

Ad T. *mimosoidem* Pers. *Dalbergia Barclaii* Hook. exot. fl. t. 188. e *Madagascar.*

Post n. 24. *oroboides* Kunth. 52. T. caule fruticoso ramoso, foliis multijugis linearibus incano-pubescentibus, pedunculis sub-1floris apice foliatis, leguminibus pubescentibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 578. 579.

astragalina Kunth. 53. T. caule fruticoso tomentoso, foliis 8-9jugis oblongis obtusis subtus leguminibusque incano-tomentosis, floribus sparsis pedunculatis. *Quito.*

pag. 235.

Post *Teramnum:*

PUERARIA Cand.

tuberosa Cand. 1. P. radice tuberosa, caule fruticoso scandente, foliis ternatis ovatis acutis supra pubescentibus subtus sericeis, racemis terminalibus elongatis, leguminibus villosis. *Bengal.* (Hedysarum tuberosum Roxb. W.)

Wallichii Cand. 2. P. caule fruticoso, foliis ternatis ovatis acutis supra glabris subtus pubescentibus, racemis axillaribus compositis folia aequantibus. *Nepal.* Cand. legum. t. 43.

pag. 236.

Ad *Crotalariam.*

Cr. *genistoides* Lam. (Cr. spartioides Cand.)

Post n. 9. *tenuifolia* Roxb. 84. Cr. ramis angulatis dense tomentosis, foliis lineari-oblongis obtusis sericeo-villosis, stipulis subulatis deciduis, racemis laxis elongatis, vexillo subtus discolore. *Coromandel.*

alata Hamilt. Roxb. 85. Cr. ramis alatis, foliis breviter petiolatis ovalibus retusis tomentosis, racemis paucifloris, bracteis ovatis acutis stipitatis. *Nepal.*

tuberosa Hamilt. Don. 86. Cr. caule suffruticoso decumbente, foliis lanceolatis acutis margine revolutis subtus ferrugineo-tomentosis, floribus axillaribus subsessilibus, leguminibus pilosissimis. *Nepal.*

nitens Kunth. 87. Cr. caule suffruticoso ramoso, ramis subangulatis sericeis, foliis obovato-oblongis obtusis sub-

tus ſplendentibus, racemis terminalibus multifloris, leguminibus glabris. *Nov. Granat.*

acuminata Cand. 88. Cr. foliis linearibus acuminatis ſubtus ramisque ſericeis, ſtipulis ovato-lanceolatis acuminatis petiolo brevioribus, pedunculis oppoſitifoliis 1-2-floris, germinibus glabris. *Afric. auſtr.* Burchell.

virgulta * 89. Cr. foliis petiolatis oblongo-linearibus mucronatis, junioribus ramulisque ſericeis, ſtipulis nullis, racemis oppoſitifoliis elongatis, leguminibus pendulis. *Afric. auſtr.* (Cr. virgultalis Burch.)

Ad Cr. *pellitam* Bert. (Cr. Berteriana Cand.)

pag. 237.

Poſt n. 19. *novae Hollandiae* Cand. 90. Cr. foliis obovato-oblongis obtuſis ſubtus ramisque ſericeo-pubeſcentibus, petiolis apice nodoſo-articulatis, ſtipulis nullis, racemis terminalibus. *Nov. Holl.*

Ad Cr. *ſpectabilem* Roth. (Cr. Leſchenaultii Cand.)

ſtipularis Desv. 91. Cr. foliis ovalibus obtuſis cauleque erecto villoſis, ſtipulis ovatis acuminatis ad latas internum exciſis late decurrentibus, bracteis linearibus acuminatis. *Cayenn.*

pterocaula Desv. 92. Cr. foliis lineari-lanceolatis acutis ſericeis, ſtipulis obtuſis decurrentibus, leguminibus glabris. *Amer. tropic.*

Geniſtella Kunth. 93. Cr. foliis lanceolatis acutis ſubtus argenteis, ſtipulis abbreviatis acutis decurrentibus, racemis axillaribus terminalibusque multifloris. *Nov. Granat.*

Eſpadilla Kunth. 94. Cr. foliis lanceolatis obtuſis utrinque flavo-ſericeis, ſtipulis late triangularibus falcatis acuminatis decurrentibus, racemis oppoſitifoliis paucifloris. *Nov. Granat.*

Poſt n. 21. *proſtrata* Roxb. 95. Cr. caule proſtrato ramoſo foliisque ſubrotundis piloſis, ſtipulis linearibus, racemis paucifloris, bracteolis breviſſimis. *Nepal.*

pag. 238.

Poſt n. 29. *Burmanni* Cand. 96. Cr. caule erecto ſuperne diviſo, foliis oblongo-linearibus obtuſis mucronatis ſericeo-villoſis, ſtipulis ſetaceis, floribus terminalibus ſubracemoſis. *Ind. or.* (Cr. ſericea N. L. Burm. fl. ind. t. 48. f. 1.)

Ad Cr. *parviſloram* Roth. Cr. *breviſlora* Cand. e *Braſilia* pertinere videtur.

pag. 239.

Ad Cr. *puſillam* Roth. Cr. *pumila* Schrank.

Ad Cr. *medicagineam* Lam. Cr. *virgata* Roxb. Schrank.

Ad Cr. *bituminoſam* * (Fagelia Neck. Cand., Cr. glycinea Lam.)

Ad Cr. *uncinellam* Lam. Cr. *ſphaerocarpa* et *ſenegalenſis* Cand.

cytiſoides Roxb. 97. Cr. foliolis ellipticis utrinque attenuatis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis exiguis ſubulatis, ra-

cenis oppoſitifoliis, carina roſtrata, leguminibus acinaciformibus tomentoſis. *Nepal.* (Cr. pſoraleoides Don.)

macroſtyla Don. 98. Cr. foliolis obovatis retuſis coriaceis ſubtus ramulisque ſericeo-villoſis, racemis axillaribus, leguminibus ovatis compreſſis 1ſpermis villoſiſſimis, ſtylo longiſſimo plumoſo. *Nepal.*

cylindrocarpa Cand. 99. Cr. caule erecto paniculato, foliolis elliptico-oblongis ſubtus ramulisque ſubpubeſcentibus, racemis oppoſitifoliis, leguminibus cylindricis polyſpermis ſtylo apiculatis. *Senegambia.*

anagyroides Kunth. 100. Cr. arboreſcens, foliolis oblongo-lanceolatis acutis ſubtus ramulisque ſericeis, ſtipulis minutis ſubulatis, racemis oppoſitifoliis multifloris, leguminibus polyſpermis. *Caracas.*

mollicula Kunth. 101. Cr. fruticoſa, foliolis lanceolatis obtuſis venoſis villoſis ſubtus caneſcentibus, ſtipulis ſubfalcatis ſubulatis, racemis multifloris, calycibus ſericeis, corollis glabris. *Mexico.*

litoralis Kunth. 102. Cr. ſuffruticoſa procumbens, foliolis obovato-oblongis emarginatis appreſſo-pubeſcentibus, ſtipulis minimis ſubulatis, pedunculis ſub-6floris, leguminibus pubeſcentibus. *Cuba.* (Cr. pumila Ort.)

cajanifolia Kunth. 103. Cr. fruticoſa (?), foliolis oblongo-lanceolatis obtuſis ſubmucronatis ſupra glabris ſubtus ramulisque angulatis appreſſo-pubeſcentibus, ſtipulis capillaribus, racemis multifloris, leguminibus polyſpermis piloſis. *Mexico. Ad Orinocum.* (Cr. maypurenſis Kunth., ſetifera Cand.)

bracteata Roxb. 104. Cr. foliolis oblongis utrinque attenuatis ſuperne glabris ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis nullis, racemis oppoſitifoliis, bracteis reflexis, leguminibus denſe hirſutis. *Ind. or.*

pag. 240.

Ad Cr. *vitellinam* Ker. Cr. *holoſericea* Nees. Mart.

Ad Cr. *incanam.* Cr. *hirta* Lag., *cubenſis* Cand. . Cr. *Dombeyana* Cand. leguminibus duntaxat glabriusculis differt. Nec Cr. *affinem* Cand. diverſam reor.

Poſt n. 69. *lupulina* Kunth. 105. Cr. erecta ramoſa, foliolis oblongo-linearibus obtuſis mucronatis ſupra ſcabris ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis capillaribus, racemis oppoſitifoliis, leguminibus polyſpermis. *Mexico.*

† *ſtriata* Cand. 106. Cr. foliolis ellipticis obtuſis mucronatis glabrinsculis, ſtipulis nullis, racemo terminali, floribus pendulis. *Ind. or.*

podocarpa Cand. 107. Cr. erecta hirſuta, foliolis obovatis obtuſis mucronatis, ſtipulis dimidiato-oblongis acutis, racemis oppoſitifoliis, leguminibus ſtipitatis glabris polyſpermis. *Afric. media.*

pag. 241.

Cr. *longifolia* Lam. eſt *Nevrocarpon* Desv.

pag. 242.

Ad *Coluteam.*

Poſt n. 3. *nepalenſis* Sims. 6. C. fruticoſa, foliolis ſubrotundo-ellipticis retuſis, racemis paucifloris nutantibus, callis vexilli papillaeformibus, leguminibus ſubcoriaceis pubeſcentibus. *Nepal.* Bot. mag. 2622.

C. *caſpica* M. B. (Sphaerophyſa Cand.)

C. *davurica* M. B. (Sphaerophyſa Cand.)

Ad *Sutherlandiam* R. Br.

microphylla Burch. Cand. 4. S. frutescens, foliolis oblongo-linearibus ramisque pubeſcentibus, pedunculis 2-3floris. *Afric. auſtr.*

Ad *Leſſertiam obtuſatam* *. (L. fruticoſa Lindl. in bot. reg. 970.)

pag. 243.

Ad *Leſſertiam* Cand.

diffuſa R. Br. 9. L. herbacea diffuſa, foliolis 8-10jugis elliptico-linearibus ſubemarginatis utrinque hirſutiusculis, racemis pedunculatis folia ſuperantibus, calycibus ebracteatis nigro-piloſis. *C. B. S.* (Galega dubia Jacqu.)

macroſtachya Cand. 10. L. baſi ſuffruticoſa erecta, foliolis 4-6jugis elliptico-oblongis obtuſis utrinque ſubpubeſcentibus, racemis paniculatis laxis folia longe ſuperantibus. *Afric. auſtr.*

brachyſtachya Cand. 11. L. baſi ſuffruticoſa erecta, foliolis 6-8jugis oblongo-linearibus obtuſis ſubtus ſubpubeſcentibus, racemis folio triplo brevioribus, leguminibus pendulis. *Afric. auſtr.*

falciformis Cand. 12. L. herbacea erecta, foliolis 8jugis linearibus acutiusculis, pedunculis axillaribus paucifloris patentibus, leguminibus falciformibus. *Afric. auſtr.?* Cand. legum. t. 46.

Ad *Erythrinam.*

Poſt n. 7. *rubrinervia* Kunth. 21. E. foliolis ſubrotundo-ovatis acuminatis ſubtus glaucis rubro-venoſis piloſiusculis, calycibus ſpathaceis ſupra fiſſis. *Nov. Granat.*

umbroſa Kunth. 22. E. foliolis triangulari-ovatis trinerviis glaberrimis, calycibus campanulatis ſpathaceis. *Caracas.*

Ad E. *Humeanam* * lege E. caffra *Bot. reg.*

pag. 244.

Ad *Rudolphiam* W.

dubia Kunth. 3. R. foliis ſubſagittato-cordatis acuminatis membranaceis glabris, petiolis articulatis marginatis, pedunculis 1floris, leguminibus longiſſime roſtratis. *Nov. Granat.* (Glycine ſagittata W. Syſt. 3. 197.)

pag. 245.

Ad *Bönninghauſiam vincentinam* * (Chaetocalyx vincentinus Cand.)

Poſt *Gronen* Lour.:

PAROCHETUS Hamilt..

communis Hamilt. 1. P. reptans, foliis ternatis, foliolis truncatis dentato-ſerratis. *Nepal.*

major Hamilt. 2. P. erectiusculus, foliis ternatis, foliolis obovatis retuſis crenatis. *Nepal.*

ODONIA Bertol.

tomentoſa Bertol. 1. O. ſcandens, foliis ternatis ellipticis utrinque tomentoſis, racemis axillaribus. *Hiſpaniol.* Opuſc. ſcientif. 4. p. 334.

ſpecioſa * 2. O. erecta, foliis ternatis oblongis ſubcoriaceis ſupra nitidis, floribus ſubracemoſis terminalibus. *Peru.* (Cytiſus ſpecioſus Loiſ., Collaea Cand. legum. t. 40.)

† *trinervia* * 3. O. erecta, foliis ternatis ellipticis obtuſis ſupra pubeſcentibus ſubtus ſubtomentoſis 3nerviis, pedunculis ſubſolitariis abbreviatis, laciniis calycis reflexis, leguminibus villoſiſſimis. *Ind. or.* (Collaea trinervia Cand. legum. t. 41.)

DUMASIA Cand.

villoſa Cand. 1. D. ramis volubilibus petiolisque villoſis, foliis ternatis ovato-oblongis acutiusculis, racemis axillaribus multifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 44. (Hedyſarum tiliaefolium Don.?)

pubeſcens Cand. 2. D. ramis volubilibus petiolisque ſubpubeſcentibus, foliis ternatis ovato-ellipticis obtuſis, racemis axillaribus paucifloris. *Nepal.* Cand. legum. t. 45.

SABINEA Cand.

florida Cand. 1. S. floribus praecocibus, foliolis 8jugis-elliptico-oblongis. *Inſ. Carib.* (Robinia florida Vahl. Syſt. 3. p. 246.)

dubia Cand. 2. S. floribus ſerotinis, foliolis 8jugis elliptico-oblongis, leguminibus ſtylo cirriformi coronatis. *Martinic.* (Robinia dubia Lam. Syſt. 3. 246. R. martinicenſis Perſ.)

ROBINIA

juxta characterem genericum exacte ſumtum non amplectitur niſi tres veras ſpecies:

R. *Pſeudacaciam*, *viſcoſam* et *hiſpidam*.

Valde dubiae ſunt: R. *aturenſis* *, *macrophylla* *, *glycyphylla* Poir., *amara* et *flava* Lour.

Sub *Swartzia* militat Robinia *tomentoſa* Poir., ſub *Cupania*, R. *rubiginoſa* Poir., ſub *Dalbergia* R. *ſcandens* W., ſub *Turpinia*, R. *glanduloſa* *.

CARAGANA Lam.

complectitur Robiniam *frutescentem*, *pygmaeam*, *grandiflοram* et *mollem* M B., tum *tragacanthoidem* Pall., *Chamlagu* Herit., *spinosam*, *Altaganam jubatam* et *Caraganam*, quae *Caragana arborescens* Cand. audit.

microphylla Cand. 11. C. foliolis sub-6jugis incanis retusis, petiolo stipulisque apice spinescentibus, radice repente. *Sibir.* (Robinia microphylla Pall.)

CORYNITIS *.

(Corynella tolerari nequit, cum graeca vox κορώνη cum appendicula latina *ella* haud jungenda sit: κορωνίτις vero auctoritatem classicam habet.)

domingensis * (Robinia domingensis Syst. 3. 245. Corynella paucifolia Cand. Character specificus a Candolleo enunciatus a veritate aberrat.)

polyantha * (Robinia polyantha Sw. Syst. 3. 246.)

HALIMODENDRON Cand.

argenteum Cand. (Robinia Halodendron Pall. Syst. 3. 246.)

pag. 249.

Ad *Dolichon.*

D. *tetragonolobus.* (Pisophocarpus Neck. Cand.)

D. *luteolus* Jacqu. (Vigna glabra Sav. mem. phaseol. 3. p. 8. Cand.)

Post n. 18. *glycinoides* Kunth. 51. D. racemis axillaribus pauciforis longe pedunculatis, calycis lacinia superiore latissima emarginata, foliolis ovato-oblongis obtusis mucronatis 3nerviis ramisque volubilibus strigillosis. *Peru.*

miniatus Kunth. 52. D. racemis longissime pedunculatis, calycis lacinia superiore maxima, leguminibus 3carinatis oligospermis, foliolis subrotundis coriaceis reticulato-venosis ramisque volubilibus glabris. *Cuba.* (Canavalia Cand.)

D. *gladiatus* Jacqu. (Malocchia Sav. Canavalia Cand.)

pag. 250.

D. *ensiformis* et *lineatus* Thunb. (Canavalia Cand.)

D. *giganteus* W. et *altissimus* sunt *Stizolobia* P. Br.

pag. 251.

D. *ruber* Jacqu. est *Hymenospron* *.

D. *rotundifolius* Vahl. (Canavalia obtusifolia Cand.)

D. *minimus* est *Glycine* Kunth.

D. *fabaeformis* Herit. (Cyamopsis psoraloides Cand.)

pag. 252.

Ad *Stizolobium* P. Br.

altiſſimum * 14. (Dolichos altiſſimus Syſt. 3. 250. Mucuna Cand.)

giganteum * 15. (Dolichos giganteus W. Syſt. 3. 250. Mucuna Cand.)

Mutiſianum * 16. St. volubile, foliolis oblongis glabriusculis, lateralibus ſubdimidiatis, racemis ſubcapitatis, bracteis ovatis obtuſis fuligineo-tomentoſis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth)

molle * 17. St. volubile, foliolis ellipticis acutis villoſo-tomentoſis, lateralibus ſubdimidiatis, racemis capitato-globoſis, bracteis acutis ſericeis, leguminibus acinaciformibus tomentoſis. *Nov. Granat.* (Negretia Kunth.)

macroceras * 18. St. volubile, foliolis ovatis acutiusculis ſupra laevibus ſubtus pubeſcentibus, ſpicis axillaribus longiſſimis, leguminibus latis oligoſpermis. *Braſil.* (Macroceratides Pſeudo-Stizolobium Radd. mem. di Modena, 18. p. 392. t. 5. f. 5.)

pag. 253.

Poſt *Stizolobium:*

PACHYRRHIZOS Rich.

(Radices tuberoſae.)

tuberoſus * 1. (Dolichos tuberoſus Lam. Stizolobium Syſt. 3. 252.)

angulatus Rich. Cand. 2. (Dolichos bulboſus L. Stizolobium Syſt. 3. 252.)

montanus Cand. 3. (Dolichos montanus Lour. Stizolobium Syſt. 3. 252.)

trilobus Cand. 4. P. volubilis, foliolis trilobis acuminatis pubeſcentibus, ſpicis elongatis, leguminibus linearibus. *China. Cochinchina.* (Dolichos trilobus Lour.)

Ad *Phaſeolum.*

Poſt n. 6. *cirroſus* Kunth. 34. Ph. volubilis cirroſus, foliolis ovatis obtuſis ſcabriusculis, racemis longiſſime pedunculatis, bracteis acutis calycem aequantibus, calycis lobis rotundatis. *Mexico.*

puberulus Kunth. 35. Ph. volubilis pubeſcens, foliolis ovatis cuſpidatis, racemis pedunculatis axillaribus, leguminibus lanceolato-cultriformibus glabris. *Caracas.*

truxillenſis Kunth. 36. Ph. volubilis retrorſum piloſus, foliolis ſubcordato-ovatis acuminatis appreſſo-pubeſcentibus, racemis longe pedunculatis, bracteis parvis deciduis, calycis lobo ſuperiori latiſſimo emarginato. *Peru.*

ſpecioſus Kunth. 37. Ph. volubilis pubeſcens, foliolis ovatis cuſpidatis ſubtus tomentoſis, pedunculis elongatis paucifloris, calycis lobo ſuperiore maximo emargi-

nato, reliquis acutis, floribus maximis. *Ad Orinocum.*

Ad Ph. *Pallar* Molin. (Ph. piloſus Kunth.)

Ad Ph. *inamoenum.* Ph. *deraſus* Schrank. et *Xuareſii* Zuccagn. varr.

pag. 254.

Ad Ph. *vulgarem.* Ph. *compreſſus* Cand. (romanus Sav.), *oblongus, ſaponaceus, tumidus, haematocarpus, ſphaericus, gonoſpermus* Sav. varr.

formoſus Kunth. 38. Ph. volubilis retrorſum hiſpidulus, foliolis triangularibus mucronatis piloſiusculis, racemis longiſſime pedunculatis, bracteis ſubrotundis nervoſis calycem aequantibus. *Nov. Hiſpan.* (Ph. ſylveſtris Kunth.)

pedunculatus Kunth. 39. Ph. volubilis retrorſum hiſpidulus, foliolis ovatis acuminatis glabriusculis ad marginem piloſis, racemis longiſſime pedunculatis, calycis lobo ſuperiori abbreviato emarginato, leguminibus elongatis linearibus. *Nov. Granat.*

linearis Kunth. 40. Ph. ſubvolubilis retrorſum piloſiusculus, foliolis ſubcordato-lincaribus obtuſis mucronatis hiſpidiusculis, racemis longiſſime pedunculatis, calycis lobo ſuperiori latiſſimo emarginato. *Amer. auſtr.*

Ph. *vexillatus.* (Dolichos Kunth.)

pag. 256.

Ad *Clitoriam.*

Cl. *falcata* Lam. et *rubiginoſa* Juſſ. pertinent ad Nevrocarpon Desv.

anguſtifolia Kunth. 13. Cl. volubilis glabra, foliolis lineari-lanceolatis obtuſis mucronatis, pedunculis axillaribus ſubſolitariis 1floris, dentibus calycis 2bracteati ſuperioribus breviſſimis. *Ad Orinocum.*

formoſa Kunth. 14. Cl. volubilis glabra, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, pedunculis axillaribus 1floris, bracteis oblongis calycem multo ſuperantibus, dentibus calycis 4 ſuperioribus breviſſimis. *Ad Orinocum.*

Cl. *multiflora* Sw. (Vilmorinia Cand.)

Cl. *polyphylla* Poir. 15. (Galactia pinnata Perſ. Syſt. 3. 257. Barbiera polyphylla Cand. legum. t. 39.)

pag. 257.

Ad *Galactiam* P. Br.

Ante n. 1. *ſimplicifolia* * 11. G. caule ſuffruticoſo procumbente, foliis ſimplicibus oblongis obtuſis ſubtus ſtrigoſis, pedunculis axillaribus geminis, calycibus nervoſis. *Popayan Columbiae.* (Cologania procumbens Kunth.)

Poſt n. 5. 6. *pulchella* * 12. G. volubilis, foliis ternatis oblongis obtuſis utrinque ſtrigilloſis ſubtus glaucescentibus, pedunculis axillaribus geminis, calycibus

hirſutis. *Nov. Hiſpan. Ad ſl. Amazonum.* (Cologania pulchella et ovalifolia Kunth.)

mexicana * 13. G. volubilis, foliis ternatis oblongo-linearibus ſubtus ſtrigoſis, pedunculis geminis axillaribus, calycibus piloſis. *Mexico.* (Cologania anguſtifolia et intermedia Kunth.)

G. *piloſa* Nutt. (G. cubenſis Kunth. *Cuba.*)

Juſſiecana Kunth. 14. G. ſuffruticoſa repens, foliis ternatis ellipticis ſubcoriaceis utrinque ſericeis ſubtus ſubtomentoſis, floribus axillaribus breviter pedunculatis ſubracemoſis, calycibus argenteo-ſericeis. *Ad Orinocum.*

glauceſcens Kunth. 15. G. ſuffruticoſa erecta, foliis ternatis elliptico-oblongis obtuſis coriaceis glabris ſupra nitidis ſubtus glauceſcentibus, racemis axillaribus congeſtis, calycibus leguminibusque ſericeis. *Quito.*

Poſt *Galactiam:*

HYMENOSPRON *.

ſericeum * 1. H. volubile, foliis ternatis ſubcordato-ellipticis mucronatis ſupra pubeſcentibus ſubtus calycibus leguminibusque ſericeis. *Nov. Granat.* (Dioclea ſericea Kunth.) *)

† *apurenſe* * 2. H. volubile, foliis ternatis ovato-oblongis mucronatis glabris, nervo venisque ſubtus ſtrigilloſis, leguminibus piloſiusculis. *Ad Orinocum.* (Dioclea apurenſis Kunth.)

rubrum * 3. H. volubile, foliis ternatis ovatis acutis glabris, racemis laxis. *Martinic.* (Dolichos ruber Jacqu. Syſt. 3. 251., Dioclea Jacquiniana Cand.)

pag. 260.

Ad *Orobum fruticoſum* Perſ. (Courſetia tomentoſa Cand.)

paſtoënſis * 37. O. caule fruticoſo, foliis elliptico-ſubrotundis ſubtus incano-villoſis, racemis longe pedunculatis folia aequantibus. *Alp. paſtoënſes Nov. Granat.* (Sesbania dubia Kunth. in Humb. nov. gen. 7. t. 660., Courſetia Cand.)

pag. 263.

Ad *Lathyrum.*

Poſt n. 20. † *bruttius* Tenor. 44. L. cirris 2phyllis, foliolis oppoſitis elliptico-oblongis, ſtipulis ſemiſagittatis ſe-

---

*) Dioclea * Syſt. 1. 556. . . „Diocles n'eſt presque connu, que pour avoir deſigné les haricots ſous le nom de Dolichos." Cand. legum. p. 380. Contra Diocles celeberrimus fuit auctor ῥιζοτομικοῦ (Schol. Nicandr. ther. v. 647.). Scripſit περὶ ὑγιεινῶν πρὸς Πλείσταρχον, in quo dedit τῶν ὀσπρίων κατάλογον. (Galen. fac. alim. 1. p. 303. 317. ed. Baſil. graec.) Secundus aetate famaque poſt Hippocratem. Plin. 26, 6. Plura fragmenta ſervavit Oribaſius, crebro ſententias ejus citat Athenaeus.

taceis, caule angulato nudiusculo leguminibusque glabris. *Calabria citerior.*

Ad L. *ſylveſtrem.* (L. longifolius Tenor.)

pag. 267.

Ad *Viciam.*

Poſt n. 35. *humilis* Kunth. 67. V. foliolis ſub-2jugis linearibus obtuſiusculis mucronulatis venuloſis, ſtipulis ſemiſagittatis. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 581.

Ad V. *gramineam* Sm. V. *andicola* Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 582. et *ſctifolia* Ej.

pag. 268.

Poſt n. 50. *pulchella* Kunth. 68. V. foliolis linearibus anguſtiſſimis acutis, ſtipulis ſemiſagittatis, pedunculis multifloris folia ſuperantibus. *Mexico.* Humb. nov. gen. 6. t. 583.

pag. 271.

Lipariae

unica ſpecies eſt *ſphaerica.* Reliquae *Prieſtleyae* Cand. quibus accedit P. *ericaefolia* Cand. (Borbonia Syſt. 3. 186.)

pag. 272.

Ad *Poiteam* Vent.

Campanilla Cand. 3. (Robinia latifolia Poir. Syſt. 3. 247.)

Ad *Sesbanam* Poir.

S. *grandiflora* Poir. (Agati Rheed. Cand.)

S. *aculeata* Poir. (S. exaſperata Kunth.)

Ad S. *pictam* Poir. S. *pachycarpa*, *leptocarpa*, *punctata*, *pubeſcens* Cand., *macrocarpa* Elliott. varr.

Ad S. *cannabinam* Poir. S. *paludoſa* Jacqu. fil., *gracilis et affinis* Schrad. varr.

pag. 273.

Ad *Indigoferam.*

Poſt n. 9. *monophylla* Cand. 88. I. foliis obovatis mucronatis venoſis incanis baſi ſtipulatis, racemis folia ſuperantibus, corollis leguminibusque ruſo-villoſis. *Nov. Holl.*

diphylla Vent. 89. I. foliis ovatis, altero terminali, laterali altero minori, racemis folia aequantibus, leguminibus oligoſpermis. *Afric. occid.*

Poſt n. 13. *peregrina* Cand. 90. I. foliolis oblongo-lincaribus acutis ſupra pubeſcentibus ſubtus punctatis, floribus geminis axillaribus ſubſeſſilibus, leguminibus 4gonis. *Ind. or.* (Lotus peregrinus N. L. Burm.)

virgata Cand. 91. I. foliolis obcordatis ariſtatis ſubcoriaceis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, racemis ſubſpicatis folia brevioribus, calycibus villoſis. *Ind. or.*

pag. 274.

Poſt n. 25. *Leſchenaultii* Cand. 92. I. foliolis ovalibus obtuſis, impari majori, racemis multifloris ſubſeſſilibus, leguminibus 4gonis. *Bengal.*

† *timorenſis* Cand. 93. I. foliolis obovato-oblongis caneſcentibus, racemis axillaribus petiolos aequantibus, leguminibus 4gonis. *Inſ. Timor.*

diverſifolia Cand. 94. I. foliolis oblongis caneſcentibus, terminali longiori, pedunculis paucifloris petiolos ſubexcedentibus, leguminibus deflexis pubeſcentibus. *Inſ. Maſcaren.*

gracilis * 95. I. caule diffuſo ramoſiſſimo glabriusculo, foliolis ellipticis mucronatis ſupra glabris ſubtus ſtrigillosis, ſtipulis ſubulatis, racemis paucifloris, leguminibus hirſutis reflexis oligoſpermis. *C. B. S.*

complanata Reichenb. 96. I. ramis ancipitibus, foliolis lanceolato-linearibus acutis ſubtus argenteis breviſſime appreſſo-ſtrigillosis, racemis multifloris terminalibus, calycibus albis. *C. B. S.*

pag. 276.

Poſt n. 48. *angulata* Lindl. 97. I. ramis angulatis purpureis foliolisque ſub-4jugis ovalibus emarginatis glabris, racemis folia aequantibus. *Nov. Holl.* Bot. reg. 991.

atropurpurea Roxb. 98. I. foliolis ovalibus retuſis piloſiusculis, racemis elongatis, leguminibus ſtrictis mucronatis. *Ind. orient. Nepal.* (I. Thibaudiana et leptoſtachya Cand.)

Doſua Hamilt. 99. I. foliolis ovalibus retuſis utrinque ramulisque denſe rufo-piloſis, ſpicis axillaribus folio brevioribus, ſtipulis linearibus hiſpidis. *Nepal.*

galegoides Cand. 100. I. foliolis ellipticis mucronatis utrinque ſubpubeſcentibus, racemis folio brevioribus, leguminibus erectis ſtrictis polyſpermis. *Ceilon.*

tephroſioides Kunth. 101. I. foliolis alternis oblongo-linearibus obtuſis ariſtatis ſubtus ſericeo-ſtrigoſis, racemis longiſſime pedunculatis, leguminibus pendulis 4gonis oligoſpermis. *Quito.* Humb. nov. gen. 6. t. 580.

truxillenſis Kunth. 102. I. foliolis oblongis obtuſis mucronatis utrinque ſtrigoſis, ramulis ferrugineis, racemis ſubſeſſilibus multifloris folio brevioribus, leguminibus ſubfalcatis oligoſpermis. *Peru.*

leſpedezioides Kunth. 103. I. foliolis ſpathulatis mucronatis ſtrigillosis ſubtus glauceſcentibus, racemis multifloris folia ſuperantibus, leguminibus reflexis ſub-8ſpermis. *Mexico.*

humilis Kunth. 104. I. procumbens ſericea, foliolis oblongis acutiusculis rigidis, racemis paucifloris folia longe ſuperantibus, leguminibus reflexis teretiusculis ſub-2ſpermis. *Peru.*

pag. 277.

Poſt n. 64. *heterotricha* Cand. 105. I. caule uncinato-ſetoſo, foliolis obovatis mucronatis ſtrigoſis, racemis pe-

duncularis folia ſuperantibus, leguminibus reflexis dupliciter piloſis. *C. B. S.* Burchell.

aſtragalina Cand. 106. I. caule erecto hiſpido, foliis 4jugis obovatis obtuſiſſimis utrinque villoſis ſubtus albidis, racemis folio brevioribus 4gonis hirſutiſſimis 2ſpermis. *Senegambia.*

ſeſſiliflora Cand. 107. I. foliis ſub-4jugis obovatis ramisque ſericeis, ſpicis axillaribus ſeſſilibus confertifloris folio brevioribus, leguminibus teretibus 4-6ſpermis. *Senegambia.*

Perrottetii Cand. 108. I. caule proſtrato foliisque 4jugis obovato-oblongis ſubtus punctatis utrinque pubeſcentibus, racemis folio brevioribus confertifloris, leguminibus oblongo-teretibus oligoſpermis. *Senegambia.*

Ad I. *ſenegalenſem* Lam. I. *linearis* Cand. Neque I. *aſpera* Cand. ſatis distincta,

Lagaſcae Cand. 109. I. erecta, ramis teretibus foliisque 5jugis obovato-oblongis mucronatis ſubtus apreſſo-ſetoſis, ſtipulis rufis ſcarioſis, racemis pedunculatis folia ſuperantibus, leguminibus reflexis. *Cheuchim* (mihi plane ignota).

pag. 279.

Ad *Galegam.*

† *tricolor* Hook. 4. G. herbacea (?) pubeſcens, foliolis oblongis mucronatis oblique venoſis, ſtipulis lanceolatis ſemiſagittatis, racemis multifloris ſpicatis, floribus cernuis. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 185.

Poſt *Güldenſtädtiam* Fiſch.:

NEVROCARPON Desv.

ſimplicifolium Kunth. 1. N. fruteſcens erectum, foliis ſimplicibus ellipticis emarginatis glabris ſubtus glauceſcentibus, nervo venisque pubeſcentibus, pedunculis axillaribus bifloris. *Ad Orinocum.*

macrophyllum Kunth. 2. N. arboreſcens, foliis ternatis ſupra hirſutis ſubtus villoſis, foliis ſubrotundo-ellipticis utrinque attenuatis, pedunculis axillaribus bifidis racemiferis. *Nov. Granat.*

anguſtifolium Kunth. 3. N. fruteſcens, foliis ternatis glabris ciliatis ſubtus glaucis, foliolis lineari-lanceolatis obtuſis mucronatis, pedunculis axillaribus 1floris. *Nov. Granat.*

guianenſe Desv. 4. N. herbaceum glabriusculum, foliis ternatis ſubtus ſericeis, foliolis lanceolatis mucronatis, pedunculis aggregatis 1floris abbreviatis. *Guiana.* (Crotalaria guianenſis Aubl., longifolia Lam. Syſt. 3. 241.)

ellipticum Desv. 5. N. herbaceum volubile, ramis ferrugineo-hirſutis, foliis ternatis ſubtus pubeſcentibus, foliolis oblongis, pedunculis 1floris. *Hiſpaniola.* (Clitoria rubiginoſa Juſſ. Perſ.) Hanc e *Guadalupa apetalam* miſit Bertero. ? Martia phyſalodes Le-

andr. in *Brafil.* nec a Leandro nec a Schrankio ſcienter deſcripta.

falcatum Cand. 6. N. herbaceum volubile, foliis ternatis ſupra nitidis ſubtus ramisque hirſutis, pedunculis ſub-3floris, leguminibus falcatis. *Hiſpaniola. Portorico.* (Clitoria falcata Lam. Syſt. 3. 256.)

BRONGNIARTIA Kunth.

mollis Kunth. 1. Br. foliis 4jugis ſubtus ramisque villoſis, foliolis ovato-ellipticis acutiusculis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Nov. Hiſpan.* Legumen intus ſubſtantia ſpongioſa farctum. Humb. nov. gen. 6. t. 587.

podalirioides Kunth. 2. Br. foliis 2-5jugis utrinque appreſſo piloſis, ramis glabris, foliolis elliptico-oblongis mucronatis, pedunculis axillaribus geminis 1floris. *Nov. Hiſpan.* Corolla perſiſtit. Humb. nov. gen. 6. t. 588.

thermoides * 3. Br. foliis multijugis ramisque ſericeo-lanatis, foliolis oblongis obtuſis mucronatis, pedunculis axillaribus ſubgeminis 1floris calycibusque hirſutis. *Nov. Hiſpan.* Corolla ſubperſiſtens: legumen abbreviatum. Peraltea lupinoides Kunth. in Humb. nov. gen. 6. t. 589.

Lotus *ſubpinnatus* Lag. del. Eſt enim *Anthyllis chilenſis* Cand.

pag. 285.

Achyronia arborea * eſt *Carmichaëlia auſtralis* R. Br.

pag. 291.

Ad *Phacam.*

Ph. *floridana* W. (Glottidium Desv. Cand.)

pag. 292.

Poſt n. 10. *denſifolia* Sm. 19. Ph. decumbens ramoſa laevis, foliis pinnatis multijugis obovatis emarginatis ſubtus villoſis, ſtipulis ovatis concavis, racemis pedunculatis oblongis denſis, leguminibus ovatis turgidis laeviusculis. *California.*

mollis Kunth. 20. Ph. diffuſa tomentoſa, foliis pinnatis multijugis oblongis obtuſis utrinque ſericeo-villoſis, ſtipulis ovatis acutis, racemis longe pedunculatis compactis. *Mexico.*

Candolleana Kunth. 21. Ph. erecta pubeſcens, foliis pinnatis multijugis linearibus, ſtipulis vaginantibus, racemis paucifloris folio brevioribus, leguminibus elliptico-oblongis. *Mexico.* (Ph. triflora Cand.)

pag. 295.

Ad *Aſtragalum.*

Poſt n. 35. *Aborigínum* Richardſ. 222. A. ſuffruticoſus erectus, foliis 6jugis lanceolato-linearibus incano-pubeſcentibus, racemis axillaribus laxis folia ſuperantibus. *Amer. arctic.* Aborigines veſcuntur radicibus.

pag. 297.

Poſt n. 56. *ſtipulatus* Don. 223. A. foliolis obovato-oblongis mucronatis glabris, ſtipulis maximis oblique cordatis, racemis ſpicatis tenuifloris folia ſubſuperantibus, leguminibus compreſſis cernuis. *Nepal.* Bot. mag. 2380.

pag. 299.

Poſt n. 79. *macrorrhizus* Don. 224. A. foliolis ovalibus mucronatis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis connatis, pedunculis 3floris axillaribus folia excedentibus, leguminibus ſubulatis ſericeis. *Nepal.*

pag. 301.

Poſt n. 105. *ſucculentus* Richardſ. 225. A. decumbens glabriuſculus, foliolis ovalibus obtuſis, ſtipulis 3angularibus, ſpicis confertis pedunculatis folio brevioribus. *Amer. arctic.*

pag. 302.

Poſt n. 113. *bidentatus* Kunth. 226. A. erectiuſculus, foliolis lineari-oblongis emarginato-2dentatis glabris, ſtipulis vaginantibus, racemis compactis folia ſuperantibus. *Amer.?* Humb. nov. gen. 6. t. 584.

pag. 304.

A. *reptans* Humb. videtur varietas culta glabriuſcula A. *ſtriguloſi* Kunth.

pag. 305.

Poſt n. 158. *nubigenus* Don. 227. A. foliolis ovalibus mucronatis denſe piloſis, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus, calycibus inflatis, leguminibus villoſiſſimis. *Nepala.*

pag. 306.

Poſt n. 171. *arcticus* * 228. A. ſubacaulis ſericeus, foliolis ovali-oblongis, ſtipulis petiolaribus, faſciculis paucifloris, leguminibus erectis oblongis acuminatis. *Inſ. Melvill.* (Oxytropis R. Br.)

pag.

pag. 310.

Ad *Kennediam* Vent.

Poſt n. 1. *cordata* Lindl. 7. K. foliis cordatis late ovatis acutiusculis, racemis multifloris. *Nov. Holl.* Bot. reg. 944.

K. *Comptoniana* Link., non *.

tabacina Labill. 8. K. foliolis ovato-oblongis mucronatis piloſiusculis, ramis retrorſum piloſis, racemis folia ſuperantibus. *Nov. Caledon.*

Ad *Stylosanthen* Sw.

Poſt n. 1. *humilis* Kunth. 8. St. caule fruticoſo ramoſo hinc pubeſcente, foliolis oblongis ciliatis, ſtipulis hiſpidis, floribus aggregatis bracteatis, leguminibus reticulatis ſtylo uncinato terminatis. *Ad Orinoc.* Humb. nov. gen. 6. t. 594.

glutinoſa Kunth. 9. St. caule herbaceo procumbente foliolisque oblongis glutinoſo-piloſis, floribus axillaribus ſeſſilibus ſolitariis. *Nov. Hiſpan.* Humb. nov. gen. 6. t. 595.

gracilis Kunth. 10. St. caule herbaceo erecto hinc pubeſcente, foliolis linearibus pubeſcentibus, ſtipulis hiſpidis, capitulis involucratis, leguminibus glabris apice uncinato-ariſtatis. *Nov. Granat.* Humb. nov. gen. 6. t. 596.

pag. 311.

Ad *Zorniam* Mx.

thymifolia Kunth. 7. Z. fruticoſa, foliis conjugatis oblongis ſubtus pubeſcentibus margine calycibus bracteisque glanduloſo-punctatis, fructibus muricatis. *Mexico.*

pubeſcens Kunth. 8. Z. herbacea ramoſa, foliis conjugatis oblongo-lanceolatis utrinque pubeſcentibus, bracteis ovatis punctatis ciliatis, fructibus 5-6articulatis muricatis. *Ad fl. Magdalen.*

glochidata Reichenb. 9. Z. herbacea ramoſa, foliis conjugatis linearibus, bracteis ſagittato-ovatis 5nerviis ciliatis, fructibus glochidato-aculeatis. *Senegambia. Guiana.* (Z. gracilis Cand.)

dictyocarpa Cand. 10. Z. herbacea, foliis conjugatis lanceolatis, bracteis ſagittato-ovatis acuminatis ſubglanduloſis ciliatis, fructibus inermibus glabris reticulatis. *Nov. Holl.*

Z. *diphylla* Perſ. in duas ſpecies a Smithio (Rees cyclop.) dirimitur, orientalem alteram, alteram occidentalem. Illa, Z. *anguſtifolia* Sm. diſtinguitur bracteis punctato-glandulosis et fructus aculeis retrorſum ſcabris. Haec Z. *reticulata* Sm. differt bracteis reticulatis eglanduloſis et fructus aculeis glabris.

Z. *tetraphylla* Mx. (Myriadenus tetraphyllus Desv. Cand.)

Z. *pulchella* et *elegans* Perſ. (Phyllodium Desv., Dicerma Cand.)

Ad *Hedysarum.*

H. *maculatum.* Desmodium Perrottetii Cand. var.

Post n. 1. *Oliverii* * 129. H. fruticosum incano-pubescens, foliis orbiculatis mucronatis glaucis, racemis pauciforis laxis. *Ad Euphratem.* (H. nummulariifolium Cand. in ann. sc. nat. 4. p. 102., Taverniera nummularia Cand. legum. t. 52.)

pag. 312.

H. *spartium.* (Taverniera Cand.)

H. *biarticulatum.* (Dicerma Cand.)

angustifolium Kunth. 130. H. fruticosum, ramis virgatis, foliis lineari-lanceolatis mucronatis subtus pubescentibus, racemis soliteriis, bracteis ciliato-hispidis, lomentis 1-6articulatis hispidulis. *Mexico.*

H. *barbatum.* (Nicolsonia cayennensis Cand. legum. t. 51.)

H. *lappaceum* Forsk. (Taverniera Cand.)

infractum * 131. H. caule angulato flexuoso-infracto, foliolis stipulisque ovatis acutis, racemis axillaribus simplicibus pubescentibus, lomentis glabris. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

molliculum Kunth. 132. H. suffruticosum ramosum villosum, foliolis subrotundis mucronatis, terminali retuso, racemis laxifloris, lomentis uncinato-hispidulis. *Patria?*

venustulum Kunth. 133. H. suffruticosum appresso pubescens, foliolis oblongo-ellipticis subtus sericeis glaucescentibus, racemis terminalibus sessilibus abbreviatis, calycibus barbatis, lomentis hispidiusculis. *Cumana.* (Nicolsonia Cand.)

rhombifolium Ell. 134. H. herbaceum pubescens, foliis rhomboideis obtusis subcoriaceis reticulato-rugosis, floribus paniculatis, lomenti articulis venosis pubescentibus. *Carolina.*

lineatum Mx. 135. H. herbaceum repens, ramis viridi-lineatis, foliis subsessilibus, foliolis subrotundis glabriusculis, racemis elongatis laxis parvifloris, lomenti articulis lenticularibus. *Carolina.*

Wade Vand. 136. H. suffruticosum, foliolis ovato-lanceolatis ciliatis, racemis oppositifoliis longissimis, pedicellis ternis, lomentis scabris 3articulatis. *Brasil.*

Post n. 11. *tuberculosum* Labill. 137. H. radice tuberculosa, suffruticosum, foliis simplicibus ternatisque obovatis subtus pilosiusculis, stipulis 2fidis cuspidatis, racemis erectis terminalibus aggregatis, lomentis pubescentibus. *Nov. Caledon.*

sambucense Don. 138. H. fruticosum, foliolis subrotundo-ovalibus mucronulatis villosis subtus canescentibus, stipulis lanceolatis mucronatis, racemis secundis, dente calycis superiori latiori emarginato. *Nepal.*

timorense * 139. H. fruticosum, foliolis rhombeis supra pubescentibus subtus incano-villosis, lateralibus multo minoribus, racemis plurimis paniculatis, leguminibus pubescentibus. *Inf. Timor.* (Desmodium Cand.)

gyroides Roxb. 140. H. fruticosum, foliolis ellipticis pilosiusculis, terminali maximo, racemis plurimis in paniculam dispositis, leguminibus hirsutis. *Ind. or.*

pag. 313.

H. *uncinatum* Jacqu. (H. caripense Kunth.) H. *ancistrocarpon* Ledeb. var.

stipulaceum Sess. 141. H. caule erecto ramoso piloso, foliolis ovatis obtusiusculis, stipulis horizontalibus oblique ovato-lanceolatis acuminatis ciliatis, racemis terminalibus subpanicu.atis. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

Alamani * 142. H. caule erecto angulato ramoso foliolisque ovatis acutis glabriusculis, stipulis lanceolatis acuminatis patulo-reflexis, racemi terminalis pedicellis geminis, bracteis lanceolatis caducis, lacinia calycis inferiore elongata. *Mexico.* (Desmodium Cand.)

pag. 314.

H. *boreale* Nutt. per omnem *Amer. arcticam* crescit. H. *Mackenzii* Richards. in Franklin's journ. p. 745.

pag. 315.

Post n. 46. *Razumovianum* Fisch. Cand. 143. H. caule erecto herbaceo, foliolis oblongo-linearibus utrinque subpubescentibus, spicis pedunculatis folia superantibus, alis calyce duplo longioribus carina dimidio brevioribus, lomenti articulis incanis reticulato-subrugosis. *Deserta Orenburg.*

altaicum Fisch. 144. H. caule erecto, foliolis elliptico-oblongis subtus appresse pubescentibus, spicis oblongis folia superantibus, alis calyce longioribus carinam subaequantibus, germinibus pubescentibus 2articulatis. *Imaus.*

venustum Fisch. 145. H. caule erecto, foliolis ellipticis utrinque appresse pubescentibus incanis, spicis oblongis folia subsuperantibus, alis calycem subaequantibus carina vexillum superante brevioribus, leguminibus villosis. *Ad Imaum.*

lasiocarpon Ledeb. 146. H. caule erecto, foliolis ovato-lanceolatis subpubescentibus, racemis elongatis axillaribus, bracteis pedicellos superantibus, carina vexillum alas aequans excedente, lomentis pilosis. *Imaus.*

rytidocarpon Cand. 147. H. caule ascendente, foliolis ellipticis obtusis subtus pubescentibus, racemis spicatis ovatis pedunculatis, alis calyce duplo longioribus, vexillo carinam superante, lomentis rugoso-reticulatis. *Sibir.*

splendens Fisch. 148. H. caule abbreviato, foliolis sub-3jugis ovatis argenteo-sericeis, pedunculis scapiformibus elongatis racemiferis, bracteis pedicellos excedentibus, alis calyce brevioribus, lomentis reticulatis sericeis. *Sibir.*

H. *Vespertilionis.* (Christia lunata Mönch., Lourea Vespertilionis Desv. Cand.)

pag. 316.

Poſt n. 57. *arboreum* Hamilt. 149. H. arboreſcens, foliolis ovalibus retuſis ramulisque hirſutiſſimis, ſtipulis cordatis amplexicaulibus cuſpidatis, racemis elongatis ebracteatis hirtis, laciniis calycis lanceolatis plumoſis. *Nepal.* (Erythrina arboreſcens Roxb.)

H. *ſpirale* Sw. H. *tenellum* Kunth. var. ex *Amer. auſtr.*

Poſt n. 61. *Loureirii* * 150. H. herbaceum procumbens glabrum, foliis inferioribus ſimplicibus reniformibus, ſuperioribus ternatis longe petiolatis, racemis terminalibus pauciſloris. *China auſtr.* (H. reniforme Lour., Lourea reniformis Cand.)

pag. 317.

Ad H. *incanum* Sw. H. *cinereum* Kunth. var. e *Mexico.* Humb. nov. gen. t. 599.

Ad H. *ſupinum* Sw. H. *cajanifolium* Kunth. ex *Amer. auſtr.* Humb. nov. gen. t. 598.

Pryoni * 151. H. caule ſuffruticoſo erecto glabriusculo, foliolis oblongis acutis ſupra glabris ſubtus fericeis, lateralibus minoribus, racemis axillaribus folia excedentibus. *Ind. or.* (H. viridiflorum N. L. Burm.)

Roxburghii * 152. H. caule ſuffruticoſo erecto tereti glabro, foliolis oblongis acuminatis ſupra glabris ſubtus appreſſe pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis, racemis terminalibus laxis, pedicellis elongatis ſubaggregatis. *Ind. or.* (Deſmodium diffuſum et laxiflorum Cand.)

floribundum Don. 153. H. fruticoſum erectum, ramis 3gonis hirſutis, foliolis ovatis mucronatis ſubtus villoſo-tomentoſis, ſtipulis lanceolatis ſubulatis, racemis multifloris, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (Deſmodium multiflorum Cand.)

ruſeſcens * 154. H. fruticoſum, ramis teretibus rufo-villoſis, foliolis ovato-ellipticis obtuſis mucronatis ſupra glabris ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis lanceolatis ſubulatis elongatis, racemis terminalibus paniculatis. *Ind. or.* (Deſmodium rufeſcens Cand.)

concinnum * 155. H. fruticoſum, ramis teretibus foliolisque obovatis mucronatis parallele venoſis ſubtus pubeſcentibus, ſtipulis lanceolato-linearibus, racemis terminalibus, pedicellis geminis. *Ind. or. Nepal.* (Deſmodium concinnum Cand.) D. paucinervium et Leſchenaultii Cand. varr.

H. *retroflexum.* (Deſmodium dubium Lindl. in bot. reg. 967.)

H. *mauritianum* W. (Deſmodium trichocaulon Cand. *Nepal.*)

laxum * 156. H. caule volubili 3gono glabriusculo, foliolis oblongis acuminatis ſubtus ſubpubeſcentibus, lateralibus ſemicordatis, medio baſi attenuato, panicula terminali laxiſſima, pedicellis geminis. *Nepal.* (Deſmodium laxum Cand.)

oxyphyllum * 157. H. caule fruticoſo erecto tereti ramulisque ſubangulatis glabris, foliolis oblongis acuminatis

ſubtus pallidis laevibus, ſtipulis ſubulatis, paniculis terminalibus laxis, pedicellis aggregatis. *Nepal.* (Deſmodium oxyphyllum Cand.)

vdrians Labill. 158. H. herbaceum ramoſum glabrum, foliolis mucronatis venuloſis; inferioribus ellipticis, ſuperioribus oblongo-linearibus, racemis terminalibus laxis flexuoſis, lomentis piloſiusculis. *Nov. Caledon.* (Deſmodium ſpartioides Cand.?)

pag. 318.

H. *parvifolium* * non parviflorum. (H. tenellum Don.)

pag. 319.

Poſt n. 97. *Ammoxylon* * 159. H. fruticoſum erectum; foliis oblongis, utrinque attenuatis ſubtus ramulisque compreſſis incano-pubeſcentibus, ſtipulis minimis acutis, racemis lateralibus ſimplicibus. *Inſ. Maſcaren. Ceilon.* (Ornithopodium zeylanicum Burm. zeylan. t. 82., Bremontiera Ammoxylon Cand.)

H. *triquetrum.* Deſmodium auriculatum Cand. var.

pag. 321.

Ad *Hedyſara dubia.*

dioecum Don. 160. H. fruticoſum, foliis ternatis, foliolis ovalibus obtuſis coriaceis ſubtus glaucis pubeſcentibus, ſtipulis ovatis acutis, racemis axillaribus multifloris, floribus bracteatis dioecis. *Nepal.*

rigidum Ell. 161. H. caule erecto ramoſiſſimo tomentoſo, foliis ternatis, foliolis oblongis obtuſis reticulatis pubeſcentibus, panicula ramoſa, bracteis acuminatis. *Carolina.*

Wallichianum * 162. H. ſuffruticoſum, ramis angulatis pubeſcentibus, foliis ternatis; foliolis ovatis acutiusculis utrinque ſericeo-villoſis, racemis ſubſpicatis, bracteis villoſis acuminatis flores ſuperantibus. *Nepal.* (H. retuſum Don., Deſmodium angulatum Cand.)

ſubſpinoſum Fiſch. 163. H. ſuffruticoſum erectum, foliis pinnatis incano-ſericeis, foliolis ellipticis, ramis pedunculisque perſiſtentibus ſpinoſis, petiolis planiusculis, ſpicis pedunculatis folia ſuperantibus. *Sibir.*

pag. 323.

Ad *Turpiniam* Perſ.

montevidenſis * 2. T. fruticoſa, foliis abrupte pinnatis 2jugis glanduloſo-punctatis, foliolis obovatis retuſis, pedunculis aggregatis in racemum elongatum diſpoſitis. *Monte Video.* (Pſoralea tetraphylla Poir. Syſt. 3. 201., Robinia glanduloſa * Syſt. 3. 248., Poiretia pſoraleoides Cand.)

AMICIA Kunth.

glandulosa Kunth. 1. A. foliolis obovatis subemarginatis, vexillo obcordato, lomentis 5articulatis. *Quito.* Humb. nov. gen. 6. t. 600.

Zygomeres Cand. 2. A. foliolis obcordatis mucronatis, vexillo obovato, lomentis 2articulatis. *Mexico.*

PICTETIA Cand.

squamata Cand. 1. P. foliolis orbiculatis longe mucronatis, stipulis spinosis erectis, racemis laxis 3-7floris. *Inf. Carib.* (Robinia squamata Vahl. Syst. 3. 246.)

aristata Cand. 2. P. foliolis obovatis venulosis longe mucronatis, stipulis spinosis patulis, racemis laxis 3-7floris. *Hispaniola. Inf. Carib.* (Aeschynomene aristata Jacqu. Syst. 2. 321.)

obcordata Cand. 3. P. foliolis obcordatis subtus recurvo-mucronatis, stipulis ovato-lanceolatis inermibus, racemis paucifloris. *Hispaniola.* Cand. legum. t. 47. f. 1.

Desvauxii Cand. 4. P. foliolis 1-2jugis approximatis oblongis utrinque attenuatis cuspidato-spinosis, stipulis spinosis rectis, pedunculis 1floris, leguminibus continuis. *Hispaniola.* (Robinia spinifolia Desv.)

ternata Cand. 5. P. foliis ternatis spathulatis mucronatis, stipulis spinosis patulis, pedunculis 1floris. *Hispaniola.* Cand. legum. t. 47. f. 2.

pag. 325.

Ad *Ornithopoda.*

Post n. 2. *roseus* Dufour. 6. O. procumbens villosus, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis acutis, pedunculis folio longioribus apice foliatis, lomentis rectis compressis rostratis. *Sabuleta Aquitaniae.*

O. *ebracteatus* Brot., *repandus* Poir. et *scorpioides.* (Astrolobium Desv. Cand.)

pag. 327.

Ad *Dalcam.*

Post n. 11. *astragalina* Kunth. 25. D. fruticosa ramosissima, foliolis multijugis oblongo-lanceolatis acutis subtus pubescentibus glandulosо-punctatis, spicis oppositifoliis cylindricis, calycibus glandulosis hirsutis. *Quito.*

ayavacensis Kunth. 26. D. fruticosa, ramis villosis, foliolis 7-8jugis oblongis mucronatis subtus pubescentibus glandulosо-punctatis, spicis cylindricis oppositifoliis. *Quito.*

pag. 328.

Post n. 20. *microphylla* Kunth. 27. D. fruticosa procumbens, foliolis 10jugis oblongis obtusis crassiusculis glabris

subtus glanduloso-punctatis, spicis oblongo-cylindricis, calycibus sericeis glandulosis. *Quito.*

pectinata Kunth. 23. D. herbacea, foliolis multijugis linearibus acutiusculis complicatis glabris glanduloso-punctatis, spicis ovato-oblongis, calycibus sericeis glandulosis. *Mexico.*

CLASSIS XVIII.

pag. 331.

Ad *Lühcae* W. characterem adde: Stamina exter. sterilia, vel in squamas 5 connata, vel basi tantum juncta crispata. (Haec sunt nectaria penicilliformia, quae igitur delenda.) Stigma 5lobum. Capsl. 5locularis 5valvis medio septifera. Sem. 2seriata apice alata.

Apatelia Cand. delenda: est enim *Sauravia* W.

Archytea Mart. Cal. 5sepalus persistens. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Antherae didymae 2loculares, loculis antice longitudinaliter dehiscentibus. Stylus simplex. Capsl. 5locularis polyspermа. Sem. linearia. *Tiliaceae.*

Schlechtendalia *. (Mollia Mart.) Cal. 5sepalus. Pet. 5. Phalanges staminum 5. Stigma simplex. Capsl. 2locularis. Sem. 2seriata apice alata. *Tiliaceae.*

---

pag. 332.

Bubroma tomentosum * habitat et in *Java.* (Blum. flor. jav. p. 85.)

pag. 333.

Abroma fastuosum Salisb. (A. mollis Blum. *Java.*)

pag. 334.

Ad *Citrum.*

javanica Blum. 13. C. petiolis marginatis, foliis ovalibus obtusissimis crenulatis, fructibus oblongis: (pulpa amara.) *Java.*

pag. 336.

Ad *Melaleucam.*

Post n. 20. *uniflora* Hortul. 37. M. foliis oblongo-linearibus abbreviatis obtusis glaucis sub-1nerviis punctatis patulo-recurvis glabris, floribus lateralibus sessilibus. *Nov. Holl.*

pag. 338.

Ad *Velloſiam.*

V. *candida* Mik. (V. aloaefolia Mart., tubiflora Kunth. in Humb. nov. gen. 7. p. 155. Radia tubiflora Ach. Rich. Kunth. ſyn. 1. p. 300.)

aſperula Mart. 4. V. ſcapo germinibusque ſcabris, foliis linearibus obtuſiusculis ſerrulatis. *Braſil.*

pag. 340.

Ad *Lüheam* W.

ſpecioſa W. 1. L. foliis ovatis obtuſis inaequaliter dentatis ſupra glabris ſubtus caneſcentibus, racemis terminalibus ſimplicibus pauciflоris. *Braſil.*

candicans Mart. 2. L. foliis ovato-oblongis acuminatis argute ſerratis ſubtus incano-tomentoſis, floribus ſolitariis. *Mexico.* (Alegria candida Seſſ. Syſt. veg. 2. 582.?)

villoſa Mart. 3. L. foliis late ovatis acutiusculis denticulatis utrinque villoſis, floribus paniculatis. *Braſil.*

divaricata Mart. 4. L. foliis oblongis inaequilateris acutis inaequaliter ſerratis ſupra glabris ſubtus incanis, paniculae ramis divaricatis. *Braſil.*

paniculata Mart. 5. L. foliis ſubcordato-oblongis inaequaliter ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus incano-tomentoſis, floribus paniculatis. *Braſil.*

grandiflora Mart. 6. L. foliis ovato-oblongis acutis inaequaliter ſerratis ſupra pubeſcentibus ſubtus tomentoſis, pedunculis racemoſis bracteatis fuſco-tomentoſis, ſquamis ſtamineis discretis. *Braſil.*

ARCHYTEA Mart.

triflora Mart. *Braſil.* Arbuscula, foliis faſciculatis ſpathulatis acutiusculis glabris glauceſcentibus, pedunculis 3floris.

SCHLECHTENDALIA *.

ſpecioſa * *Braſil.* Arbor foliis alternis ovato-oblongis acutis repando-dentatis ſubtus lepidotis, floribus ſubcorymboſis albis. (Mollia ſpecioſa Mart. nov. gen. t. 60.)

pag. 341.

Ad *Hypericum.*

H. *bracteatum* Don. (H. coriaceum Blum. *Java.*)

H. *patulum* Thunb. (H. javanicum Blum. *Java.*)

H. *Lechenaultii* Cand. (H. triflorum Blum.)

pag. 346.

Poſt n. 67. *ſongaricum* Ledeb. 111. H. caule compreſſo, foliis cordato-ellipticis obtuſis glaucis punctatis, calycibus acuminatis. *Ditio Kirgiſorum.*

pag. 348.

H. *elegans* W. habitat et in *Bohemia* ac *Moravia.*

CLASSIS XIX.

pag. 356.

Poſt n. 2699. *Grahamia* *. (Graemia Hook.) Anthodium ſimplex polyphyllum reflexum. Rec. tuberculoſum paleaceum. Pappus paleis 5 fimbriatis ariſtatis.

Lychnophora Mart. Anthodium imbricatum pauciflorum. Rec. nudum. Papp. duplex paleaceus, paleis interioribus lingulatis.

pag. 357.

Poſt n. 2725. *Monenteles* Labill. Anthodium duplici ſerie polyphyllum lanatum. Rec. nudum. Flosculi plerique ♀ graciles, unicus ☿ centralis. Pappus ſeſſilis piloſus ſcaber.

pag. 358.

Poſt n. 2734. *Oligoſporus* Caſſin. Anthodium 5phyllum 3-5florum. Flores diſci 4fidi, radii parvi 3fidi. Rec. nudum. Papp. 0.

pag. 359.

Dumerilia Lag. idem genus ac *Jungia* L. fil.

pag. 362.

Poſt n. 2817. *Mataxa* *. Anthod. ſimplex polyphyllum. Rec. paleaceum. Sem. denſiſſime lanata, coronula dentata.

---

pag. 370.

Ad *Cirſium pungens* * Cnicus ſamniticus Tenor. pertinere videtur.

pag. 372.

Cirſium anglicum Lobel. habitat et in *Palatinatu.*

Ad C. *ciliatum* M. B. pertinet et C. *ferrulatum* Ej. n. 47. ubi: ciliis deorſum decreſcentibus (non dureſcentibus) legendum.

pag. 377.

C. *rigens* *. (Cnicus Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 385.

Ad *Carduum.*

†*faſciculiflorus* Viv. 45. C. foliis decurrentibus pinnatifidis nudiusculis, laciniis palmato-angulatis inciſis ſpinoſis, floribus axillaribus ſeſſilibus faſciculatis, calycis glabri ſquamis ſpinoſis appreſſis. *Corſica.*

Ad C. *carlinoidem* Gouan. C. chrysacanthus Tenor. Spinulae foliorum terminatae mucrone flavo valido. Gouan. illuſtr. p. 62.

pag. 398.

Ad *Centauream.*

Poſt n. 34. *Nuttallii* * 152. C. caule ſimpliciusculo glabro, foliis ſeſſilibus oblongo-lanceolatis venoſis, inferioribus denticulatis, ſuperioribus integerrimis, floribus ſolitariis, ſquamis calycis erectis pectinato-ciliatis. *Ditio Arcanſa Amer. bor.* (C. americana Nutt. in Journ. of Philad. 2. p. 117. Colla in act. taurin. vol. 31. t. 6.)

C. *filiformis* Viv. app. ad fl. corſic. magnopere dubia: forte varietas C. maculoſae Lam.

pag. 425.

Ad *Chryſocomam.*

Ad Chr. *liburnicam* *. (Chr. Linoſyris *β*. Sav. bot. etruſc. 3. p. 145.)

pag. 434.

Ad *Liatrim* Gärtn.

Poſt n. 20. *intermedia* Lindl. 21. L. caule humili paniculato piloſiusculo, foliis linearibus elongatis ſcabriusculis nervoſis marginatis, pedunculis foliоſis, ſquamis anthodii rigidis ſubfoliaceis appreſſis. *Canada.* Bot. reg. 948.

pag. 437.

Ad *Vernoniam gracilem* Kunth. V. flexuoſa Sims. in bot. mag. 2477. var.

V. *trichocarpha* * eſt *Lychnophora* Mart.

An et V. *dichocarpha* *? Character reſpondet: habitus adverſatur.

pag. 449.

Poſt *Güntheriam:*

GRAHAMIA *.

aromatica * *Chili.* Herba annua ramoſa glanduloſo-glutinoſa, foliis alternis lineari-lanceolatis dentatis, inferioribus pinnatifidis, pedunculis ſolitariis terminalibus, floribus flavis. (Graemia aromatica Hook. exot. fl. t. 189.)

LYCHNOPHORA Mart.

(Frutices alpeſtres.)

brunioides Mart. 1. L. foliis lineari-lanceolatis acutis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus ſeſſilibus, anthodio villoſo ſub-3floro. *Braſil. Peru.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 4.

ericoides Mart. 2. L. foliis linearibus elongatis ſubflexuoſis obtuſiusculis margine revolutis ſubtus tomentoſis, floribus terminalibus capitatis ſeſſilibus, anthodio ſub-3floro. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 5.

Pinaſter Mart. 3. L. foliis linearibus obtuſis viſcidulis rugulosis margine revolutis ſubtus tomentoſis, ramis teſſellatis, capitulis globoſis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 6. (Vernonia trichocarpha Syſt. 3. 437. prope ad hanc accedit.)

villoſiſſima Mart. 4. L. foliis patentiſſimis linearibus elongatis obtuſiusculis ſupra baſi lanatis ſubtus ramisque teſſellatis denſe lanato-tomentoſis, capitulis globoſis lanatis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 7.

ſtaevioides Mart. 5. L. foliis ſubcordato-linearibus obtuſiusculis patentiſſimis ſupra glabris margine revolutis ſubtus tomentoſis, capitulis hemiſphaericis lanatis. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 8.

rosmarinifolia Mart. 6. L. foliis ſubcordato-lineari-lanceolatis acuminatis patulis ſupra linea media villoſis ſubtus revolutis ramisque tomentoſis, capitulis multifloris, anthodio 1floro. *Braſil.* Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 9.

hakeaefolia Mart. 7. L. foliis ſpathulato-linearibus erectis mucronulatis ſubtus revolutis tomentoſis, nervo dilatato, ramis pulvillato-tomentoſis, capitulis globoſis, anthodio 4floro. *Braſil.* L. ſalicifolia Mart. in Regensb. Denkw. 2. t. 10.

pag. 453.

Ad *Bidentem.*

Poſt n. 26. *tenuifolia* Labill. 40. B. foliis pinnatifidis glabris, laciniis linearibus integerrimis, pedunculis 2fidis corymboſis, floribus radiatis, involucro anthodium acquante. *Nov. Caledon.*

pag. 457.

Ad *Ixodiam* R. Br.

Ammobium * 2. I. herbacea erecta ramosa, caule alato tomentoso, foliis lanceolatis decurrentibus, ramis 1floris. *Nov. Holl.* (Ammobium alatum R. Br. Bot. mag. 2459.)

Ad *Balsamitam* Desf.

Post n. 5. *annua* Delil. 7. (Tanacetum annuum L. p. 486.)

pag. 474.

Gnaphalium candicans Kunth. (Gn. consanguineum Gaudich. *Inf. Falkland.*)

pag. 477.

Gnaphalium quintuplinerve Hamilt. (Gn. cynoglossoides Trevir. in nov. act. nat. cur. 18. p. 200.)

pag. 482.

Post *Gyneteriam* W.:

MONENTELES Labill.

spicatus Labill. 1. M. foliis decurrentibus oblongis serratis subtus tomentosis, glomerulis spicatis. *Nov. Caledon.*

sphacelatus Labill. 2. M. foliis decurrentibus lanceolatis obtusiusculis undulatis dentatis subtus incanis, floribus capitatis, squamis anthodii exterioribus nigris. *Nov. Caledon.*

pag. 492.

Artemisia saxatilis Kit. nuper et in *Alsatia* prope Colmariam inventa est. (C. C. Gmel. fl. bad. 4. p. 605.)

pag. 495.

Artemisia Sieversiana Ehrh. (A. Sacrorum Ledeb.?)

pag. 499.

Post *Cotulam:*

OLIGOSPORUS Cassin.

emarginatus Cassin. *Inf. Falkland.* Herba foliis imbricatis oblongis carnosis apice membranaceis bilobis, floribus solitariis sessilibus.

pag. 501.

Ad *Trixin* P. Br.

Post n. 7. *senecioides* Hook. 8. Tr. foliis amplexicaulibus pubescentibus, inferioribus oblongis sinuato-pinnatifidis, superioribus lanceolatis angulato-sinuatis,

pedunculis 2fidis erectis elongatis. *Chili.* Hook. exot. flor. t. 101.

pag. 503.

Ad *Plaziam brafilienfem* *. (Auguſta grandiflora Leandr. in act. monach. 7. t. 14.) Tertia ſpecies dubia:

parviflora * 3. Pl. foliis oblongo-lanceolatis, floribus paniculatis. *Braſil.* (Auguſta parviflora Leandr.)

pag. 504.

Ad *Naſſaviam* Commerſ.

Gaudichaudii Caſſin. 2. N. caule ramoſiſſimo, foliis parvis imbricatis ſquarroſis lineari-lanceolatis ſpinoſo-dentatis. *Inſ. Falkland.* (Maſtigophorus Gaudichaudii Caſſin. in Dict. des ſcienc. nat. 34. p. 222.)

pag. 506.

Jungia ferruginea L. fil. (Dumerilia paniculata Cand.) Secunda ſpecies eſt J. *axillaris* * (Dumerilia Cand.)

pag. 515.

Conyza pinnatifida Roxb. (Baccharis trifurcata Trevir. in nov. act. nat. cur. 13. p. 201.)

pag. 524.

Ad *Inulam.*

Poſt n. 45. *caſpica* Ledeb. 52. I. foliis amplexicaulibus cordato-lanceolatis glabris margine denticulato-ſcabris, pedunculis paniculatis villoſis, ſquamis anthodii linearibus ſquarroſis. *Ad Volgam.*

pag. 532.

Ad *Aſterem.*

Poſt n. 96. *leptophyllus* Desf. 167. A. foliis linearibus glaberrimis, ſuperioribus filiformibus ſubſquamaceis, paniculae corymboſae ramis ſquamuloſis, ſquamis anthodii arcte appreſſis ovatis obtuſiusculis. *Patria?*

pag. 537.

Poſt n. 155. *robuſtus* Nees. 168. A. caule glabro ramoſo, foliis omnibus amplexicaulibus oblongo-lanceolatis ſerratis nitidis, ramis 1floris foliоſis, anthodio laxo foliaceo, ſquamis lanceolato-linearibus elongatis. *Patria?*

pag. 538.

Ad A. *laevigatum* W. del. ſyn. A. *glaucus* Nees.

pag. 546.

Ad *Cinerariam.*

Poſt n. 8. *hypoleuca* Reichenb. 95. C. foliis ovatis fuſco-denticulatis ſubtus petiolisque late marginatis denſe niveo-lanatis, corymbo compoſito laxo terminali, anthodiis glabratis. *C. B. S.*

pag. 549.

Poſt n. 57. *venuſta* Reichenb. 96. C. caule ſimplici foliisque glaucis glaberrimis, radicalibus longe petiolatis ſubcordatis angulatis, caulinis amplexicaulibus lanceolatis obtuſe dentatis, pedunculis ſquamoſis, ſquamis anthodii latiusculis. *C. B. S.*

pag. 551.

C. *Bergeriana* * mutetur in *Bergianam* *.

pag. 554.

Ad *Senecionem.*

Poſt n. 26. *nervatus* Reichenb. 186. S. foliis ſubſeſſilibus lanceolatis utrinque attenuatis baſi laciniato-ſubpinnatifidis ceterum integerrimis nervoſo-venoſis lineatis ſubtus tomentoſis, corymbo compoſito terminali. *C. B. S.*

pag. 557.

Poſt n. 69. *litoralis* Gaudich. 187. S. foliis oblongo-lanceolatis integerrimis coriaceis, floribus ſubcorymboſis. *Inſ. Falklund.*

pag. 559.

S. *montanus* W. cum *rupeſtri* Kit. jungatur.

pag. 560.

Poſt n. 105. *fragrans* Fiſch. 188. S. caule ramoſo glaberrimo, foliis radicalibus petiolatis amplexicaulibus lyratis repando-dentatis, caulinis pinnatifidis linearibus revolutis, panicula corymboſa. *Sibir.?*

Poſt n. 112. *difficilis* Dufour. 189. S. caule erecto lanato, foliis amplexicaulibus craſſiusculis 2pinnatifido-ſinuatis, laciniis obtuſis dentatis, pedunculis ſubcorymboſis lanatis, involucro anthodii glabri 0, ſquamis apice barbatis. *Hiſpan.* Ann. des ſcienc. nat. 5. t. 11.

pag. 561.

S. *lycopifolius* Poir. habitat in regno *Neapol.* (Cineraria ceratophylla Tenor.)

pag. 567.

Arnica lanigera Tenor. (A. floccoſa Bertol.)

pag. 573.

Ad *Bellium.*

crassifolium Moris. 3. B. caespitosum, foliis radicalibus petiolatis orbiculatis oleraceis integerrimis glaberrimis enerviis, scapo 1floro subpubescente. *Sardinia.*

†*nivale* Requien. 4. B. foliis subspathulatis elongatis pilosiusculis, scapo 1floro villoso, pappo 4aristato. *In cacuminibus montium Corsicae.*

pag. 577.

Ad *Verbesinam.*

Post n. 17. *buphthalmoides* Link. 31. V. caule suffruticoso decumbente, foliis lanceolatis utrinque attenuatis dentatis triplinerviis scabris subtus ramisque hirsutiusculis, pedunculis elongatis 1floris. *Monte Video.* Link. et Ott. Abbild. t. 49.

pag. 585.

Ad *Pyrethrum.*

Post n. 12. *diversifolium* Hook. 48. P. caule subramoso pilis articulatis hirsuto, foliis lanceolatis amplexicaulibus, inferioribus incisо-pinnatifidis in petiolum dilatatum decurrentibus, summis integerrimis, pedunculis 1floris, pappo paleaceo-aristato. *Nov. Holl.* Hook. exot. fl. t. 215.

pag. 590.

Post *Relhaniam:*

MATAXA *.

capensis * *C. B. S.* Suffrutex ramosus, foliis pinnatifidis carnosis glaberrimis, laciniis linearibus acutis, pedunculis 1floris. (Lanipila Burch. it. 1. p. 259. Lasiospermum radiatum Trevir. in nov. act. nat. cur. 13. p. 205.)

pag. 600.

Ad *Achilleam.*

biaristata Bivon. 65. A. caule stricto simplici foliisque 2pinnatifidis amplexicaulibus viridibus sublanatis, rhachi lata subdentata, laciniis approximatis lanceolatis, lacinulis incisis cuspidato-aristatis, corymbo compacto. *Sicil.?* Flores sulfurei.

dentifera Reichenb. (non Cand.) 66. A. caule decumbente pubescente, foliis subtripinnatifidis laxis teneris, rhachi subintegerrima, laciniis remotis patentibus, lacinulis linearibus abbreviatis acutis dentiformibus, corymbis laxe paniculatis, anthodio ovato. *Patria?* Flores albidi.

pag. 620.

Millera biflora L. ad *Deliliam* * p. 674.

pag. 622.

Collaea procumbens *. (Sebaſtiania heterophylla Bertol. opuſc. ſcientif. 4. p. 336.)

pag. 632.

Arctotis grandiflora Jacqu. mutetur in A. *Maſſonianam* * 26. A. foliis pinnatifidis denticulatis arachnoideis 3plinerviis, ſquamis anthodii exterioribus appreſſis, radio ſtramineo-extus rubeſcente. *C. B. S.* Priſtina phraſis et ſynonyma deleantur.

pag. 634.

Crepis radicata Forsk. ad *Thrincium* p. 666.

pag. 637.

Crepis tenuifolia W. (Cr. pulcherrima Fiſch. Link.)

pag. 640.

Hieracium murorum. (H. Lachenalii C. C. Gmel.)

pag. 641.

Ad H. *glaucum* All. H. *bupleuroides* C. C. Gmel. var. H. *ramoſum* Kit. (H. Mertini C. C. Gmel. fl. bad. 4. 591. *Franconia.*)

pag. 652.

Borkhauſii Candollei * habitat in *Sicilia.* (Crepis glanduloſa Guſſon.)

pag. 653.

Poſt n. 23. *ſardoa* * 26. B. caule aſcendente foliisque runcinatis laevibus, caulinis pauciſſimis ſagittatis, pedunculis ſolitariis elongatis, ſquamis anthodii glabris margine ſcarioſis. *Sardinia.*

In diſtinguendis Borkhauſia et Leontodonte, utpote eosdem characteres gerentibus, magnopere haereo, ni ad caulem foliatum Borkhauſiae, ſcapum verò ſubiflorum Leontodontis reſpiciatur. Ceterum Leontodon ſalinus Pollin. loco *Pollich.*, eſt ſphalma.

pag. 654.

Ad *Prenanthem.*

glomerata Reichenb. 45. Pr. caule ſuffruticoſo, ramis virgatis ſulcatis, foliis ſeſſilibus oblongis coriaceis ſpinuloſo-dentatis ſubtus reticulatis ſublanatis, anthodiis ſeſſilibus floccoſis. *C. B. S.*

pag. 662.

Tragopon orientalis et in *Palatinatu* et ditione *badenſi* habitat. (C. C. Gmel. fl. bad. 4. p. 579.)

pag.

pag. 664.

Picris lyrata Delil. ad Thrinciam p. 666.
Apargia hiſpida W. (A. hirta C. C. Gmel. fl. bad. 3. p. 280.)

pag. 665.

Ad *Apargiam Villarſii* W. A. Roſani Cand.

pag. 666.

Ad *Thrinciam.*

cauleſcens Trevir. 5. Thr. caule ramoſo hiſpido, foliis radicalibus lyratis, caulinis cordato-lanceolatis. *Ad pyramidas Aegypti.* (Crepis radicata Forsk. Syſt. 3. 634., Picris lyrata Delil. Syſt. 3. 664.)

pag. 668.

Ad *Helminthiam.*

humifuſa Trevir. 2. H. caule proſtrato glabro, foliis caulinis ovato-lanceolatis hiſpidis, involucri foliolis ovatis. *Patria?*

pag. 669.

Ad *Hypochoerin.*

Poſt n. 7. *arenaria* Gaudich. 11. H. caule ramoſo erecto, foliis pinnatifidis hiſpidulis, anthodio piloſo. *Inſ. Falkland.*

pag. 674.

Deliha Berterii *. (Millera biflora L. Syſt. 3. 620.) Habitat et in *Cuba.*

CLASSIS XX.

pag. 680.

Poſt n. 3000. *Gongora* R. et P. Sepala 3 exter. patentia aequalia, ſuperius dorſo columnae inſertum, 2 interiora parva, margini columnae inſerta, decurrentia. Labellum gibboſum vomeriforme acuminatum dentato-ſinuatum. Columna ſubclavata.

Coelogyne Lindl. Sepala patentia. Labellum cucullatum cum columna alata ultra antheram producta baſi articulatum. Stigma 2labiatum infundibuliforme.

Poſt n. 3009. *Notylia* Lindl. Sepala 4, inferius 2lobum labello ſuppoſitum. Labellum divaricatum unguiculatum integrum medio calloſum. Columna libera teres acuminata. Anthera poſtica 1locularis ſtigmati parallela.

Tribrachia Lindl. Sepala patentia, exteriora cum basi columnae connata, interiora nana. Labellum posticum integrum unguiculatum. Columna apice bicirrosa. Anthera terminalis opercularis.

pag. 681.

Post n. 3022. *Megachinium* Lindl. Sepala exteriora basi connata, superius maximum basi 2calloſum, interiora nana. Columna plana lata abbreviata apice 2cuspidata. Labellum integerrimum cum pede columnae elastice articulatum.

pag. 682.

Post n. 3032. *Alamania* Laxarf. Sepala 6 nervosa subtus calcar mentientia. Labellum basi glanduloſum. Columna 3cuspidata.

pag. 683.

Post n. 3049. *Gonyanthes* Blum. Cal. corollinus tubuloſus 3dentatus. Antherae 3 ovales fauci sub stigmate insertae. Stigma 3lobum, antherarum auriculis adnatis. Capſ. infera 3quetra 1locularis. Sem. minuta ariſtata. *Cytineae.*

---

pag. 684.

Orchis laxiflora Lam. (O. Tabernaemontani C. C. Gmel. fl. bad. 3. p. 535.)

pag. 701.

Ad *Ophryn.*

Post n. 6. *canaliculata* Viv. 20. O. labello 3lobo canaliculato, lobo medio 2fido, lateralibus acuminatis hiſpidis, ſepalis interioribus minimis hiſpidis, ſpica 3-4-flora. *Corſica.*

pag. 704.

Ad *Limodorum.*

Post n. 6. ½*ſphacrochilos* * 11. L. calcare cylindrico germen aequante, labello rotundato undulato, ſepalis erectis, ſcapo vaginato. *Corſica.* L. abortivo nimis affine. (L. ſphaerolabium Viv.)

Pelexia adnata *. (P. ſpiranthoides Lindl. in Bot. reg. 985.)

pag. 719.

Ad *Vandam* R. Br.

Post n. 2. *recurva* Hook. 7. V. calcari obtuſo germen ſubaequante, ſepalis ovalibus concavis, labello 3dentato, racemis axillaribus pendulis, foliis alternis lanceolatis acutis. *China.* Hook. exot. fl. t. 187. (Sarcanthus roſtratus Lindl. in bot. reg. 981.)

pag. 720.

Ad *Eulophiam* R. Br.

Poſt n. 6. *ſtreptopetala* Lindl. 10. E. calcari conico abbreviato, lobo medio labelli rotundato emarginato, ſepalis oblongis obtuſis, interioribus baſi tortis, ſcapo ſimplici racemifero, foliis lineari-lanceolatis nervoſis. *Patria?* Bot. reg. 1002.

pag. 724.

Ad *Cymbidium*.

Poſt n. 33. *ſtapelioides* Link. 59. C. labello 3lobo, lobo medio orbiculari, lateralibus erectis plica transverſa antrorſum prominente tuberculoque longitudinali inſignibus, ſepalis acutis maculatis, ſcapo abbreviato decumbente ſub-1floro, foliis oblongis nervoſis. *Braſil.* Link. et Ott. Abbild. t. 52.

pag. 726.

Ad *Cataſetum* Rich.

criſtatum Lindl. 5. C. ſepalis patentibus canaliculatis, interioribus tenuioribus, floribus laxe ſpicatis, labello multifido criſtato, foliis oblongis utrinque attenuatis undulatis. *Braſil.* Bot. reg. 966.

ſemiapertum Hook. 6. C. ſepalis late ovatis concavis patentibus ſubſecundis, labelli ore contracto integro, lateribus minute denticulatis, ſpica compacta foliis breviori. *Braſil.* Hook. exot. fl. t. 215.

macrocarpon Kunth. 7. C. ſepalis patulis oblongis acutis nervoſis conformibus, labello emarginato roſtellato, ſcapo paucifloro, capſulis grandibus pyriformibus 6coſtatis. *Ad Cayennam.* Humb. nov. gen. 7. t. 631.

pag. 727.

Ad *Colaceen* Lindl.

aromaticus * 4. C. labello 3lobo ſemicylindrico 2ſeriatim piloſo, lobis lateralibus lanceolatis ſubſerratis, medio duplici, ſuper. brevi truncato, infer. ſpathulato apice recurvo ſerrulato, ſcapo 1floro, bulbo pleiophyllo. *Mexico.* (Maxillaria aromatica Hook. exot. fl. t. 219.)

parvulus * 5. C. labello 3lobo obtuſo venoſo intus glandula longitudinali piloſa, ſepalis lineari-lanceolatis, ſcapo 1floro, bulbo 2phyllo. *Braſil.* (Maxillaria parvula Hook. exot. fl. t. 217.)

Poſt *Pleionem* Don.:

Gongora R. et P.

quinquenervia R. et P. 1. G. labello 2dentato, ſepalis exterioribus concavis, foliis lanceolatis 5nerviis. *Peru.*

atropurpurea Hook. 2. G. labello ſub-7dentato, ſepalis exterioribus planis, foliis oblongis nervoſo-plicatis. *Inſ. Trinit.* Hook. exot. fl. t. 178.

COELOGYNE Lindl.

fimbriata Lindl. *China.* Herba repens paraſitica, bulbis ovalibus diphyllis, flore ſolitario diphyllo, ſepalis viridibus, labello fulvo fimbriato criſtato. Bot. reg. 868.

pag. 728.

Ad *Oncidium* Sw,

Poſt n. 3. *Papilio* Lindl. 19. O. ſcapo ancipiti articulato paucifloro, ſepalis ſuperioribus linearibus longiſſimis, inferioribus diſtinctis ovato-lanceolatis undulatis, columna 2corni, alis fimbriatis, foliis ſolitariis ovalibus maculato-pictis. *Inſ. Trinit.* Bot. reg. 910.

Poſt n. 12. *pumilum* Lindl. 20. O. panicula pyramidali erecta folia oblonga obliqua rigida ſubaequante, labello 3lobo criſtato, alis columnae integerrimis, ſepalis obtuſis, ſuperioribus maculatis. *Braſil.* Bot. reg. 920.

Poſt n. 16. *puber* Lindl. 21. O. labello panduriformi 2criſtato, criſtis dentatis, ſepalis obovatis faſciatis, inferiori 2lobo, ſcapo ramoſo, foliis lanceolatis nervoſis. *Braſil.* Bot. reg. 1007.

pag. 729.

Cyrtopodium Woodfordii Sims. (C. glutiniferum Radd. Mem. di Modena, tom. 19. p. 221. t. 6.)

pag. 730.

Stelis micrantha Sw. melius ſic: St. folio ſolitario oblongo obtuſo coriaceo, floribus ſpicatis ſubſecundis 3quetris, ſepalis interioribus apiculatis labello conformibus. Hook. exot. fl. t. 158.

Stelis ophioglossoides Sw. melius ſic: St. foliis lanceolatis tenuibus obtuſis apice recurvis in petiolum radicalem decurrentibus, floribus racemoſis directione variis obſolete hexagonis, ſepalis interioribus truncatis nanis. Bot. reg. 935.

pag. 731.

Poſt *Pleurothallin* R. Br.:

NOTYLIA Lindl.

punctata Lindl. (Pleurothallis punctata Lindl. in bot. reg. 759. Syſt. 3. 731.)

multiflora Lindl. (Pleurothallis ſagittifera Kunth. in Humb. nov. gen. 1. t. 91. Syſt. ib.)

TRIBRACHIA Lindl.

pendula Lindl. *Senegambia.* Bulbi ovati 1phylli, folia fubtus purpureo-maculata, fcapus pendulus, flores fpicati bracteati virefcentes. Bot. reg. 963.

pag. 734.

Poft *Ornithidium* Salisb.:

MEGACLINIUM Lindl.

falcatum Lindl. *Sierra Leone Afric. occid.* Bulbus oblongus diphyllus, foliis oblongis emarginatis 2plicatis, fcapus fpicifer, flores fubfecundi rubro-variegati. Bot. reg. 989.

pag. 735.

Ad *Cattleyam* Lindl.

Loddigefii Lindl. 2. C. diphylla, floribus racemofis rofeis. *Brafil.* Hook. exot. fl. t. 186.

Forbefii Lindl. 3. C. diphylla, pedunculis 2floris, bractea parva (non fpathacea), floribus pendulis lurido-flavis. *Brafil.* Bot. reg. 953.

pag. 736.

Ad *Epidendrum.*

Poft n. 14. *ellipticum* Graham. 31. E. caule ramofo, foliis diftichis patentibus ellipticis obtufis, labello 3partito fimbriato, lobis lateralibus dilatatis, intermedio minori, fepalis patulis. *Brafil.* Hook. exot. fl. t. 206.

pag. 738.

Ad *Dendrobium* Sw.

Poft n. 6. *Calceolaria* Hook. 24. D. caule erecto, foliis diftichis linearibus carnofis, racemo laterali, fepalis ellipticis undulatis reticulatis, labello cucullato. *Ind. or.* Hook. exot. fl. t. 184.

pag. 739.

Dendr. *pubefcens* Hook. pertinet ad *Octomeriam.*

pag. 742.

Poft *Stenogloffum* Kunth.:

ALAMANIA Laxarf.

punicea Laxarf. *Mexico.* Herba parafitica e bulbillo diphylla, fcapo fpicifero, floribus puniceis. Annal. des fcienc. nat. 3. p. 452.

pag. 743.

Ad *Calanthem ftriatam* R. Br. pertinere videtur Limodorum unguiculatum Labill. nov. Caledon. t. 25.

pag. 744.

Ad *Octomeriam* R. Br.

pubeſcens * 3. (O. Dendrobium pubeſcens Hook. Syſt. 3. 739.)

ſtellata * 4. O. foliis lanceolatis acutis 5nerviis carnoſis, ſcapo ſpicifero ſepalisque patentibus acuminatis nervoſis extus ferrugineo-pubeſcentibus, labello 3lobo, lobo medio elongato acuminato, lateralibus abbreviatis. *Nepal.* (Eria ſtellata Lindl. in bot. reg. 904.)

roſea * 5. O. bulbo elongato apice foliaceo, foliis petiolatis lanceolatis, ſpicis ſub-3floris ſeſſilibus. *China.* (Eria roſea Lindl. in bot. reg. 978.)

pag. 746.

Cypripedium guttatum Sw. creſcit et ad *Moſquam.* Fiſcher.

pag. 750.

Poſt *Rhopium* Schreb.:

GONYANTHES Blum.

candida Blum. *Java.* Herba paraſitica tenera, ſcapo 4gono 3-4-floro. Annal. des ſcienc. nat. 3. p. 369.

pag. 754.

Ariſtolochia haſtata Nutt. mutanda in A. *polyrrhizon* Plukn., cum prior A. haſtata Kunth. p. 751. jam adſit.

CLASSIS XXI.

pag. 761.

n. 3121. Ad *Oſiryae* characterem adde: Flores ♀: ſub ſquamis ſingulis germina 2 hirſuta digyna.

pag. 762.

Poſt n. 3134. *Caperonia* Hilar. Flores monoeci ſ. dioeci. ♂ Cal. 5fidus. Petala 5 cum ſtaminibus 10 columnae inſerta, quae deficit in floribus ♀. Stylus 3fidus, ſtigmatibus multipartito-flabellatis. Capſ. 3cocca.

---

pag. 766.

Ad *Pothon.*

coriaceus Graham. 30. P. foliis oblongis undulatis coriaceis venoſis, nervo marginali, petiolis apice nodoſis, ſcapo

teretiusculo foliis breviori, ſpadice cylindrico ſpatham lanceolatam ſuperante. *Braſil.* Hook. exot. fl. t. 210.

Harriſii Graham. 31. P. foliis lanceolatis acuminatis venoſis, nervo marginali, petiolis apice nodoſis, ſcapo teretiusculo folia ſubaequante, ſpadice cylindrico ſpatham lanceolatam reflexam ſubaequante. *Braſil.* Hook. exot. fl. t. 211.

pag. 770.

Arum crinitum Ait. legit et in *Sardinia* Moris.

pag. 771.

Ad *Caladium* Vent.

Poſt n. 19. *pedatum* Hook. 23. C. caulescens, foliis longe petiolatis cordatis profunde 3partitis, lacinia ſuperiore maxima pinnatifida, inferioribus auriculatis inciſis, pedunculis petiolo brevioribus, ſpatha cucullata involuta. *Braſil.* Hook. exot. fl. t. 206.

pag. 787.

Ad *Euphorbiam.*

Poſt n. 23. *globoſa* Sims. 210. E. erecta articulata, articulis obovatis tuberculatis, flore ſolitario terminali, appendiculis involucri palmatis. *Afric. auſtr.?* Bot. mag. 2624.

pag. 795.

E. *marginata* Purſh. (E. variegata Coll. in act. taurin. vol. 31. t. 7.)

pag. 798.

E. *ſaxatilis* Jacqu. (E. corſica Requien.)

pag. 800.

Poſt n. 191. *papilloſa* Hilar. 211. E. umbella papilloſo-pubeſcente, appendiculis involucri rotundatis, foliis oblongo-linearibus mucronulatis integerrimis laevibus glaucis. *Braſil.*

pag. 808.

Ad *Caricem.*

Poſt n. 24. *criſtata* Schwein. 268. C. ſpica compoſita globoſa capitata bracteata, ſpiculis inferne ♂, fructibus ovato-lanceolatis roſtratis alatis ciliato-ſerratis divergentibus ſquamas oblongo-lanceolatas excedentibus. *Penſylvan.*

pag. 811.

Poſt n. 63. *muskingumenſis* Schwein. 269. C. ſpiculis ſuboctonis approximatis oblongis inferne ♂, bractea baſilari ſetacea, fructibus lanceolatis compreſſis bi-

dentatis alatis nervoſis glabris ſquamas lanceolatas duplo ſuperantibus, culmo 3quetro ſuperne ſcabro. *Ad fl. Muskingum, receptum a fl. Ohio.* (C. arida Schweinitz et Torrey monogr. Caric. americ. in ann. of the Lyc. of N. York.)

pag. 812.

Poſt n. 80. *ſiccata* Dew. 270. C. ſpica compoſita, ſpicula terminali obtuſa androgyna ſuperne ♂, inferioribus ſubquaternis approximatis, bractea baſilari ovato-lanceolata, fructibus acuminatis 2fidis compreſſis nervoſis margine ſcabris ſquamas lanceolatas ſubaequantibus. *Maſſachuſetts, Amer. bor.* Silliman's amer. journ. vol. 10. t. F. f. 18.

pag. 815.

C. *longifolia* R. Br. melius infra poſt n. 237. collocatur.

pag. 816.

C. *ariſtata* Dew. (C. Torreyana Dew. in Silliman's amer. journ. 10. p. 47.)

Poſt n. 125. *nigro-marginata* Schwein. 271. C. ſpicis ♀ binis ovatis ſeſſilibus approximatis, culmis ſubternis, fructibus ovatis ſub-3quetris roſtratis 2dentatis pubeſcentibus ſquamam ovatam acutiusculam aequantibus, ſtigmatibus 3. *Penſylvania.*

pag. 817.

Poſt n. 126. *floridana* Schwein. 272. C. ſpicis ♀ ſubquaternis aggregatis ovatis ſeſſilibus bracteatis, infima ſubremota, fructibus ovalibus baſi attenuatis convexo-planis 2dentatis ſquamas cuſpidatas aequantibus. *Florida.*

pag. 818.

Poſt n. 145. *Waſhingtoniana* Dew. 273. C. ſpicis ♀ diſtinctis oblongo-cylindricis erectis pedunculatis, fructibus ovalibus compreſſis utrinque attenuatis ore integro roſtratis glabris ſquamas oblongas acutiusculas aequantibus, culmo 3quetro. *Nov. Hamptonia Amer. bor.* Silliman's amer. journ. 10. t. D. f. 14.

C. *ſubulata* Mx. (C. Michauxii Dewey.)

pag. 821.

Poſt n. 175. *Hitchcockiana* Dew. 274. C. ſpicis ♀ ſubternis pedunculatis erectis, floribus remotiusculis, fructibus inflatis ſtriatis roſtratis ſquamas mucronatas ſubaequantibus, culmo 3quetro foliisque ſcabro-pubeſcentibus. *Amer. bor.* Silliman's amer. journ. 10. t. E. f. 15.

Daviſii Dew. 275. C. ſpicis ♀ binis ternisve ſubapproximatis ovatis ſeſſilibus paucifloris, infima ſaepe radicali

longe pedunculata, fructibus globoso-3quetris rostratis pubescentibus squamas ovatas subaequantibus, culmo decumbente. *Massachusetts Amer. bor.*

pag. 822.

Ad C. *conoidcam* W. Mühl. C. *blanda* Dew.

pag. 826.

Post n. 237. *longifolia* R. Br. ex n. 107. C. spicis ♂ binis, androgynis cylindricis nutantibus longe pedunculatis aggregatis, fructibus compressis nervosis 3gynis squamam ovatam aristatam aequantibus. *Nov. Holl.*

pag. 830.

Ad *Uncinium* Pers.

Macloviana Gaudich. 10. U. spica dense imbricata filiformi, squama infima longe aristata, fructibus oblongis plano-convexis villosis, culmo 3quetro laevi, foliis strictis planis. *Inf. Falkland.*

pag. 831.

Ad *Scleriam* Berg.

Post n. 13. *capillaris* R. Br. 32. Scl. culmo 3quetro foliisque filiformibus canaliculatis retrorsum scabriusculis, panicula simplici rara nutante, floribus ♂ monandris, nucibus laevibus. *Nov. Holl.*

Scl. *pygmaea* Nees in Sieb. agrost. n. 108. eadem cum Scl. *tenui* Retz. videtur.

pag. 834.

Cnemidostachys salicifolia Mart. (Microstachys ramosissima Hilar.)

pag. 840.

Ad *Urticam.*

Post n. 58. *involucrata* Sims. 112. U. caule ramoso hirsuto, foliis ovalibus 3nerviis crenatis lucidis ad apices ramorum congestis, paniculis sessilibus. *Inf. Carib.* Bot. mag. 2481.

pag. 841.

Post n. 79. *pellucida* Labill. 113. U. suffruticosa, foliis cordato-oblongis acuminatis crenato-dentatis sub-3plinerviis pellucido-punctatis subtus tomentosis, glomerulis paniculatis axillaribus folio brevioribus. *Nov. Caledon.*

pag. 844.

Ad *Böhmeriam* Jacqu.

Post n. 10. *repens* Nees. 30. B. caule repente ramoso foliisque oblongis obtusis serratis 3nerviis hirsutis, cymis 2fidis glomeratis axillaribus longe pedunculatis. *Brasil.*

pag. 846.

Poſt n. 29. *radicans* Mart. 31. B. caule baſi radicante, foliis oblongis acutis apice ſerratis 3nerviis ſubtus ſcabris, cymis breviſſimis decompoſitis divaricatis axillaribus. *Braſil.*

pag. 847.

Ad *Buxum.*

† *coriacea* * 8. B. ſpicis ♂ axillaribus breviter pedunculatis, antheris demum incurvis, floribus ♀ gemmaceis, ſtylo 2fido, foliis oblongis acuminatis baſi obſolete 3nerviis. *Nepal.* (Pachysandra? coriacea Hook. exot. fl. t. 148.)

pag. 850.

Ad *Crozophoram* Neck.

Poſt n. 3. *peltata* Labill. 11. Cr. foliis ſpathulatis glabris integerrimis ſubglandulosis, floribus racemoſis, bracteis ♂ peltatis. *Nov. Caledon.*

pag. 852.

Ad *Xanthium canadenſe* Mill. (X. occidentale Bertol. opuſc. ſcientif. 4. p. 337.)

Ad X. *macrocarpon* Cand. (X. italicum Morett.)

pag. 853.

Ad *Myriophyllum.*

elatinoides Gaudich. 11. M. foliis quaternis pinnatifidis, ſuperioribus lanceolatis ſubintegris, floribus dioecis, ♀ axillaribus. *Inſ. Falkland.*

ternatum Gaudich. 12. M. foliis ternis, inferioribus capillaceo-pinnatifidis, ſuperioribus oblongis integerrimis, floribus axillaribus, ſuperioribus ♂ 8andris, inferioribus ♀. *Inſ. Falkland.*

pag. 864.

Ad *Quercum.*

Qu. *bruttia* ac *Thomaſii* Tenor. (in catal. ſem. 1825.) rite collocari nequeunt, antequam penitius cognitae fuerint.

pag. 866.

Poſt *Codiaeum* Rumph.:

CAPERONIA Hilar.

caſtaneaefolia Hilar. 1. (Croton caſtaneaefolius L. Syſt. 3. 877.)

paluſtris Hilar. 2. (Croton paluſtris L. Syſt. 3. 877.)

cordata Hilar. 3. C. ſuffruticoſa aculeata, foliis alternis cordato-ovatis ſpinuloſo-ſerratis hiſpidulis, floribus ſpicatis axillaribus dioecis. *Braſil.*

linearifolia Hilar. 4. C. ſuffruticoſa hiſpida, foliis linearibus acutis argutiſſime ſerratis, floribus racemoſis axillaribus. *Rio grande.*

pag. 879.

Ad *Acalypham.*

Poſt n. 5. *auſtralis* L. 59. A. ſpicis axillaribus ſolitariis baſi ♀, involucris orbiculatis integerrimis, foliis oblongis obtuſiusculis apice ſerratis ſupra nitidis. *Braſil.* (A. prunifolia Nees. Mart.)

pag. 881.

Poſt n. 27. *pruriens* Nees. 60. A. ſpica ♂ terminali ſolitaria, ♀ axillaribus pedunculatis, involucris 2floris orbicularibus dentatis, foliis rhombeo-ovatis obtuſe ſerratis ciliatis hirſutis. *Braſil.*

pag. 883.

Poſt n. 52. *hirta* * 61. A. foliis ovato-oblongis aequaliter ſerratis hirſutiusculis, petiolis cauleque ſimplici hirtis, ſpicis ♂ filiformibus, ♀ terminali ſolitaria, involucro 0. *Rio grande.* Sello.

gracilis * 62. A. foliis ovato-lanceolatis acuminatis arcuato-ſerratis nervoſo-venoſis glabris, caule ſimpliciusculo, ſpicis ♂ filiformibus (ſubinde baſi ♀) ♀ terminalibus aggregatis, involucro 0. *Rio grande.* Sello.

pag. 887.

Ad *Pinum canarienſem* Sweet. adde: ſtrobilis maximis ovato-oblongis. Cand. hort. genev. t. 1.

pag. 888.

Ad *Colymbeam* Salisb.

C. *anguſtifolia* Radd. opuſc. ſcientif. 3. p. 411. e *Braſilia*, a C. quadrifaria Salisb. differre haud videtur. Sed altera ſpecies omiſſa eſt:

excelſa * 2. C. foliis confertis adnatis lineari-teretibus acutis incurvis. *Nov. Caledon. Nov. Holl. ſub tropico Capricorni.* (Dombeya excelſa Lamb. pin. t. 39. 40. Araucaria R. Br. in Ait.)

Ad *Thuiam quadrangularem* del. Michel. et ponatur *Poit. et Turp.*

pag. 890.

Typha minor Sm. (T. elliptica C. C. Gmel. bad. 3. p. 603.)
T. *anguſtifolia.* (T. media C. C. Gmel. bad. 3. p. 602.)

CLASSIS XXII.

pag. 892.

Stephania Lour. *Meniſpermeis* accenſenda.

pag. 895.

Poſt n. 3194. *Adriana* Gaudich. ♂Cal. ſimplex 5partitus bracteatus. Cor. 0. Antherae apice appendiculatae. ♀Cal. duplex 5partitus. Capſ. 3cocca. Styli 3 2partiti.

---

pag. 899.

Ad *Stephaniam* Lour.

St. *rotunda* Lour. et in *Java*. (Clypea corymboſa Blum.)

discolor * 3. St. foliis peltatis ovatis obtuſiusculis mucronatis ſubtus incano-tomentoſis, capitulis in umbellam axillarem diſpoſitis. *Java*. (Clypea Blum.)

venoſa * 4. St. foliis peltatis ovatis obtuſiusculis mucronatis glabris ſubtus albicantibus, venis purpuraſcentibus, umbellis elongatis compoſitis axillaribus. *Java*. (Clypea Blum.)

capitata * 5. St. foliis peltatis ovatis acutis membranaceis, racemis axillaribus ſolitariis, receptaculis florum carnoſis. *Java*. (Clypea Blum.)

acuminata * 6. St. foliis peltatis ovato-oblongis acuminatis ſubcoriaceis glabris, racemis axillaribus ſolitariis, receptaculis florum confertis. *Java*. (Clypea Blum.)

tomentoſa * 7. St. tomentoſa, foliis ſubrotundis obtuſis mucronatis, corymbis dichotomis axillaribus folio brevioribus. *Java*. (Clypea Blum.)

pag. 904.

Ad *Piſtaciam*.

mexicana Kunth. 7. P. foliis impari-pinnatis ſub-8jugis ſubtus petiolisque pubeſcentibus, foliolis inaequilateris oblongis longe mucronatis, fructibus paniculatis ſubglobooſis. *Mexico*. Humb. nov. gen. 7. t. 608.

pag. 906.

Poſt *Styloceras* Adr. Juſſ.:

Adriana Gaudich.

tomentoſa Gaudich. 1. A. foliis 3-5lobis utrinque tomentoſis, lobis dentato-crenatis. *Nov. Holl.*

glabrata Gaudich. 3. A. foliis elliptico-oblongis integris Slobisque ſupra glabriusculis ſubtus tomentoſis, lobis laciniato-crenulatis. *Nov. Holl.*

pag. 910.

Ad *Ciſſampelon.*

Poſt n. 5. *auſtralis* Hilar. 23. C. foliis cordatis emarginatis mucronatis utrinque pubeſcentibus, floribus racemoſis. *Braſil.*

monoeca Hilar. 24. C. foliis cordatis obtuſis piloſis, floribus monoecis racemoſis. *Braſil.*

gracilis Hilar. 25. C. foliis cordatis acutiusculis utrinque pubeſcentibus, floribus ♂ corymboſis. *Braſil.*

glaberrima Hilar. 26. C. foliis ovatis acutis nervoſis glaberrimis, floribus ♂ corymboſis. *Braſil.*

litoralis Hilar. 27. C. foliis cordatis retuſis ſubintegerrimis ſubtus villoſis, racemis ♂ elongatis. *Braſil.*

communis Hilar. 28. C. foliis cordato-oblongis acutis integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ♂ racemoſis, ♀ glomeratis axillaribus. *Braſil.*

ſuborbicularis Hilar. 29. C. foliis ſuborbicularibus integerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ♂ corymboſis. *Braſil.*

ſubtriangularis Hilar. 30. C. foliis orbiculari-3angularibus integerrimis mucronatis pubeſcentibus. *Braſil.*

velutina Hilar. 31. C. foliis ovatis obtuſis villoſis, floribus ♂ corymboſis. *Braſil.*

pag. 911.

Poſt n. 21. *ebracteata* Hilar. 32. C. foliis ſubrotundo-rhombeis ſubintegerrimis ſubtus tomentoſis, floribus ♀ axillaribus faſciculatis. *Braſil.*

CLASSIS XXIII.

pag. 913.

Spixia Leandr.

☿ Bracteae duae. Perianthia 1phylla 4dentata terna inter piſtilla. Stamina flosculi centralis 4, lateralis 2.

♀ Involucrum 1phyllum 2partitum deciduum. Bracteae duae oppoſitae 2partitae. Perianth. 0. Styli 4, ſtigmatibus peltatis. Capſ. 4 pedicellatae 3loculares, loculis 2valvibus. Sem. arillata.

heterantheta Schrank. *Braſil.* Arbor ramoſa, foliis alternis oblongis acutis repando-undulatis ſubtus ferrugineo-villoſis, floribus axillaribus faſciculatis.

pag. 914.

Ad *Parietariam.*

Poſt n. 6. *Soleirolii* * 11. P. caule repente radicante, foliis obliquis ſubrotundis piloſis, involucro ſubnullo, floribus ♂ 4fidis, ♀ 3fidis. *Corſica.* (Helxine Requien.)

AD

VOLUMEN IV.

CLASSIS XXIV.

AD SECT. I.

pag. 30.

Ad *Schizaeam trilateralem* Schk. pertinere videtur Sch. auſtralis Gaudich. ex *Inſ. Falkland.*

pag. 37.

Acroſtichum *maſcarenenſe* * loco maſcarenenſis.

pag. 59.

Ad *Polypodium.*

Poſt n. 185. *alpeſtre* Hopp. 216. P. fronde 2pinnata, foliolis lineari-lanceolatis pinnatifidis, laciniis obtuſis acute ſerratis, ſoris diſtinctis. *Alpeſtria German. auſtr.*

pag. 63.

Ad *Lomariam.*

robuſta Carmich. 44. L. frondis ſterilis pinnis oblongo-lanceolatis acutiusculis integerrimis ſupra lanatis ſubtus rhachique paleaceis. *Inſ. Acunnae, Falkl.* (L. ſetigera Gaudich. Pteris palmaeformis Thuars.)

antarctica Carmich. 45. L. pinnis ſemioblongis obtuſis integerrimis, terminali breviore, induſiis inciſo-eroſis. *Inſ. Acunnae.* (Acroſtichum polytrichoides Thuars.)

pag. 104.

Aſpidium Wallichianum * mutetur in A. *Donianum* *, quod jam ſupra p. 96. adeſt A. *Wallichii* Hook.

pag. 126.

Ad *Cyatheam aculeatam* W. herb. C. *compta* Mart. Denkw. Regensb. 2. 146.

Ad C. *hirſutam* Presl. C. *veſtita* Mart. W.

phalerata Mart. 18. C. arborea inermis, fronde 2pinnatifida glabra, foliolis lanceolatis acuminatis pinnatifidis, laciniis oblongis obtuſis crenulatis. *Braſil.*

pag. 133.

Ad *Hymenophyllum.*

Poſt n. 36. *caeſpitoſum* Gaudich. 47. H. fronde pinnata coſta media rhachique piloſis, foliolis ſubimbricatis ovato-oblongis concavis integerrimis, ſtipite capillari hirto. *Inſ. Falkland.*

AD

AD SECT. II.

pag. 137.

Dawſonia R. Br. Calyptra (non duplex) externe villoſa, interne membranacea dimidiata.

pag. 145.

Gymnoſtomum involutum Hook. habitat et ad *C. B. S.*

Harriſonia Humboldtii * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 147.

Hymenoſtomum cubenſe * eſt verus *Syrrhopodon.* Ergo ſervandum Schwägrichenii nomen.

pag. 154.

Ad *Grimmiam.*

Poſt n. 10. *Ecklonii* * 19. Gr. caule breviusculo ſubramoſo, foliis oblongis acuminatis longiſſime piliferis, nervo apicem attingente, ſeta flexuoſa, capſulae oblongae ſulcatae operculo mucronato, dentibus peristomii ſubforatis. *Ad ſaxa in monte leonis, C. B. S.* Ecklon. Tela cellularis foliorum arcta ſubpunctata.

pag. 155.

Poſt n. 17. *albida* * 20. Gr. caule breviſſimo ſimplici, foliis imbricatis concavis appreſſo-erectis ovatis acuminatis enerviis verſus apicem diaphanis, capſula oblonga laevi. *C. B. S.* Ecklon.

craſſa * 21. Gr. caule ſimplici abbreviato, foliis ovato-oblongis obtuſis longe piliferis craſſis ſubenerviis, ſeta elongata, capſulae oblongae operculo conico. *Ad montem leonis C. B. S.* Ecklon.

pag. 158.

Ad *Weiſiam.*

Poſt n. 31. *tortilis* * 32. W. caule breviſſimo ſimplici, foliis lineari-lanceolatis elongatis flaccidis nervoſis integerrimis ſubpellucidis, capſulae oblongae erectae operculo conico ſubulato. *Ad montem diaboli C. B. S.* Ecklon.

Ad *Maſchalocarpum.*

M. *declinatus* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 159.

Poſt n. 7. *Ecklonii* * 22. M. caule repente, ramis erectiusculis ſubincurvis, foliis lanceolatis acutis integerrimis,

nervo apicem attingente, seta elongata, capsula oblonga substriata, calyptra pilosissima. *Ad montem tabularem.* Ecklon.

M. *intricatus* * et *urceolatus* * habitat et ad *C. B. S.*

pag. 161.

Ad *Macromitrion.*

M. *longirostre* Schwägr. (Orthotrichum amoenum Hornsch. *Nov. Holl.* Sieber.)

M. *clavellatum* * et *acutifolium* Brid. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 162.

Trematodon pallidisetus * Weisia Schwägr. restituenda.

Tr. *pallidus* * magnopere dubius. Ni genera multiplicentur, *Sclerodontium* Schwägr. restituendum.

pag. 163.

Ad *Dicranum.*

D. *polypodioides* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 165.

Post n. 16. *dicarpon* Nees. 57. D. caule simpliciusculo dense radiculoso folioso, foliis ex ovata basi linearibus cuspidatis flexuosis argute serrulatis, nervo apicem attingente, setis geminis longe vaginatis, capsulae curvatae operculo longe rostrato. *Nov. Holl.*

Post n. 19. *brachyphyllum* Hornsch. 58. D. caule erecto subramoso, foliis erecto-patulis ovato-lanceolatis pellucidis acutis albido-glaucis hinc opacioribus apice denticulatis enerviis, capsula subturbinata cernua. *Nov. Holl.* Cellulae foliorum parallelogrammae.

Sieberianum Hornsch. 59. D. caule erecto ramoso, foliis flexuosis lanceolatis cuspidatis integerrimis apice subtus scabris, nervo pellucidiori apicem subattingente, capsulae cylindricae basi productae cernuae operculo longe subulato. *Nov. Holl.*

pag. 166.

D. *fasciatum* Hedw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 170.

Trichostomum Barbula Schwägr. habitat et ad *C. B. S.* Tr. convolutum Brid. esse Weisiam Starkeanam Hedw. Schwägrichen.

Tr. *indicum* W. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 171.

Tr. *polyphyllum* Schwägr. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 172.

Tr. *Leucoloma* Schwägr. (Macrodon Auberti W. Arnott.)

Ad *Didymodontem.*

D. *pusillus* Brid. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 173.

D. *rigidulus* Hedw. habitat in summo cacumine montis tabularis *C. B. S.*

capensis * 18. D. caule brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis crassiusculis margine revolutis integerrimis mucronatis, nervo crasso apicem attingente, capsulae oblongae operculo subulato. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

D. *squarrosus* Hook. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 174.

Ad *Polytrichum.*

P. *campanulatum* et *furcatum* Hornsch. esse P. *alpinum*, Schwägrichen.

P. *appressum* Brid. Cilia bascos foliorum aliena videntur Schwägrichenio suppl. 2. p. 6.

pag. 178.

Ad *Barbulam.*

B. *muralis* Timm. et *crinita* Schultz. habitant et ad *C. B. S.*

pag. 180.

conica * 29. B. caule brevissimo, foliis flexuoso-patentibus lineari-lanceolatis integerrimis, nervo valido apicem attingente, capsulae cernuae cylindricae sulcatae operculo conico. *In cacumine montis tabularis C. B. S.* Ecklon.

pag. 183.

Ad Orthotrichum.

Post n. 22. *glaucum* * 34. O. caule simpliciusculo brevissimo, foliis oblongo-lanceolatis cuspidato-piliferis margine subincrassatis revolutis siccitate strictis, capsula subemersa sulcata, calyptra glabra. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

pag. 192.

Ad *Bartramiam.*

Ad B. *pendulam* Hook. (B. Sieberi Hornsch., habitat et in *Nov. Holl.*)

pag. 193.

B. *falcata* Hook. neutiquam ad B. *uncinatam* Schw. pertinet. Est enim illa: B. caule erecto ramoso, ramis fasti-

giato-subverticillatis, foliis 4fariam disposítis ovato-lanceolatis tenuissime serrulatis secundis, nervo crasso apicem attingente, setis caulem superantibus, capsulis glabris turgidis cernuis. *Tyrol.* Funck.

pag. 194.

Ad *Meesiam longisetam* Hedw. Diplocomium hexastichon Funck. crypt. n. 653.

M. *dealbata* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pag. 196.

Ad *Hookeriam* Sm.

Post n. 4. † *convoluta* * 33. H. caule vage ramoso, ramis curvato-involutis, foliis undique sparsis ellipticis obtusis integerrimis bistriatis, nervo obsoleto ad medium evanido. *In monte tabulari C. B. S.* Ecklon.

pag. 203.

Ad *Hypnum.*

Post n. 43. *clavatum* * 130. H. caule repente, ramis abbreviatis flexuoso-incurvis, foliis imbricatis ovato-lanceolatis falcato-secundis (luride flavis), seta subbasilari laevi, capsula subhorizontali clavata. *Ad montem diaboli C. B. S.* Ecklon.

pag. 211.

Bryum demissum Hook. esse Meesiam, Schwägrichen.

pag. 216.

Funaria hygrometrica Hedw. et *calvescens* Schwägr. copiosae ad *C. B. S.*

pag. 217.

Ad *Jungermanniam.*

Post n. 1. *Ecklonii* * 200. J. surculis repentibus ramosissimis, foliis distichis imbricatis amplexicaulibus orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis appendiculatis, stipulis cordatis integerrimis emarginatis. *Ad radices arborum in monte diaboli C. B. S.* Ecklon.

nepalensis * 201. J. surculis erectiusculis ramosis, ramis patentibus, foliis distichis amplexicaulibus stipulisque orbiculatis integerrimis, auriculis alternis subclavatis. *Nepal.* Kunze.

J. *nigricaulis* Nees. habitat et ad *C. B. S.*

J. *dilatata.* (Frullania minor Radd.) *C. B. S.*

J. *Tamarisci.* (Frullania major Radd.)

globosa Meissner. 202. J. ramis patentibus, foliis distichis semiverticalibus subrotundis, auriculis clavato-cylindri-

cis appreſſis, ſtipulis ſubrotundis 2lobis, ſurculis lateralibus globoſis. *Ad corticem Chinae ſuſcae.*

pag. 218.

J. *lobulata* Hook. *Ad montem diaboli C. B. S.*

Poſt n. 14. *brunea* * 203. J. ſurculis pinnatis bruneis, foliis confertis diſtichis patulis orbiculatis integerrimis, auriculis clavatis baſi truncatis, ſtipulis 2fidis, laciniis cuneatis patentibus inciſo-dentatis. *In cacumine montis tabularis C. B. S.*

Poſt n. 18. *denticulata* Web. 204. J. ſurculis repentibus ramoſis, foliis remotiusculis alternis hyalinis oblique ovatis acutis denticulatis, auriculis cucullatis, ſtipulis ſubrotundis acute 2lobis. *Ad Trichomanes rigidum.*

pag. 219.

Poſt n. 27. *conferta* Meiſsn. 205. J. foliis imbricatis diſtichis ſubrotundis integerrimis, auriculis obtuſis, ſtipulis reniformibus integerrimis remotiusculis. *Ad corticem Chinae.*

pag. 221.

J. *transverſalis* Sw. habitat et ad *C. B. S.*

pellucida Meiſsn. 206. J. foliis ſubalternis ſubrotundis integerrimis tenerrimis pellucidis baſi complicatis 1dentatis, ſtipulis ovato-lanceolatis acuminatis integerrimis. *Ad filices Ind. occid.*

pag. 223.

Poſt n. 74. *tabularis* * 207. J. ſurculis erectis ſimpliciusculis, foliis confertis ſubrotundo-ovatis integerrimis, ſtipulis ovatis 2fidis. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

Ante n. 76. *retroſpectans* Nees. 208. J. ſurculis brevibus radiculoſis, ramulis reflexis, foliis diſtichis adnatis ſubquadrato-ellipticis dentato-fimbriatis, ſtipulis 2fidis obſoletis. *Nov. Holl.*

pag. 226.

Poſt n. 117. *formoſa* Meiſsn. 209. J. ſurculis ramoſis, foliis diſtichis approximatis obovato-ſubrotundis hinc exciſis integerrimis, auriculis ſpicato-conoideis patulis. *Martinica ad terram.* Eximia et prope ſingularis ſpecies.

pag. 229.

Ante n. 145. *ochroleuca* * 210. J. ſurculis ramoſiſſimis, ramis flexuoſis incurvatis, foliis undique imbricatis adnatis hyalinis 2-3-4partitis, laciniis lincaribus erectis repandis. *Ad montem tabularem C. B. S.* Ecklon.

digitata Meisn. 211. J. foliis confertis amplexicaulibus cuneatis laciniatis, laciniis acutis divaricatis. *Ad corticem Chinae.*

pag. 230.

Post n. 160. *superba* Nees. 212. J. surculis erectis, foliis distichis subdecurrentibus semicordato-falcatis altero margine fimbriatis altero integerrimis. *Nov. Holl.*

longifolia Meisn. 213. J. foliis alternis adnatis lanceolatis elongatis apice laciniato-fimbriatis. *Amer. austr.*

pag. 231.

Post n. 170. *nervosa* * 214. J. surculis erectiusculis ramosissimis, ramulis convolutis, foliis undique imbricatis patulis oblongis obtusis integerrimis amplexicaulibus obsolete 1nerviis. *C. B. S.* Ecklon. Linea magis pellucida longitudinalis pariter nervum simulat ac in J. albicante.

pag. 233.

J. *podophylla* Thunb. habitat et in *Brasil.* (Viviania Hymenophyllum Radd.)

pag. 234.

Ad *Marchantiam hemisphaericam.* (Duvalia rupestris Nees in berl. mag. 8. p. 271.)

AD SECT. III.

pag. 238.

Post n. 3371. *Leucogramme* Meyer. Lirellae simplices vel subramosae. Lamina proligera canaliculata adnata longitudinaliter rumpens. Sporae e disco angustato propullulantes.

pag. 242.

Ad *Mycoporum* Meyer.

Melinostigma Meyer. 2. M. crusta cinereo-nigricante, verrucis planis atris, ostiolis flavescentibus. *Brasil.*

Ad *Ocellulariam* Meyer.

sphaerica Meyer. 8. O. crusta cartilaginea glabriuscula lutescente, verrucis hemisphaericis fulvis, ostiolo marginato. *Ad cortices Brasil.*

pag. 248.

Ad *Trypethelium.*

deustum Meyer. 13. Tr. crusta albida pulverea effusa, verrucis subconfluentibus rugulosis atris sporangiisque cinereis. *Brasil.*

pag. 254.

Poſt *Aſteriſcam:*

LEUCOGRAMME Meyer.

conferta Meyer. 1. L. cruſta albido-virescente glabra gyroſa, lirellis confertis. *Ad cortices Braſil.*

turgida Meyer. 2. L. cruſta albido-pallente, lirellis ſparſis elevatis elongatis ſimplicibus flexuoſis. *Ad cortices Braſil.*

carnea Meyer. 3. L. cruſta pallide virescente glaberrima contigua, lirellis ſparſis ramoſis curvatis extus albidis intus carneis. *Ad cortices Braſil.*

ſerpentaria Meyer. 4. L. cruſta inaequabili colliculoſa pallide olivacea, lirellis ſparſis flexuoſis extus albidis intus nigricantibus. *Ad cortices Braſil.*

plicata Meyer. 5. L. cruſta glabra nivea, lirellis abbreviatis ovali-oblongis concoloribus turgidis margine plicatis. *Ad cortices Braſil.*

radaceenſis Meyer. 6. L. cruſta glabra limitata flavida, lirellis flexuoſis turgidis albidis interruptis. *Ad cortices inſul. Molucc.*

pag. 255.

Ad *Platygrammen* Meyer.

ſuffulta Meyer. 7. Pl. cruſta pallide albida limitata glabra, lirellis irregularibus ſubramoſis immerſis interruptis atris. *Ad cortices Braſil.*

Ad *Glyphin* Ach.

repens Meyer. 3. Gl. cruſta alba effuſa pulverulenta, pulvillis difformibus confluentibus, lirellis ſubrotundis bruneis latentibus. *Ad cortices Braſil.*

pag. 262.

Ad *Lecideam palmicolam* * (L. parmelioides Kunth.)

pag. 263.

Ad *Lecideam croſam* * Gyrophora rugoſa Kunth. pertinere videtur.

porphyrea Meyer. 103. L. thallo membranaceo glabriusculo margine ſuberoſo ciliato ſupra ruberrimo papilloſo ſubtus nigricante lacunoſo, patellis margine tumidis rugulosis. *In monte tabulari ad C. B. S.*

pag. 271.

Ad *Cladoniam* Hoffm.

Poſt n. 10. *terebrata* * 39. Cl. thallo ſubnullo, podetiis elongatis ramoſiſſimis fragilibus virescenti-ſpadiceis pertuſis, ramulis brevibus nitidis furcatis, tuberculis truncatis fuſcis aggregatis. *Ad terram Nov. Holl.* (Cenomyce terebrata Laur.)

pag. 276.

Ad *Parmeliam* Ach.

Poſt n. 3. *Celaſtri* * 246. P. thallo caeſpitoſo erecto ramoſo pallide flavicante, ramulis capillaribus abbreviatis, ſcutellis planiusculis luteis pallidius marginatis. *Ad ramos Celaſtri pyracanthae. C. B. S.*

pag. 277.

Poſt n. 17. *Humboldtiana* * 247. P. thallo caeſpitoſo erecto luteo-virescente, ramis teretiusculis obtuſis complicatis lacunoſis, ſcutellis ſubconcoloribus. *Ad Orinocum.* (Dufourea tortuoſa Nees in horis berol. t. 5. f. 2.)

pag. 278.

Poſt n. 28. *Ecklonii* * 248. P. thallo longiſſimo ramoſo albido laevi, ramis linearibus, ultimis capillaribus, ſcutellis lateralibus carneis marginatis. *In ſylvis ditionis Uitenhagen Afric. auſtr.* Ecklon.

pag. 280.

Poſt n. 45. *Sieberiana* Laur. 249. P. thallo tenerrimo ſuberecto flaviſſimo ſubtus albo, ramis linearibus ſubpinnatifidis intricatis ciliatis, ſcutellis ſparſis aurantiis margine nudis. *Ad cortices Nov. Holl.*

Ad *Parmeliam atlanticam* Ach. meth. Lichen atlanticus Engl. bot. 1715. a Borrero in Angliae rupibus inventus differt colore cinereo-virescente.

pag. 281.

Poſt n. 54. *involucrata* Meyer. 250. P. thallo erectiusculo candido, laciniis applanatis longe fimbriatis ſubtus farinoſis apice tumidiusculis, ſcutellis terminalibus concavis bruneis longe fimbriatis. *Braſil.*

pag. 283.

Poſt n. 74. *concolor* * 251. P. thallo foliaceo lobato imbricato ſupra glabro virescente pallido ſubtus laevi livide lutescente, laciniis obtuſis crenatis, ſcutellis concavis ſubvirescentibus demum fuſco-nigricantibus, margine craſſo crenulato. *C. B. S.*

Poſt n. 76. *crinita* Meyer. 252. P. thallo foliaceo utrinque albido glabro, laciniis divaricatis apice dilatatis longe atro-fimbriatis, ſcutellis lateralibus planis badiis atro-fimbriatis. *Braſil.*

pag. 284.

Poſt n. 81. *Dewеyana* * 253. P. thallo orbiculari pallido glabro ſubtus livide bruneo glabriusculo, laciniis rotundatis ſinuato-lobatis, ſcutellis concavis fuſcis craſſe marginatis. *Maſſachuſetts Amer. bor.*

phyllocarpa Meyer. 254. P. thallo membranaceo glabro reticulato-lacunoso glauco-virente subtus ochraceo-pallido, scutellis planis fusco-rubris, margine foliaceo amplo lacero. *Brasil.*

pag. 285.

Post n. 95. *propinqua* Laur. 255. P. thallo orbiculari pallido rugosiusculo subtus albido, fibrillis raris fuscescentibus, laciniis lobatis eroso-dentatis, scutellis planiusculis membranaceis spadiceis, margine tenui granulato. *Ad saxa nov. Holl.*

pag. 286.

Post n. 105. *limbata* Laur. 256. P. thallo orbiculari sulfureo laevigato subtus fuscescente nitido, fibrillis longiusculis nigro-fuscis, laciniis linearibus convexiusculis dichotomis truncatis nigro-marginatis, scutellis centralibus spadiceis planiusculis, subtus ciliato-fibrillosis, margine tenui crenulato. *Ad saxa nov. Holl.*

pag. 287.

Ad *Parmeliam plicatilem* Ach. meth. *Collema olivaceum* Kunth.

pag. 289.

Post n. 123. *coniocarpa* Laur. 257. P. thallo membranaceo albido-glaucescente subtus nigro fibrilloso, lobis elevatis rotundatis incisis, margine crispo involuto albido pulverulento, scutellis concavis rufis, margine crasso pulverulento. *Ad arbores nov. Holl.*

Post n. 125. *fuscescens* Kunth. 258. P. thallo orbiculari cartilagineo-membranaceo tenuissime rugoso glauco-fuscescente subtus nigro laevi, lobis incisis rotundatis flexuosis integerrimis, scutellis amplis concavis rufis, margine inflexo integro. *Ad alpes Amer. austr.*

pag. 290.

Ad *Parmeliam bullatam* Ach. meth. *Collema venustum* Radd.

cymbalifera Meyer. 259. P. thallo foliaceo membranaceo subdiaphano glauco-olivaceo, lobis erectiusculis reticulatis undulato-crispis, granulis marginalibus copiosis flavidis, scutellis solitariis concavis rufis, margine crasso crenulato. *Brasil.*

pag. 292.

Parmelia astroidea Hornem. deleatur, jam supra p. 282. obvia.

pag. 293.

Post n. 165. *chrysocarpa* Meyer. 260. P. thallo appresso diffuso albo papillato-granuloso, scutellis concavis

disco olivaceo-fuscis, margine tumido integerrimo croceo. *Brasil.*

lugubris Meyer. 261. P. thallo radioso lobato circinato fusco-aeneo supra glabro subtus protothalloque ambeunte aterrimis fibrilloso-tomentosis, lobulis crenatis margine albidis, peripheriris dilutioribus, scutellis planis fuscis, margine tenui. *Brasil.*

pag. 294.

Post n. 172. *sanguinolenta* Meyer. 262. P. thallo effuso granuloso intus puniceo supra flavescente, scutellis planiusculis cruentis, margine puniceo integerrimo. *Ad arbores Brasil.* (P. erythrocarpa Meyer Entwickel. p. 16.)

pag. 298.

Post n. 209. *acervulata* * 263. P. crusta tenui laevigata sulfureo-virescente, scutellis convexiusculis rufo-fuscis, margine tumido flavo. *Ad arbores Brasil.* (Lecanora acervulata Radd.)

pag. 303.

Ad *Stictam* Schreb.

Hesseana Meyer. 25. St. thallo subcoriaceo lobato ochraceo-fuligineo supra glabro subtus cellulose, cyphellis albis, lobis undulato-crispis obtusis margine farinaceis. *Ad C. B. S.*

Echlonii * 26. St. thallo membranaceo lobato supra glabro pallido subtus fusco aspero, laciniis rotundatis crenatis, scutellis fusco-nigricantibus rubro-marginatis. *Ad montem diaboli C. B. S.*

rufa W. Kunth. 27. St. thallo latissimo glauco-rutilante subtus fusco-tomentoso, laciniis rotundatis sinuato-incisis margine nudis, sorediis lateritiis, scutellis sparsis planis fusco-rubris, margine concolore tenuissime crenulato. *Cumana.*

Humboldtii Hook. Kunth. 28. St. thallo cinereo-fuscescente utrinque dense hirsuto subtus pallidiori, lobis rotundatis, sorediis concoloribus, scutellis sparsis nigro-fuscis, margine thallode villoso. *Ad cortices nov. Granat.*

Flotoviana Laur. 29. St. thallo helvolo-virente lacunoso rugoso subtus fusco-tomentoso, sorediis minutissimis pallidis, laciniis pinnatifidis linearibus apice 2fidis, scutellis marginalibus nigro-fuscis. *Nov. Holl.*

aspera Laur. 30. St. thallo lurido-virescente, sorediis albis et fibrillis exasperato subtus ferrugineo-atro tomentoso, cyphellis planiusculis niveis, laciniis dichotomis subpinnatifidis apice repandis, scutellis marginalibus planiusculis nigro-fuscis, margine crenato. *Inf. Mascaren.*

disjecta Laur. 31. St. thallo cervino-olivaceo scrobiculato sinuato-laciniato subbipinnato subtus fusco-tomentoso, laciniis linearibus retusis, sorediis minimis

albis, ſcutellis marginalibus minutis ruſis, margine integro. *Nov. Holl.*

glaberrima Laur. 32. St. thallo caeſpitoſo aſcendente cinnamomeo utrinque laevi laciniato ſinuato, laciniis ſublinearibus retuſis, cyphellis pallidis. *Inſ. Maſcaren.*

pag. 306.

Ad *Peltigeram* Hoffm.

Poſt n. 17. *Flörkeana* * 18. P. thallo lobato glauco ſubtus ſpongioſo-tomentoſo nigreſcente, lobis rotundatis, ſcutellis ruſis. *Inſ. Maſcaren.* (Peltidea Laur.)

pag. 310.

Ad *Sphaerophoron* Perſ.

auſtrale Laur. 5. Sph. thallo dichotome ramoſo fibrilloſo nitido livide fuſceſcente ſubtus pallido compreſſo, capitulis ſubgloboſis. *Nov. Holl.*

inſigne Laur. 6. Sph. thallo ramoſo nudo plano ruguloſo glabro pallide viresceſcente ſubtus pallido, capitulis compreſſis. *Nov. Holl.*

tenerum Laur. 7. Sph. thallo erecto ramoſo nudo albo, ramis teretibus divaricatis fibrilloſis, capitulis minutis atris. *Nov. Holl.*

AD SECT. IV.

pag. 313.

Poſt n. 3435. *Rhodonema* Martens. Frons tubuloſa continua ramoſa cartilaginea roſea. Capſulae laterales pedicellatae.

pag. 327.

Zonaria Kunthii Ag. habet potius lacinias lanceolatas obtuſas undulato-repandas.

pag. 330.

Ad *Lemaneam toruloſam* Ag. (Conferva piſtrinaria Pollin.)

pag. 345.

Ad *Charam aſperam* W. Ch. *hirta* Meyen.
Ad Ch. *gracilem* Sm. Ch. *barbata* Meyen.

pag. 346.

Ad *Charam flexilem.* Ch. *Brauniana* C. C. Gmel.

pag. 360.

Ad *Zygnema ſtellatum* * (Conferva quadrigranulata Pollin.)

pag. 361.

Ad *Bangiam* Lyngb.

† *aeruginoſa* * 9. B. implexa tomentoſa aeruginoſa, filis duplicibus, aliis majusculis granulorum triplici ſerie, aliis minoribus dichotomis. *In terra Javae.* (Dichonemia aeruginoſa Fr. Necs in nov. act. nat. cur. 13. t. 2.)

pag. 362.

Ad *Oſcillatoriam* Vauch.

† *Cortii* Pollin. 21. O. filamentis ſimplicibus viridibus flexuoſis acutis. *In thermis Aponenſibus.* (Pollin. ſulle alghe nelle terme euganee: Bibliot. ital. 7. f. 4.)

duplifecta Poll. 22. O. filamentis ſimplicibus ſubfuſcis, ſtriis remotiusculis duplicatis. *In thermis Aponenſibus.* (Ib. f. 3.)

pag. 364.

Ad *Vaucheriam dichotomam* Ag. (Conferva fontinalis Pollin.)

Ad V. *terreſtrem* Cand. (Conferva intexta Pollin.)

† *aponina* * 14. V. ramoſiſſima viridis, ramulis tenuiſſimis capillaribus hyalinis. *In thermis Aponenſibus.* (Merizomyria Pollin. ſulle alghe: Conferva aponina Pollin. flor. veron.)

pag. 368.

Poſt *Soleniam* Ag.:

RHODONEMA Martens.

elegans Martens. *Ad litus venetum.*

AD SECT. V.

pag. 396.

Sphaeria punicea Schmidt. non Schw.

pag. 405.

Ad *Sphaeriam macularem* Fr. Xyloma concentricum Perſ. Depazea frondicola Fr.

Poſt n. 351. *hederaecola* * 361. Sph. peritheciis conglomeratis molliusculis nigreſcentibus macula alba ambitu fuſceſcente cinctis. *Ad folia Hederae.* (Sph. Depazea hederaecola Fries.)

pag. 409.

Ad *Alphitomorphum pannoſum* Wallr. Eurotium Roſae Grev. p. 525.

pag. 424.

Agaricus luridus Perſ. mutetur in A. *fuſcum* Schäff. addito Perſoonii ſynonymo.

pag. 426.

Agaricus cretaceus Perſ. mutetur in A. *cimolium* * addito Perſoonii ſynonymo.

pag. 431.

Ad A. *emeticum* Schäff. ponatur Ruſſula lurida Perſ.
A. *fragilis* Perſ. mutetur in A. *thraufium* * addito Perſ. ſyn.

pag. 453.

A. *puſillus* Fr. mutetur in A. *nanodem* *, addito Frieſii ſyn.

pag. 463.

A. *ſemiglobatus* mutetur in A. ſubgloboſum Alb. et Schwein.

pag. 473.

Ad *Boletum.*

Poſt n. 39. *Katui* Ehrenb. 125. B. infundibuliformis membranaceus laevis nitidus ſupra zonatus fuſco-ruber, poris minimis pallidis. *Nov. Hiſpan. Java. Inſ. Molucc.*

Poſt n. 41. *rugoſus* * 126. B. pileo ſubrotundo repando rugoſo obſolete zonato nigricante coriaceo ſubtus velutino, poris minutiſſimis, ſtipite excentrico ſubramoſo. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

ſpathulatus Kunth. 127. B. pileo convexo late obovato fulvo, poris minutis ſubangulatis, ſtipite laterali craſſo elongato. *Peru.*

gibboſus * 128. B. pileo lignoſo tuberculato fuſco-nigricante, poris minutis, ſtipite elongato craſſo toruloſo concolori. *Java.* (Polyporus gibboſus et Cochlear Fr. Nees.)

luteus * 129. B. pileo rigido tenui glabro luteſcente, poris minutis ſtipiteque baſi dilatato ſubconooloribus. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

affinis * 130. B. pileo tenui glabro coriaceo dilute caſtaneo ſubzonato margine albido, poris minutiſſimis alutaceis, ſtipite tenui glabro fuſco. *Java.* (Polyporus Fr. Nees.)

pag. 474.

Poſt n. 50. *Piſachapani* * 131. B. pileo digitato elongato nigro-ferrugineo, poris minutis, ſtipite tereti. *Java.* (Polyporus Blum. et Fr. Nees.)

Lingua * 132. B. pileo linguaeformi ſuberoſo ſupra rugoſo fuſco-nigricante ſubtus luteo, poris minutis. *Java.* (Polyporus Nees.)

pag. 475.

Ad *Boletum mollem* Perſ. Polyporus carneus Fr. Nees, e Java, var.

pag. 476.

Ad *Boletum hydnoidem* Sw. B. fibrosus Kunth.

tenuis Kunth. 133. B. dimidiatus albo-fuscus zonatus laevis, poris majusculis hexagonis fuscis. *In alpibus Amer. austr.*

telephoroides Kunth. 134. B. dimidiatus pallide fuscus rugosus subflexuosus, poris fuscis minutissimis. *Peru.*

Ad ß. *fasciatum* Sw. B. pavonius Kunth. var.

striatus Kunth. 135. B. dimidiatus subimbricatus coriaceo-membranaceus nigro-fuscus radiatim striatus concentrice lineatus, poris angulatis fusco-cinereis. *Peru.*

purpurascens Kunth. 136. B. dimidiatus reniformis flavo-fuscus laevis, poris minutissimis subangulatis purpurascentibus. *Nov. Granat.*

pag. 478.

Post n. 117. *dictyodes* * 137. B. orbicularis centro affixus pallide fuscus zonatus reticulato-venosus, poris majusculis hexagonis substantia spongiosa farctis. *In alpibus Amer. austr.* (B. reticulatus Kunth.)

pag. 480.

Hydnum fraceolens Brot. in *Lusitania*, non in Lusatia.

pag. 482.

Post n. 47. *palmatum* Kunth. 79. H. dimidiatum palmato-incisum striatum flavo-fuscum subtus fulvo-villosum. *Nov. Granat.*

pag. 484.

Ad *Telephoram* Ehrh.

Post n. 5. *Palmetto* Radd. 73. Th. pileo flabelliformi laciniato coriaceo fibroso flavo-fusco, stipite gracili compressiusculo. *Brasil.*

infundibuliformis Kunth. 74. Th. maxima, pileo infundibuliformi lobato pallide fusco extus laevi intus squamoso-hirsuto, stipite brevi crasso. *Peru.*

pag. 485.

Ad Th. *versicolorem* Sw. Th. badia Kunth., Ostrea Fr. Nees.

pag. 486.

Th. *Pavonia Sw.* non Bertol. Per totam Indiam occidentalem provenit.

pag. 487.

Ad Th. *fulfuream* Pers. Rhacodium fulfureum Rebent.

pag. 488.

Post n. 70. *coerulea* Cand. 75. Th. effusa tomentosa azurea, margine demum sublibero, papillis parvis acutis.

Ad fepimenta. (Hypochnus coeruleus Fr. obſ. ? Thelephora fimbriata Roth. catal. 2. 257.)

pag. 498.

Ad *Phallum.*

roſeus Delil. 4. Ph. pileo depreſſo viridi-nigricante, ſtipite cylindrico reticulato fiſtuloſo. *Aegypt.* Delil. t. 59.

pag. 513.

Ad *Peziam controverſam* * Conferva lichenoides Radd. mem. di Modena, vol. 19. p. 48.

pag. 514.

Poſt n. 221. *limoſa* * 259. P. ſtromate granuloſo ſubfloccoſo aurantio-rufeſcente, cupulis hemiſphaericis glabris candidis demum papyraceis. *In limo ad lacus Sebuſianos.* (Breſſe) Balbis.

pag. 561.

Ad *Erineum* Perſ.

Gei * 37. E. maculaeforme immerſum rufeſcenti-albidum, floccis ſubliberis tenuiſſimis filiformibus apice attenuatis. *In foliis Gei urbani et rivalis.* (Phyllerium Fries.)

Ribium Schlechtend. 38. E. immerſum effuſum bulloſum luteo-vireſcens, floccis ſparſis tubuloſis baſi dilatatis apice cernuis. *In foliis Ribis rubri.*

ADDENDA.

Tom. I.

pag. 36.

Cynomorium coccineum legit et in *Sardinia* Moris Calaritanus.

pag. 38.

Ad *Sarmientam repentem.* (Urceolaria Feuill. l. Thuill.)

pag. 50.

Ad *Utricularíam.*

Poſt n. 24. *Echlonii* * 66. U. ſcapo 1floro, calcari obtuſo corollam ſuperante, foliis linearibus acutis ſtrictis perſiſtentibus. *Ad C. B. S.*

pag. 90.

Ad *Acaenam.*

Poſt n. 14. *Eupatoria* Schlechtend. 18. A. foliolis baſi obliqua oblongis inciſo-ſerratis ſubtus ſericeis, floribus ſparſis glomeratisque in ſpicam interruptam diſpoſitis. *Braſil.*

pag. 128.

Poſt n. 201. *Löflingia.* Cal. 5partitus, laciniis baſi 2dentatis. Petala 5 minima. Stigm. 3. Capſ. 1locularis 3valvis polyſperma.

hiſpanica 1. L. erecta viſcoſo-pubeſcens, foliis lineari-ſubulatis utrinque 1dentatis, floribus axillaribus confertis 3andris. *Hiſpan. Afric. bor.*

pentandra Cav. 2. L. procumbens villoſa, foliis ſubulatis, floribus pentandris 3gynis. *Hiſpan. auſtr.*

L. *renifolia* Lag. videtur Drymaria cordata W.

pag. 254.

Deyeuxia avenacea * del. Eſt enim Aniſopogon avenaceus R. Br. p. 273.

pag.

pag. 256.

Stipa melanocarpa Mühl. del. Eſt enim Cymbopogon melanocarpus * p. 289.

pag. 259.

Ad *Agroſtin.*

Poſt n. 28. *aenea* * 89. A. paniculae ſtrictae ramis verticillatis patulis, flosculis glaberrimis fuſcis, corolla acuta nervoſa calycem ſubaequante, culmo elato glabro, foliis ciliatis, vaginis ore piloſis. *Braſil.* (Vilfa Trin. gram. faſc. 2.)

domingenſis * 90. A. paniculae ramis erectis, calycibus glabris inaequalibus acutis, corollae valva altera truncato-eroſa, altera acuta, foliis lineari-cuſpidatis glabriuſculis, vaginarum ore piloſo. *Hiſpaniola.* (Vilfa Trin.)

Poſt n. 35. *pallida* Cand. 91. A. panicula erecta ſubcontracta, calycibus acuminatis carina denticulatis, corolla obtuſa 4nervia, ariſta ſubtorta calycem excedente, foliis anguſtis glabris, ligula 2fida. *Gallia provinc. Corſica. Inſ. Aleut.* (A. exarata Trin.)

pag. 260.

Poſt n. 46. *Jureſſi* Link. 92. A. panicula contracta interrupta glabra, calycibus obtuſis aſperis, corollae baſi cyathidio ſuffultae valva altera obtuſa nervoſa, altera minuta, culmo foliisque glabris, ligula breviſſima. *Luſitan.*

pag. 261.

Agroſtis ramuloſa Carmich. mutanda in A. *Carmichaëlii* *, appoſito Carmich. ſynonymo.

pag. 286.

Andropogon condenſatus Humb. del. Eſt enim Cymbopogon condenſatus * p. 289.

pag. 289.

Andropogon purpuraſcens Mühl. del. ut ſynonymon Polliniae ſcopariae *.

pag. 291.

Andropogon nutans L. del. ut ſynonymon Antheſteriae ciliatae Retz.

pag. 294.

Chloris pallida W. del. Eſt jam ſupra Andropogon provincialis Lam. p. 286.

pag. 323.

Triticum dicoccum Schübl. potius ad Tr. amyleum Ser.

pag. 388.

Ad *Galium.*

Poſt n. 26. *Moriſii* * 116. G. caule debili ſcabro, foliis ſenis lineari-lanceolatis ariſtatis antrorſum ciliatis, corollis cuſpidatis. *Sardin.* Moris.

maximum Moris. 117. G. caule elato glaberrimo, foliis lingulato-linearibus obtuſis laevibus, ſuperioribus quaternis oppoſitisque, umbellis terminalibus. *Sardinia.*

pag. 399.

Ad *Anthoſpermum.*

ſpermacoceum Reichenb. 7. A. foliis oppoſitis lineari-lanceolatis acutis cauleque herbaceo glaberrimis, floribus ſolitariis terminalibus. *C. B. S.*

rubiaceum Reichenb. 8. A. caule herbaceo, foliis verticillato-faſciculatis lineari-lanceolatis, ſuperioribus fructibusque hirtis, pedunculis oppoſitis ſolitariis. *C. B. S.*

galioides Reichenb. 9. A. foliis verticillatis abbreviatis linearibus acutis ſupra glabris ſubtus ferrugineis, fructibus ſcabris aggregatis. *C. B. S.*

pag. 425.

Ad *Exacum.*

Ad E. *palleſcens* * p. 41. Callopiſma perfoliatum Mart. t. 183.
Ad E. *nervoſum* * p. 41. Callopiſma amplexifolium Mart. t. 184.

pag. 426.

Ad *Sebaeam.*

braſilienſis * 12. S. caule ramoſo 4gono, foliis ſeſſilibus lanceolatis, pedunculis terminalibus ſubſolitariis, lobis corollae crenulatis. *Braſil.* (Schulteſia crenuliflora Mart. t. 180.)

gracilis * 13. S. caule baſi ramoſo gracili paucifolio, foliis ſeſſilibus lanceolatis nervoſis, ramis 1floris, corollae lobis ovatis. *Braſil.* (Schulteſia gracilis Mart. t. 181.)

Ad S. jorullenſem * Schulteſia ſtenophylla Mart. t. 182.

Ad *Coutoubeam.*

C. ſpicata Aubl. (C. denſiflora Mart.)

pag. 531.

Poſt *Heliotropium:*

PRESLEA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis, limbo 10-dentato, dentibus alternis minoribus introrſum conniventibus. Faux faſciculis pilorum 5. Antherae conniventes apice barbatae, latere membrana auctae. Drupa 4pyrena.

paradoxa Mart. *Braſil.* Herba ramoſiſſima incano-hirſuta, foliis lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque flavis.

pag. 562.

Anchuſa alpeſtris Stev. del. Eſt enim Lycopſis alpeſtris Lehm. p. 555.

Anchuſa criſpa Moris. Viv. 36. A. ſtrigoſiſſima diffuſa, foliis oblongis baſi attenuatis repando-dentatis, racemis laxis, calycibus ſubgloboſis corolla brevioribus, ſeminibus triquetris glabris. *Sardin. Corſica.*

pag. 570.

Anagallis collina Schousb. habitat et in *Sardinia.*

pag. 585.

Ad *Spigeliam.* Cur. poſt p. 58. 59.

Sp. Olferſiana Schlechtend. eſt Sp. pulverulenta Mart. t. 192.

Sp. laurina Schlechtend. — — glabrata Mart. t. 193.

pulchella Mart. 12. Sp. caule herbaceo ſulcato-angulato ſuperne ſubaphyllo laevi, foliis minutis linearibus, ſpicis ſolitariis, antheris limbum corollae aequantibus, fructibus glabris. *Braſil.*

puſilla Mart. 13. Sp. caule herbaceo 4gono decumbente foliisque petiolatis ovatis acutiusculis pubeſcentibus, ſtaminibus incluſis, fructibus glabris. *Braſil.*

pag. 586.

Ad *Liſianthum.*

alpeſtris Mart. 34. L. caule 4quetro, foliis ſeſſilibus orbicularibus marginatis 3nerviis glabris, pedunculis terminalibus paucis. *Braſil.* (Flores violacei.)

pendulus Mart. 35. L. caule alato, foliis ſeſſilibus ovato-oblongis 3-5nerviis, pedunculis ſubternis terminalibus elongatis flexuoſis, calycis laciniis acuminatis. *Braſil.* Flores violacei.

Ad L. *chelonoidem* L. viridiflorus Mart.

Ad L. ſpecioſum Schlechtend. v. ſupra 59. inflatus Mart.

Ad L. campanulaceum Lam. ampliſſimus Mart.

Ad L. ſpathulatum Bonpl. fere pertinet: *Helia oblongifolia* Mart. caule tereti ſimplici, foliis ſpathulatis obtuſis, floribus cymoſis, calycibus obtuſis, tubo corollae gibbo. *Braſil.*

pulcherrimus Mart. 36. L. caule alato, foliis ſeſſilibus ovatis acutis marginatis 3plinerviis, pedunculis corymboſis 3fidis elongatis, corollis amplis campanulatis e tubo gracili. *Braſil.* Flores coccinei.

Ad L. pedunculatum Schlechtend. ſupra p. 59. elegans Mart. ſed pedunculi 2fidi.

tenuifolius * 37. L. caule ſimplici alato, foliis linearibus marginatis revolutis, pedunculo terminali ſolitario, floribus cernuis (coccineis). *Braſil.* (L. anguſtifolius Mart.)

paniculatus * 38. L. caule 4gono, foliis petiolatis lanceolatis triplinerviis, paniculae laxae ramis flexuosis, corolla glanduloso-pubescente. *Brasil.* (Irlbachia paniculata Mart.)

pag. 589.

Ad *Hippion* *.

diffusum * 5. H. caule gracili superne divisо, foliis quaternis ternisve ovatis acutis, floribus laxe paniculatis. *Brasil.* (Schübleria diffusa et conferta Mart.)

Ad Hippion controversum * Schübleria stricta Mart. t. 187. Eximia analysis.

patulum * 6. H. caule gracili paniculato, foliis linearibus, corollae laciniis acutiusculis. *Brasil.* (Schübleria patula Mart. t. 188.)

pag. 670.

Post *Rotulam* Lour.:

RHABDIA Mart.

Asperifoliae.

Cal. 5partitus. Cor. campanulata. Stam. inclusa. Stigma 2lobum. Bacca 4pyrena.

lycioides Mart. *Brasil.* Frutex ramis virgatis, foliis sparsis fasciculibus oblongis undulatis hirsutis, floribus bracteatis pedunculatis purpurascentibus.

pag. 671.

Theophrasta glycycarpa del.

LEONIA R. et P.

Cal. 5lobus. Cor. campanulata 5partita. Filamenta connata. Antherae 2loculares. Bacca 1locularis, placentatio parietalis.

racemosa Mart. 1. L. paniculis racemosis axillaribus pendulis. *Peru. Brasil.* (L. glycycarpa R. et P.)

cymosa Mart. 2. L. cymis axillaribus patulis. *Brasil.*

pag. 704.

Ad *Cinchonam.*

Post n. 13. *gratissima* Wall. 19. C. foliis elliptico-oblongis acuminatis subtus ad venas villosis, stipulis caducis lanceolatis glabris, paniculae ramis decussatis calycibusque villosis, seminum membrana crenulata. *Nepal.* Speciosissima familiae.

pag. 736.

Campanula lobelioides habitat in *Calabria*, Berger.; in *Sardinia*, Moris.

pag. 766.

Ad *Hirtellam.*

canomenſis * 9. H. racemis axillaribus bracteatis pendulis villoſis, floribus polyandris, foliis oblongis ſubtus ferrugineis. *Braſil.* (Moquilea canomenſis Mart. 2. t. 166.)

tomentella Schott. 10. H. racemis terminalibus ferrugineo-tomentoſis, floribus 6-7andris, foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra glabratis ſubtus hirſutis. *Braſil.*

anguſtifolia Schott. 11. H. racemis ſimplicibus nutantibus hirtis, floribus 7-9andris, foliis ſubcordato-lineari-lanceolatis acutis utrinque hirſutis. *Braſil.*

pag. 817.

Achyranthes aſpera habitat et in *Sardinia.* Moris.

pag. 848.

Aſclepias filiformis * mutetur in *Jacquinianam* *.

pag. 895.

Tordylium humile Desf. habitat et in *Sardinia.* Moris.

pag. 930.

Poſt *Microteam:*

ADENOGRAMMA Reichenb.

Cor. calycina infera caduca 5petala, petalis ſtriatis. Stam. ſimplicia cum petalis alternantia. Stigmata 2. Germen 3lobum glanduloſum 1ſpermum. Embryo inverſus curvatus.

Mollugo Reichenb. *C. B. S.* Herba tenera ramoſa, foliis linearibus verticillatis, floribus paniculatis.

pag. 956.

Ad *Sibbaldiam.*

Poſt n. 2. *californica* * 7. S. erecta viſcido-piloſa, foliis pinnatis pinnatifidisque, floribus paniculatis 10andris polygynis, petalis calyce brevioribus. *California.* (Horkelia californica Schlechtend.)

TOM. II.

pag. 62.

Ad *Lilium.*

giganteum Wall. 24. L. caule elato multifloro, foliis petiolatis cordato-ovatis acuminatis venosis, floribus racemoso-spicatis cernuis intus glabris. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 12. 13.)

pag. 126.

Ad Amajouam guianensem Aubl., Martio monente, pertinere videtur Ehrenbergia ciliata * p. 133., quae igitur delenda.

pag. 133.

Post *Amooram* Roxb.:

PREPUSA Mart.

Cal. campanulatus 6fidus alatus. Cor. 6fida. Stigma 2lamellatum. Caps. 1locularis 2valvis, valvis introflexis placentiferis. *Gentianea*, a Sebaea et habitu et numero partium differt.

montana Mart. *Brasil.* Frutex foliis obovato-oblongis emarginatis 3nerviis marginatis, floribus racemosis flavidis.

pag. 157.

Post *Menispermum:*

HOLLBÖLLIA Wall.

Flores monoeci. Perianth. 6phyllum duplici serie. Stam. distincta. Glandulae 6 staminum basi oppositae. Baccae oblongae folliculares 1loculares polyspermae.

latifolia Wall. 1. H. foliis quinatis ovato-oblongis 3nerviis, floribus racemosis. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 16.)

angustifolia Wall. 2. H. foliis septenatis lineari-lanceolatis acuminatis, floribus umbellatis. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 17.)

pag. 192.

Ad Ericam scopariam add. patriam: *Europ. austr.*

pag. 235.

Post *Fuchsiam:*

SARCOPYRAMIS Wall.

Cal. inverse pyramidatus 4dentatus, dentibus ciliatis. Antherae simplices rectae. Caps. basi calyce cincta apice 4alata 4locularis polysperma.

nepalenſis Wall. *Nepal.* Herba ſimplex, caule 4gono, foliis oppoſitis petiolatis ovatis acuminatis ciliato-ſerratis nervoſis, floribus ſubumbellatis carnoſis roſeis. (Wallich. flor. nepal. t. 23.)

pag. 237.

Daphne oleoides Schreb. habitat et in *Sardinia.*

pag. 286.

Poſt *Styracem:*

DICLIDANTHERA Mart.

Cal. 5partitus. Cor. infundibuliformis. Antherae in fauce ſeſſiles 2valves. Stigma ſimplex. Bacca oligoſperma.

penduliflora Mart. 1. D. foliis alternis oblongis, petiolis 2glandulofis, racemis pendulis. *Braſil.*

laurifolia Mart. 2. D. foliis oblongis, petiolis eglandulofis, racemis erectis pubeſcentibus. *Braſil.*

Potaliam amaram Aubl. nomine P. reſiniferae Martius nov. gen. t. 170. eximie illuſtravit. Reſiniferam eſſe Aubletius ipſe (1. p. 596.) teſtatur.

pag. 287.

Ad Gaultheriam procumbentem forte *Arbutus acadienſis* Mill., quae nusquam a nuperis ſcriptoribus americanis indicatur.

pag. 325.

Ad *Tribulum.*

braſilienſis * 8. Tr. foliis 5jugis oblique ovatis villoſiusculis, pedunculis folio brevioribus, fructibus criſtatis decaſpermis. *Braſil.* (Ehrenbergia tribuloides Mart.)

pag. 511.

Ad *Pyrum.*

Poſt n. 38. *ſorbifolia* Chamiſſ. 44. P. foliolis ovato-lanceolatis argute ſerratis acuminatis nervo margineque piloſis apice barbatis, gemmis glutinoſis, ſtipulis rufo-villoſis. *Camtſchatca.*

pag. 527.

Ad *Rubum.*

tagallus Chamiſſ. 78. R. ramis teretibus tomentoſis, aculeis ſparſis uncinatis, foliolis ovatis duplicato-ſerratis pubeſcentibus eglandulofis, floribus ſubſolitariis, laciniis calycis elongatis petala ſubaequantibus demum reflexis. *Inſ. Luzon.*

Mundtii Schlechtend. 79. R. ramis angulatis tomentoſis eglandulofis, aculeis uncinatis crebris, foliis pinnatis ternatisque

ſupra piloſis ſubtus incano-tomentoſis, panicula coarctata, petalis obovatis calyce brevioribus. *Afric. auſtr.*

chryſocarpus Schlechtend. 80. R. ramis tomentoſis glanduloſis, aculeis ſparſis uncinatis, foliis pinnatis ternatisque ſupra glabris ſubtus tomentoſis glanduloſis, panicula coarctata, petalis obovatis calycem aequantibus. *Afric. auſtr.*

pag. 528.

Poſt n. 21, *Selloi* Schlechtend. *81. R. ramis aculeatiſſimis, ſterilibus pentagonis fertilibus teretibus, foliis quinatis ternatisque ſubtus villoſiſſimis, panicula elongata, calycibus fructiferis erectis. *Monte Video.*

imperialis Schlechtend. 82. R. ramis ſterilibus pentagonis glabris, aculeis uncinatis, foliis quinatis ternatisque utrinque viridibus, calycibus tomentoſis petala excedentibus demum reflexis. *Braſil.*

pag. 530.

urſinus Chamiſſ. 83. R. ramis teretibus tomentoſis, aculeis crebris ſubulatis rectis, foliis ternatis ſimplicibusque ſubtus incano-tomentoſis, floribus paniculatis, calycibus aculeatis. *California.*

pag. 531.

vitifolius Chamiſſ. 84. R. ramis pubeſcentibus, aculeis rectiusculis ſubreverſis, foliis cordatis 3lobis glabriusculis, floribus corymboſis, laciniis calycis elongatis acuminatis. *California.*

pag. 536.

Ad *Potentillam.*

lignoſa W. herb. 110. P. fruticoſa, ramis tortuoſis compreſſis, foliis quinato-digitatis ſericeis, foliolis cuneatis truncatis apice dentatis, pedunculis ſolitariis. *Hyrcania.*

pag. 541.

Poſt n. 82. *elegans* Schlechtend. 111. P. caule erecto 1floro, foliis petiolatis glabriusculis ternatis, foliolis profunde inciſo-lobatis, lobis linearibus obtuſis integerrimis 3fidisque, ſtipulis membranaceis acutis, petalis obcordatis calycem ſuperantibus. *Camtſchatca.*

pag. 543.

Ad *Sieverſiam.*

rotundifolia Chamiſſ. 9. S. foliis pinnatis, foliolis cordato-orbiculatis obſolete lobatis duplicato-dentatis radiatim nervoſis, caule foliato paucifloro, laciniis calycis

subdentatis, petalis late obcordatis. *Inf. Aleut.* (Geum rotundifolium Langsd. Cand.)

pag. 600.

Myrodendron Schreb. melius in Monadelphia collocatur. Drupa 8locularis, loculis 4 super. 4 inferioribus.

crassifolium * 2. M. foliis obovato-oblongis subemarginatis integerrimis, petiolis alatis, panicula corymbosa. *Brasil.* (Humirium Mart.)

floribundum * 3. M. foliis obovatis in petiolum decurrentibus, ramis pedunculisque ancipitibus, floribus corymbosis. *Brasil.* (Humirium Mart.)

pag. 612.

Ad *Cliffortiam.*

filicaulis Schlechtend. 24. Cl. caule ramosissimo prostrato, ramis filiformibus, foliis fasciculatis cuneato-obovatis 3dentatis margine villoso ciliatis, stipulis membranaceis lanceolatis acutis. *Afric. austr.*

Ad Cl. *obcordatam.* (Cl. serpyllifolia Schlechtend.)

pag. 628.

Ad *Marialveam.*

brasiliensis Mart. 4. M. foliis lanceolatis glabris, pedunculis geminis 1floris. *Brasil.*

pag. 642.

Ad *Cadsuram* Juss.

grandiflora. Wall. 2. C. fruticosa volubilis, foliis oblongis acuminatis serratis subtus reticulatis, pedunculis 1floris. *Nepal.*

propinqua Wall. 3. C. fruticosa volubilis, foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis, floribus subfasciculatis, pedunculis bracteatis. *Nepal.*

Ad Schizandram Mx. accedere Wallich.

pag. 643.

Ad *Magnoliam.*

insignis Wall. 20. M. arborea, foliis oblongis acuminatis subtus glaucis venoso-reticulatis, gemmis ferrugineo-tomentosis, floribus terminalibus solitariis 9petalis, petalis 3 exterioribus reflexis, capsulis 4spermis. *Nepal.*

excelsa Wall. 21. M. arborea, foliis oblongo-ellipticis acuminatis subtus glaucis reticulato-venosis, gemmis ferrugineo-barbatis, floribus solitariis 12petalis, capsulis globosis remotis 1spermis. *Nepal.*

Ad *Micheliam.*

lanuginoſa Wall. 12. M. arborea, foliis oblongis utrinque attenuatis ſubtus gemmisque denſe tomentoſis, floribus polypetalis. *Nepal.*

pag. 851.

Crambe reniformis Desf. habitat et in *Sardinia.*

pag. 911.

Braſſica Sabularia Brot. habitat et in *Sardinia.*

TOM. III.

pag. 37.

Ad *Paſſifloram.*

Poſt n. 20. *nepalenſis* Wall. 86. P. foliis cordato-oblongis integerrimis ſubtus petiolisque glandulosis, pedunculis ſquamatis aggregatis, calyce coronam triplicem ſuperante. *Nepal.*

†*cochinchinenſis* * 87. P. foliis oppoſitis ovatis integerrimis glabris, petiolis 2glandulosis, floribus axillaribus geminis. *Cochinchina.* (P. pallida Lour.)

pag. 92.

Malva althaeoides Cav. habitat et in *Sardinia.*

pag. 182.

Ad *Ononida.*

litoralis Moris. 78. O. herbacea diffuſa villoſa, foliolis obovatis argute ſerratis glandulosis, ſtipulis late amplexicaulibus ovatis ſerrulatis, floribus racemoſis, calycibus corollam ſubaequantibus, leguminibus 1ſpermis. *Sardiniae litora.*

pag. 270.

Ad *Ervum.*

ſardoum Moris. 16. E. pedunculis racemoſis, leguminibus diſpermis pendulis foliolisque truncato-emarginatis mucronatis glaberrimis, petiolis cirriferis, ſtipulis lineari-lanceolatis ciliatis. *Sardinia.*

pag. 367.

n. 2918. *Brunonia* Sm. del. Eſt enim jam vol. 1. p. 588. n. 577.

pag. 561.

n. 112. Senecio *Cinerariae* * loco arenarii, appoſitis M. B. et Viv. ſynonymis.

pag. 666.

Ad *Scorzoneram.*

ſardoa Moris. 38. Sc. foliis linearibus obtuſiusculis nervoſis ſparſe piloſis, ſcapo ſubſquamato, anthodio glabro. *Sardinia.*

pag. 769.

Ad *Arum.*

Poſt n. 21. *ſpecioſum* Wall. 32. A. acaule, folio ſolitario ternato, foliolis cordato-ovatis acuminatis repandis venoſis, ſpatha ſtriata longe acuminata, ſpadice apice longiſſime filiformi. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 20.)

coſtatum Wall. 33. A. acaule, folio ſolitario ternato, foliolis elliptico-oblongis acuminatis venoſo-coſtatis, lateralibus ſemicordatis, ſpatha nervoſo-ſtriata acuminata, ſpadice apice longiſſime filiformi. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 19.)

nepenthoides Wall. 34. A. caule erecto variegato, foliis binis peltatim digitatis, foliolis ſubſeſſilibus lanceolatis acuminatis ſubtus glaucis, ſpatha variegata apice triloba, lobis lateralibus obtuſis reflexis, medio acuminato, ſpadice clavato obtuſo. *Nepal.* (Wallich. flor. nepal. t. 18.)

INDEX

AUCTORUM IN HOC OPERE CITATORUM.

Abel. Clarke Abel, medicus oratoris britannici in China, Amherſtii: *A narrative of a journey in the interior of China.* Lond. 1818. 4. Plantas ab eo collectas R. Brownius illuſtravit.

Ach. Achar. Eric. Acharius, medicus provincialis Vadſtenae in Suecia († 1819): *Lichenographiae ſuecicae prodromus.* Lincop. 1798. 8. *Methodus lichenum.* Stockh. 1803. 8. *Lichenographia univerſalis.* Gott. 1810. 4. *Synopſis methodica lichenum.* Lund. 1814. 8. Obſ. in actis acad. ſuec. holm., in actis ſoc. Linn. et hiſt. nat. Moſcov.

Adam. Jo. Frider. Adam, comitis Muſſin-Puſchkin in itinere per Caucaſum (1800—1802) ſocius. Decades 5 novarum plantarum: in Weber's et Mohr's Beyträgen zur Naturkunde, Bd. 1.

— M. F. Adams Sibiriam arcticam et orientalem perſcrutatus eſt. Obſerv. in actis acad. Petropol. et ſoc. hiſt. nat. Moſcov.

Adanſ. Mich. Adanson, acad. pariſ. ſocius, diu in Afric. occidentali vixit. (nat. 1725 † 1806.) *Familles des plantes.* vol. 1. 2. Paris 1763. 8.

Afzel. Ad. Afzelius, prof. Upſalienſis. *Genera plantarum guineenſium.* Upſal. 1809. 4. *Remedia guineenſia.* Upſal. 1816. 4. Obſ. in act. holm. 1783. 1788 f.

Ag. Car. Agardh, prof Lundinenſis. *Synopſis algarum Scandinaviae.* Lund. 1817. 8. *Några Ord om Tobaks odlingens förbättring.* 1819. 8. *Species algarum rite cognitae.* Lund. 1820. 8. *Icones algarum inéditae.* Lund. 1820 f. *Syſtema algarum.* Lund. 1824. 8. Obſ. in nov. act. nat. cur. 13.

Ait. Gul. Aiton, horti Kewenſis regii praefectus (nat. 1731 † 1793), auxilio Jonae *Dryandri* edidit *Hortum kewenſem.* vol. 1—3. Lond. 1789. 8. Filius, Gul. Townſend Aiton, ſucceſſor patris, adjuvante inprimis R. *Brownio*, ſecundam editionem curavit, vol. 1—5. Lond. 1810—1813. 8.

Alb. et Schw. J. B. ab Albertini et Lud. Dav. a Schweiniz, eccleſiae Moravicae addicti: *Conſpectus fungorum in agro Niskienſi creſcentium.* Lipſ. 1805. 8.

Allam. I. Allem. Frider. Allamand: Obſ. in nov. act. nat. cur. vol. 4.

Allion. Carol. Allioni, prof. Taurinenſis (nat. 1725 † 1804): *Flora pedemontana*, vol. 1—3. Aug. Taur. 1785. fol. *Auctarium ad floram pedemontanam.* Taurin. 1789. 4.

P. Alpin. Proſper Alpini, prof. Patavinus, diu in Aegypto et Graecia degit (nat. 1553 † 1617.). *De plantis Aegypti*, ed. J. Vesling. Patav. 1640. 4. *De plantis exoticis.* Venet. 1627. 4.

S. Amand. . . S. AMANS: Obſ. in Recueil des travaux de la ſoc. d'agriculture d'Agens, vol. 1.

Anderſ. Georg. ANDERSON, horti Chelſeani praefectus: Obſ. in Transact. of Linn. ſoc. 11. 12.

— Gul. ANDERSON, medicus in inſula S. Vincentii, multas in Britanniam plantas novas introduxit.

Andr. Henr. ANDREWS, pictor: *The botaniſts repoſitory*, vol. 1—6. Lond. 1797 f. *Coloured engravings of heaths*, vol. 1—5. Lond. 1802 f.

Andrz. Anton. ANDRZEIOWSKI, adjutor Beſſeri, regiones Tyrae, Boryſtheni et Hypani finitimas orasque Ponti euxini ſedulo peragravit, plantas inprimis cruciferas ſcienter illuſtravit. Obſ. ejus et Beſſerus et Candolleus divulgarunt.

Anguill. Ludov. ANGUILLARA, prof. Patavinus et Ferrarienſis (†1570.) Italiam, Graeciam, Macedoniam et Dalmatiam peragravit. *Semplici.* Vineg. 1561. 8.

Arbr. Anton. DE L'ARBRE: *Flore d'Auvergne.* vol. 1. 2. Clermont. 1800. 8.

Arduin. Petr. ARDUINO, prof. Patavinus. *Animadverſionum botanicarum* ſpecimen 1 et 2. Patav. 1759. Venet. 1764. 4. Obſ. in Saggi dell' accad. di Padova, 1. 2.

Arnott. G. A. *Walker*-ARNOTT: Obſ. in Mem. of the Wernerian ſoc., in Edinb. philoſ. journ., in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. à Paris, 2.

Aſpegr. G. Caſten ASPEGREN, piſtor Carolicoronae in Suecia: *Förſök til en Blekingſk flora.* Carlscrona. 1823. 8.

Aſſ. Ignat. DE ASSO: *Synopſis ſtirpium indigenarum Arragoniae.* Maſſil. 1779. 4. Enumeratio ſtirpium in Arragonia detectarum, recuſ. in Römer. ſcript. de plantis hiſpanicis.

Aub. v. *Thuar.*

Aubl. Fuſaeus AUBLET, peregrinator, qui diu in Guiana gallica vixit. *Hiſtoire des plantes de la Guiane françaiſe.* vol. 1—4. Paris 1775. 4.

Balb. Jo. Bapt. BALBIS, prof. Taurinenſis, jam Lugdunenſis, cui innumeras debeo plantas. *Flora taurinenſis*, Taurin. 1806. 8. *Horti academici taurinenſis icones et deſcriptiones*, faſc. 1. Taurin. 1810. 4. Eo potiſſimum et Domin. *Nocca* auctoribus: *Flora ticinenſis*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obſ. in act. acad. Taurinenſis.

Baldw. Gul. BALDWYN, medicus Savannae in Georgia Amer. bor., Elliottio, Nuttallio aliisque multas largitus eſt plantas. Obſ. in Silliman's americ. Journal.

— Gul. BALDWIN, Philadelphenſis, cum Torreyo plura communicavit.

Banks. Joſ. BANKS, praeſes regiae ſocietatis britannicae, Cookii comes illuſtris in primo itinere περιοσαύω: plurimas plantas, ab ipſo inventas et nuncupatas, aliis deſcribendas commiſit (nat. 1743 †1820.). *Reliquiae Houſtounianae.* Lond. 1781. 8. *Icones ſelectae plantarum, quas Kämpferus in Japonia collegit et delineavit.* Lond. 1791. fol. *On the blight in corn.* Lond. 1805. 4., recuſ. in Annals of bot. 2.

Barrel. Jac. BARRELIER, ex ordine monachorum Dominici, magnus peregrinator (nat. 1606 †1673.): *Plantae per Galliam, Hiſpaniam et Italiam obſervatae*, ed. Aut. Juſſieu. Paris 1714. fol.

Bart. Gul. P. C. BARTON, prof. Philadelphenſis: *Compendium florae philadelphicae.* vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8.

Bartl. Frider. Theophil. BARTLING, M. D. Gottingenſis: *Dioſmeae deſcriptae et illuſtratae.* Gott. 1824. 8.

Bartr. Gulielm. BARTRAM, praedii et horti botanici prope Philadelphiam poſſeſſor: *Travels through South- and North-Carolina.* Philadelph. 1791. 8.

Bát. T. BATARD, Andegavienſis: *Flore du département de Maine et Loire.* Angers. 1809. 12. *Notices ſur les végétaux du jardin des plantes d'Angers.* 1810. 12. *Supplément à la flore.* 1812. 12.

Batſch. Jo. Georg. Car. Aug. BATSCH, prof. Jenenſis (nat. 1761 † 1802): *Elenchus fungorum*, tab. 1—30. Hal. 1783. 1784. 4.

Battarr. Jo. Ant. BATTARRA († 1789): *Fungorum agri Ariminenſis hiſtoria.* Favent. 1759. 4.

Bauer. Ferdin. BAUER, pictor egregius: *Illuſtrationes plantarum novae Hollandiae.* Lond. fol. 1813. tab. 1—10.

C. Bauh. Caſp. BAUHINUS, prof. Baſileenſis (nat. 1550 † 1624): *Prodromus theatri botanici.* Frcf. 1620. 4. *Pinax theatri botanici.* Baſil. 1623. 4.

J. Bauh. Jo. BAUHINUS, prioris frater, archiater Montisbeligardi (nat. 1541 † 1613): *Hiſtoria plantarum univerſalis.* vol. 1-3. Ebrodun. 1650. 1651. fol.

Baumg. Jo. Chriſt. Gottl. BAUMGARTEN, medicus Schäsburgi in Transſylvania: *Flora lipſienſis.* Lipſ. 1790. 8. *Enumeratio ſtirpium magno ducatui Transſylvaniae indigenarum*, tom. 1—3. Vindobon. 1816. 8. Multas mihi plantas largitus eſt.

Beck. Ludov. C. BECK, ſcholae Renſſelaerianae collega in Albania Amer. bor., regiones Miſſuri vicinas perſcrutatus eſt. Obſ. in Silliman's amer. Journ.

Bellard. Ludov. BELLARDI, praefectus horti bot. Taurinenſis: *Appendix ad floram pedemontanam.* Aug. Taurin. 1792. 4. Innumeras plantas ab ipſo accepit Willdenovius.

Berg. Petr. Jon. BERGIUS, prof. Holmienſis († 1790): *Deſcriptiones plantarum e capite bonae ſpei.* Stockh. 1767. 8. *Materia medica e regno vegetabili.* vol. 1. 2. Stockh. 1778. 8. Obſ. in act. acad. holm. et petropolit.

— Car. Henr. BERGIUS, Cuſtrinenſis, pharmacopola, in regionibus C. B. S. vicinis multas collegit plantas, quas jam herbarium regium berolinenſe continet. (Nat. 1792 † 1817.)

— O. E. BERGIUS: *Om Veſtindien.* Stockh. 1819. 8.

Berger. .. BERGER, egregius plantarum italicarum collector, tum miles, pro patria cecidit 1813.

— Jo. BERGERET, medicus Pali in Bearnia: *Flores des baſſes Pyrénées.* vol. 1. 2. Pau. 1803. 8.

Bernh. Jo. Jac. BERNHARDI, prof. Erfurtenſis. Obſ. in Schraderi diario 1799 f. Multas tum in horto cultas tum ſpontaneas plantas cum aliis communicavit.

Berter. Car. Joſ. BERTERO, eximius peregrinator, qui per Indiam occidentalem ſtudioſe et ſcienter plantas collegit et cum magiſtro Balbiſio communicavit. Ab hoc plurimas accepi.

Bertol. Antonin. BERTOLONE, prof. Bononienſis: *Amoenitates italicae.* Bonon. 1819. 4. Is liber complectitur, quae prius ſeorſim ediderat. Obſ. in Opuſc. ſcientif. di Bologna.

Beſſ. W. J. J. BESSER, prof. Creminicenſis in Volhynia: *Primitiae florae Galiciae.* vol. 1. 2. Vienn. 1809. 12. *Enumeratio planta-*

rum in Volhynia etc. *collectarum.* Viln. 1822. 8. Multas ipſi plantas debeo.

Bichen. J. E. BICHENO, Scotus: Obſ. in Transact. of Linn. ſoc. 12.

Bigel. Jac. BIGELOW: *Florula boſtonienſis.* Boſton. 1814. 8.

Billb. Jo. Georg. BILLBERG cum Swartzio botanicon ſuecicum *(Svenſk botanik)* edidit.

— Imman. BILLBERG: diſſ. plantarum braſilienſium decas. Upſal. 1817. 4.

Bir. J. A. J. BIRIA: *Hiſtoire naturelle et médicale des Renoncules.* Montpell. 1811. 4.

Bivon. Anton. BIVONA-*Bernardi*, *L. B. de Alta turre: Sicularum plantarum cent.* 1. Panorm 1806. 8. *Monograſia delle Tolpidi.* Palerm. 1809. fol. *Stirpium rariorum in Sicilia provenientium manip.* 1—4. Panorm. 1813—1816. 4.

Blan. Gilb. BLANE, medic. Londinenſis: Obſ. in Philoſ. transact. vol. 80. et in Transact ſoc. Bengal. 4.

Bland. Otto Chriſt. BLANDOW, pharmacopola Warenenſis Megapol. Muſci frondoſi exſiccati faſc. 1—5. Florulae Starmianae faſc. 9. elaboravit.

Blom. Car. Magnus BLOM, medicus Suecanus: Obſ. in act. acad. holm.

Blum. C. L. BLUME, praefectus horti botanici ad Bataviam, Javam perſcrutatus eſt. *Catalogus van de gewaſſen in't Planteſuin te Buitenzorg.* Batav. 1823. 8. *Bijdragen tot de Flora van nederlandſche Indië.* St. 1—5. Batav. 1825. 1826. Obſ. in Verhandel. van het bataav. Genootſch. 9., in nov. act. nat. cur. (interprete Neeſio) et in Regensb. bot. Zeit.

Bocc. Sylv. Paul. BOCCONE, monachus ſiculus, botanicus magni Etruriae ducis, plantarum collector (nat. 1633 † 1704): *Muſeo di piante rare.* Venez. 1697. 4.

Böb. Jo. A BÖBER, *παιδαγωγίας* equeſtris ruthenicae director (nat. 1746 † 1820). Obſ. in Pallas neuen nord. Beytr. Plantarum copiam ab eo Willdenovius habuit.

Böhm. Georg. Rud. BÖHMER, prof. Wittebergenſis (nat. 1723 †1803): *De plantis in culturam memoriam nominatis.* Lipſ. 1799. 8.

Bönningh. C. M. F. A BÖNNINGHAUSEN, a conſil. regiminis Monaſterii: *Prodromus florae Monaſterienſis.* Monaſt. 1824. 8.

Boerh. Hermann. BOERHAAVE, prof. Leidenſis (nat. 1668 † 1738): *Index primus et alter plantarum, quae in horto lugdunenſi aluntur.* LB. 1710. 1720. 4.

Bolt. Jac. BOLTON: *Filices britannicae.* P. 1. 2. Leeds et Huddersfield. 1785. 1790. 4. *Geſchichte der merkwürdigſten Pilze*, Th. 1—3., interprete Willdenow. Berl. 1795—1799. 8. Th. 4., curantibus Neeſiis. Berl. 1820. 8.

Bonam. Franc. BONAMY: *Florae nannetenſis prodromus.* Nannet. 1782. 12. *Addenda ad prodromum.* 1785. 12.

Bondt. Nic. BONDT, prof. Amſtelodamenſis (nat. 1765 † 1796): *Diſſ. de cortice Geoffraeae ſurinamenſis.* LB. 1788. 8.

Bonpl. Amatus BONPLAND, Humboldtii comes, dein hortis regiis Malmaiſon et Navarre praefuit, poſt Americam auſtralem adiit, ubi jam obſes a Francia, apud quem ſumma eſt rerum in Paraguay, detinetur. Humboldtii plantas aequinoctiales et Melaſtomata curavit. *Deſcription des plantes rares, cultivées à Malmaiſon et à Navarre.* faſc. 1—10. Paris 1813—1816. fol.

Borkhauſ. Maurit. Balthaſ. BORKHAUSEN, Darmſtadienſis: *Beſchreibung der im Darmſtädtſchen wachſenden Holzarten.* Frkf.

1790. 8. *Tentamen dispositionis plantarum Germaniae seminiferarum.* Darmst. 1792. 8. *Handbuch der Forstbotanik.* Th. 1. 2. Giess. 1800—1803. 8. Obs. in Römeri Archiv. 1. 2.

Bory. Jo. Bapt. BORY *S. Vincent*, Agini in Aquitania natus, insulas Mascarenas 1802—1803 perscrutatus est, e quibus ingentem plantarum numerum cum Willdenovio communicavit, dein sub Napoleone stipendia meruit, post Bruxellis *Annales générales des sciences physiques* tom. 1—8. redegit, jam Parisiis privatam agit vitam. *Voyage dans les principales îles des mers d'Afrique.* Paris 1804. 4. Obs. in annalibus bruxellensibus, musei parisiensis, soc. nat. scrutator. berol. (Berl. Magaz. 2. 3.)

Bosc. Ludov. Bosc, peregrinator, jam praefectus horti regii parisiensis. Obs. in actis instit. gallici, in Dictionn. des scienc. natur. et in Berl. magaz. 5.

Bouch. J. A. G. BOUCHER: *Extrait de la flore d'Abbeville.* Paris 1803. 8.

Bradl. Rich. BRADLEY, prof. Cantabrigiensis († 1732): *Historia plantarum succulentarum.* dec. 1—5. Lond. 1716—1727. 4.

Braun. Franc. Ant. a BRAUNE: *Salzburgische Flora.* Th. 1—3. Salzb. 1797. 8.

Bray. Gabriel Comes BRAY, orator regis Bavariae: Obs. in Denkschr. der Regensb. bot. Gesellsch. 1. 2.

Breyn. Jac. BREYN, mercator Gedanensis (nat. 1637 † 1697): *Exoticarum plantarum centuria.* Gedan. 1678. fol. *Prodromi plantarum.* Gedan. 1739. 4.

Brid. Sam. El. a BRIDEL, ducis Gothani legatus: *Muscologia recentiorum.* vol. 1—4. Goth. 1797—1817. 4. *Methodus nova muscorum.* Goth. 1819. 4. *Bryologia universa.* vol. 1. 2. Lipsiae 1826. 1827. 8.

Brigant. BRIGANTI apud Gusson. catal.

Brignol. Jo. BRIGNOLE, prof. Urbinas, dein Veronensis: *Fasciculus rariorum plantarum Forojulienſium.* Urbin. 1810. 4. Obs. in Biblioteca italiana.

Brongn. Adolph. BRONGNIART, acad. paris. socius: Obs. in Mém. du mus., Dictionnaire des scienc. nat., Bullet. de la soc. philomath., Annales des scienc. nat.

Brot. Felix Avellar BROTERO, prof. Conimbricensis, dein Olysiponensis: *Flora lusitanica.* vol. 1. 2. Olysipon. 1804. 1805. 8. *Phytographia Lusitaniae.* Olysip. 1816. fol. Obs. in Transact. of Linn. soc.

Broussn. Petr. Mar. Aug. BROUSSONET, diu in insulis Canariis et Mauritania vixit, denique prof. Monspeliensis (nat. 1761 † 1807): *Elenchus plantarum horti Monspeliensis.* Monspel. 1805. 8. Ingentem plantarum novarum copiam Willdenovio liberaliter donavit.

P. Br. Patric. BROWNE, Hibernus: *Civil and natural history of Jamaica.* Lond. 1756. fol.

R. Br. Robertus BROWN, novam Hollandiam illustravit, jam custos musei Bankiani: *Prodromus florae novae Hollandiae.* Lond. 1810. 8. Appendices doctissimas addidit ad Flinder's voyage to terra australis, ad Salt's voyage to Abyssinia, ad Abel's journey in China, ad Tuckey's expedition on the Congo, ad Ross voyage for the purpose of a northwest-passage, ad Parrey's voyage, ad Clapperton's and Denham's journey. Novam horti kewensis editionem novis multis ornavit: commentarios inserit

ſernit Transact. of Linn. ſoc. et Mem. of the Werner. ſociety. Pleraque haec interpretatus eſt aut recudi curavit C. G. Nees in R. Brown's vermiſchten botaniſchen Schriften. Th. 1. 2. Schmalkalden et Leipz. 1825. 1826. 8.

Bruch. .. BRUCH, pharmacopola Bipontinus: inſignis muſcorum ſcrutator, quorum plerosque mihi largitus eſt. Obſ. in Regensb. bot. Zeit.

Buch. Leopold. A BUCH, illuſtris geognoſtes et phyſiologus: *Phyſicaliſche Beſchreibung der canariſchen Inſeln.* Berl. 1825. 4.

Buchan. v. *Hamilt.*

Bull. .. BULLIARD (nat. 1751 † 1793): *Herbier de la France.* 1780 f. fol.

Burch. Gul. J. BURCHELL: *Travels in the interior of ſouthern Africa.* Lond. 1824. 1825. 4.

Burgsd. Frider. Aug. Ludov. A BURGSDORFF, ſylvarum in marchia Brandenburgica ſummus curator (nat. 1747 † 1801): *Verſuch einer vollſtändigen Geſchichte vorzüglicher Holzarten.* Th. 1. 2. Berl. 1783. 1787. 4. Obſ. in Beobacht. der naturf. Freunde in Berlin.

Burm. Jo. BURMANN, prof. Amſtelodamenſis (nat. 1707 † 1780): *Theſaurus ceilanicus.* Amſt. 1737. 4. *Rariorum africanarum plantarum* dec. 1 — 10. Amſt. 1738. 1739. 4. Plumerii icones edidit.

N. L. Burm. Nic. Laur. BURMANN, prof. Amſtelodamenſis (nat. 1734 † 1793): *Flora indica.* LB. 1768. 4.

Buxb. Jo. Chriſt. BUXBAUM, oratoris ruthenici in Conſtantinopoli medicus, Aſiam minorem ipſamque Armeniam peragravit, poſt academ. petropolit. ſodalis (nat. 1694 † 1730): *Plantarum minus cognitarum* cent. 1 — 5. Petropol. 1728 — 1740. 4. *Enumeratio plantarum in agro halenſi.* Hal. 1721. 8.

Caeſ. Andr. CAESALPINUS, prof. Piſanus (nat. 1519 † 1603): *De plantis.* Florent. 1583. 4.

Camer. Joach. CAMERARIUS, medicus Norimbergenſis (nat. 1534 † 1598): *Hortus medicus et philoſophicus.* 1588. 4. *Epitome Matthioli de plantis.* Frcf. 1586. 4.

Camp. Ant. CAMPANA: *Catalogus plantarum horti Ferrarienſis.* 1812. 8.

Campd. F. CAMPDERA, Hiſpanus: *Monographie des Rumex.* Paris 1819. 4.

Cand. Aug. Pyram. DE CANDOLLE, prof. primum Monspelienſis, jam Genevenſis. *Plantarum ſucculentarum hiſtoria*, faſc. 1 — 28. Paris 1799 — 1803. fol. *Aſtragologia.* Paris 1802. fol. *Flore françaiſe*, ed. 3. vol. 1 — 5. Paris 1805 — 1815. 8. *Synopſis plantarum in flora gallica deſcriptarum.* Paris 1806. 8. *Catalogus plantarum horti botanici monspelienſis.* Monspel. 1813. 8. *Recueil de mémoires ſur la botanique.* Paris 1813. 4. *Regni vegetabilis ſyſtema naturale.* vol. 1. 2. Paris 1818. 1821. 8. *Prodromus ſyſtematis naturalis.* vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. 8. *Icones ſelectae plantarum, quas in ſyſtemate naturali deſcripſit:* delin. Turpin, curavit de Leſſert. vol. 1. 2. Paris 1820. 1822. fol. *Plantes rares du jardin de Genève.* faſc. 1. 2. Genève 1825. fol. *Mémoires ſur les Légumineuſes.* Paris 1825. 4. Obſ. in Annales et Mém. du muſ., in Mém. de la ſoc. nat. de Paris et de Genève.

Carey. Gul. CAREY, medicus in Serampore Ind. or. *Hortus bengalenſis.* 1821. 8. Roxburghii floram indicam vol. 1. curavit. Plantarum novarum copiam in Britanniam miſit.

Carmich. Dugald. CARMICHAEL, navarchus, περίπλῳ celebris, inſulam Acunnae poſt Thuarſium illuſtravit. Obſ. in Transct. of Linn. ſoc. 12.

Caſſin. Henr. CASSINI, ſymbolas plures ad Dictionn. des ſcienc. nat. et Journ. de phyſ.

Caſtigl. Ludov. Comes CASTIGLIONE, Mediolanenſis: *Viaggio negli ſtati uniti dell' America ſettentrionale.* vol. 1. 2. Milano 1790. 8.

Catesb. Marc. CATESBY, peregrinator et collector avium plantarumque in auſtralibus Americae borealis provinciis (nat. 1680 †1749): *The natural hiſtory of Carolina, Florida and the Bahama islands.* vol. 1. 2. et app. Lond. 1731—1743. fol.

Cav. Ant. Joſ. CAVANILLES, prof. Matritenſis (nat. 1745 †1804): *Monadelphiae* diſſ. 10. Matrit. 1790 f. 4. *Icones plantarum et deſcriptiones.* vol. 1—6. Matrit. 1791—1800. fol. *Deſcripcion de los generos y ſpecies, demonſtradas en las lecciones publicas.* Madrid. 1801. 1802. 8. *Anales de ciencias naturales.* n. 1—18. Madrid. 1800—1803. 8.

Cavol. Phil. CAVOLINI, Neapolitanus: *Zoſterae oceanicae ἀνθησις.* Neap. 1792. fol. Recuſ. in Uſteri Ann. 9. et in Ann. of botany, vol. 2.

Cervant. Vincent. CERVANTES, prof. Mexicanus: Obſ. in anal. de cienc. nat. Cum Lagaſca et Humboldtio plura communicavit.

Chaix. . . CHAIX, eccleſiaſticus Vapinci in Delphinatu, dein Baucii in Gallia provinciali, Villarſii comes aſſiduus in itineribus per alpes. Obſ. in Villarſii flora Delphinatus.

Chamiſſ. Adalbert. A CHAMISSO, Kotzebuei comes in itinere περιπλοῦ 1815—1818. Obſ. in Kotzebuei itinerario, in Horis phyſicis berolinenſibus et in Schlechtendalii Linnaea. Filices ex itinere reportatas Kaulfuſsio illuſtrandas tradidit.

Choiſ. J. D. CHOISY: *Prodromus d'une monographie des Hypericinées.* Genève 1821. 4. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Paris. I. Adjuvit etiam Candolleum in prodromo elaborando.

Choris. Ludov. CHORIS, pictor in Kotzebuei περίπλῳ. *Voyage pittoresque autour du monde.* Paris 1822. fol.

Clarion. . . CLARION: Obſ. in Bullet. de la ſoc. philomath. Cum Paliſoto et Candolleo plurima communicavit.

Clark. E. D. CLARKE, clericus: *Travels in various parts of Europe, Aſia and Africa.* vol. 1—8. Lond. 1816. 8.

Clement. Simon de Rojas CLEMENTE, prof. Matritenſis: *Enſayo ſobre los lichenes de Eſpaña.* Madr. 1811. 4. Obſ. in Herrera agricultura general. vol. 1—4. Madr. 1818. 1819. 8.

Cluſ. Car. CLUSIUS, Atrebas, magnus peregrinator et inſtaurator rei herbariae, tandem prof. Leidenſis (nat. 1525 †1609): *Rariorum plantarum hiſtoria.* Antv. 1601. fol. *Curae poſteriores.* Antv. 1611. 4.

Colebr. H. Thom. COLEBROOKE, ad tempus praeſes ſociet. bengal. Obſ. in Aſiatic reſearches, 9. 12. et in Transact. of Linn. ſoc. 12. 13.

Coll. Aloyſ. COLLA: *Hortus ripulenſis.* Taurin. 1824. 4. *Appendix* exſtat in mem. di Torino, 31. Aliae obſ. ib. vol. 25. 27.

Collad. Theod. Frider. COLLADON, Genevenſis: *Hiſtoire naturelle et médicale des Caffes.* Montpell. 1816. 4.

Colsm. Jo. COLSMANN, prof. H[illegible]enſis: *Prodromus deſcriptionis Gratiatae.* Havn. 1793. 8.

Commel. Jo. COMMELYN, ſenator et curator horti Amſtelodam. († 1698): *Horti medici Amſtelodamenſis icones*, vol. 1. 2. Amſt. 1697. 1702. fol.

Commerſ. Philibert. COMMERSON, inſignis peregrinator, Buginvillaei navarchi comes, acutiſſimus ſcrutator, theſauros plantarum reliquit, quae a Juſſievo ſervantur. († 1773.)

le Conte. Jo. LE CONTE in Georgia Amer. bor. Plurimas legit plantas, quas cum Purſhio et Elliottio communicavit. Obſ. in Medical and philoſ. regiſter, 2.

Corr. Joſeph. CORREA *de Serra*, orator Luſitanicus († 1823): Obſ. in Ann. du muſ. et Transact. of Linn. ſoc.

Coult. Thom. COULTER: *Mém. ſur les Dipſacées.* Genèv. 1823. 4.

Crantz. Henr. Jo. Nepom. CRANTZ, prof. Vindobonenſis (nat. 1722 † 1799): *Claſſis Umbelliferarum emendata.* Vienn. 1767. 8. *Claſſis Cruciferarum emendata.* Vienn. 1769. 8. *Stirpes auſtriacae* faſc. 1—6. Vindob. 1769. 4.

Cumin. . . CUMINO: Obſ. in act. taurin. 1805.

Curt. Gul. CURTIS, pharmac. Londinenſis († 1799): *Flora londinenſis*, vol. 1. 2. Lond. 1777 f. *Botanical magazine*, vol. 1—12. Lond. 1787—1798. 8.

Cuſſ. Petr. CUSSON, prof. Monspelienſis (nat. 1727 † 1783): Obſ. in mém. de la ſoc. de médec. à Paris a. 1782. 1783.

Cyrill. Dominic. CIRILLO, prof. Neapolitanus, ad ſupplicium tractus 1799: *Plantarum rariorum regni neapolitani* faſc. 1. 2. Neapol. 1788. 1793. fol.

Dalech. Jac. DALECHAMP, medicus Lugdunenſis (nat. 1513 † 1588): *Hiſtoria generalis plantarum*; vol. 1. 2. Lugd. 1587. fol.

Dalm. . . DALMAN: Obſ. in act. acad. holm. 1811.

Danth. . . DANTHOINE apud Lam. in encycl. bot. 2. p. 585.

Degland. . . DEGLAND apud Loiſeleur. flor. gall.

Delil. Alir. Rafen. DELILE, prof. Monspelienſis, Aegyptum a Napoleone occupatam perſcrutatus eſt. *Florae aegyptiacae illuſtratio.* Paris 1813. fol. Pars operis ſplendidiſſimi: Deſcription de l'Egypte. Multas mihi plantas largitus eſt.

Deliſ. D. DELISE: Obſ. in Mém. de la ſoc. Linnéenne du Calvados, 1.

Desf. Renat. DESFONTAINES, prof. Pariſienſis, Numidiam et Africam propriam 1783—1785 peragravit: *Flora atlantica.* vol. 1. 2. Paris 1800. 4. *Choix de plantes du corollaire des inſtitut. de Tournefort.* Paris 1808. 4. *Tableau de l'école de botanique du jardin du Roi.* Paris 1815. 8. Obſ. in Annal. et Mém. du muſéum. Beneficam ejus voluntatem ſemper gloriabor.

Desport. . . DESPORTES: Obſ. in plantas Cenomanenſes in Perſoonii enchiridio.

Desrouſſ. . . DESROUSSEAUX plura capita in Encycl. bot. vol. 4. elaboravit.

Desv. N. A. DESVAUX: *Journal de botanique.* vol. 1—5. Paris 1808—1814. 8.

Dethard. . . DETHARDING, medicus Roſtochienſis. Plantas rariores megapolitanas et Willdenovio et mihi largitus eſt.

Dew. Cheſter DEWEY, collegii Gulielmi prof. in provincia Maſſachuſetts. Obſ. de caricibus in Silliman's amer. journ. 7—10. Inſignem plantarum copiam ei debeo.

Dickſ. Jac. DICKSON, Scotus, mercatu plantarum ſiccatarum clarus (nat. 1738 † 1822): *Faſc.* 1—4. *plantarum cryptogamicarum Britanniae.* Lond. 1785—1801. 4. Obſ. in Transact. Linn. ſoc.

Dierb. Jo. Henr. DIERBACH, prof. Heidelbergenſis: *Flora Heidelbergenſis.* 1819. 12. *Beytrüge zu Deutſchlands Flora.* Heidelb. 1825. 8.

Dietr. F. G. DIETRICH, hortulanus Iſenacenſis: *Vollſtändiges Lexicon der Gärtnerey und Botanik.* Th. 1—10. Berl. 1802 f. 8.

Dill. Jo. Jac. DILLENIUS, prof. Gieſſenſis, tum praefectus horti Elthamenſis, demum prof. Oxonienſis (nat. 1687 † 1747): *Catalogus plantarum circa Gieſſam naſcentium.* 1718. 8. *Hortus Elthamenſis.* Lond. 1732. fol. *Hiſtoria muſcorum.* Lond. 1741. 4.

Dillw. Lud. Weſton. DILLWYN: *Synopſis of the britiſh Confervae,* faſc. 1—20. Lond. 1802. fol. Interpretationem germanicam Weberus cum Mohrio inchoavit, non abſolvit.

Ditm. L. P. F. DITMAR, ſenator Roſtochienſis: *Die Pilze Deutſchlands*, vol. 1., curante J. Sturm. Nürnb. 1817. 12.

Domb. Joſ. DOMBEY, per Peruviam peregrinatus eſt. (Nat. 1742 † 1795.) Plurimas plantas Juſſieuo largitus eſt: plurimas ab ipſo inventas Ruizius et Pavonius deſcripſerunt.

Don. Dav. DON: *Prodromus florae nepalenſis.* Lond. 1825. 8. Obſ. in Transact. of Linn. ſoc., in Mem. of Werner. ſoc. et in Edinb. philoſ. journ.

— Georg. DON, collector ſoc. horticulturae: faſciculos 9 plantarum Britanniae ficcatarum 1804 et 1805 divulgavit.

Donn. Jac. DONN, praefectus horti Cantabrigienſis: *Hortus cantabrigienſis*, 1804. 8. ed. Purſh. 1815. 8.

Dorthes. .. DORTHES: Obſ. in Journ. de phyſique, 35.

Draparn. Jac. Phil. Raim. DRAPARNAUD, Monspelienſis, algarum ſcrutator.

Dryand. Jonas DRYANDER, cuſtos muſei Bankſiani (nat. 1748 † 1811). Obſ. in Philoſ. transact., in act. acad. holm., in Transact. ſoc. Linn. Adjuvit etiam Aitonium ſeniorem in edendo horto Kewenſi.

Dubois. .. DUBOIS: *Méthode éprouvée, avec laquelle on peut parvenir facilement à connaître les plantes des environs d'Orléans.* Orléans 1803. 8.

Duchesn. Ant. Nicol. DUCHESNE: *Hiſtoire naturelle des fraiſiers.* Paris 1766. 8.

Ducluz. J. A. P. DUCLUZEAU: *Eſſai ſur l'hiſt. naturelle des Conferves des environs de Montpellier.* 1805. 8.

Dufour. Leo DUFOUR, medicus ad fanum S. Severi ad Aturum: Obſ. in annal. bruxell. et in ann. des ſcienc. nat. 5. 8. Multas cum aliis plantas communicavit.

Dufreſn. Petr. DUFRESNE: *Hiſtoire de la famille des Valérianées.* Montpell. 1811. 4.

Duham. Henr. Ludov. DUHAMEL du Monceau, rerum maritimarum curator (nat. 1700 † 1782): *Traité des arbres fruitiers*, vol. 1. 2. Paris 1768. 4. Editionem novam curarunt Poiteau et Turpin.

Dum. Courſ. .. DUMONT-COURSET: *Le botaniſte cultivateur*, vol. 1—7. Paris 1811—1814. 8.

Dun. Mich. Felix DUNAL, ad tempus prof. Monspelienſis: *Hiſtoire des Solanum.* Monspel. 1813. 4. *Solanorum generumque affinium ſynopſis.* Monspel. 1816. 8. *Monographie de la famille des Anonacées.* Paris 1817. 4. Adjuvit etiam Candolleum in elaborando prodromo.

Dupuis. DUPUIS, hortulanus pariſienſis, cum Vahlio plantas communicavit.

Durand. Phil. DURAND: *De quibusdam Chloridis speciebus.* Monspel. 1808. 4.

Duroi. Jo. Philipp. DUROI, medicus Brunfvicenfis (nat. 1741 † 1785): *Die Harbke'fche wilde Baumzucht.* Th. 1. 2. Braunfchw. 1771. 1772. 8.

Duv. Felix DUVAL: Obf. in Mém. du muf. et in annal. bruxell.

— Jeunet DUVAL, prof. Ratisbonenfis: Obf. in Hoppe's Taſchenbuch 1799.

Eat. ..EATON, ſcholae Renſſelaerianae in Albania collega: *Manual of botany.* New-York 1818. 8. Plantas, cum Torreyo et Deweyo communicavit.

Edd. ..EDDY: *Hortus Elginenſis.* (1816.) 8.

Ehrenb. Chriſt. Gothofr. EHRENBERG, inſignis per Aegyptum, Libyam et Arabiam peregrinator: *Sylvae mycologicae berolinenſes.* Berol. 1818. 4. Obf. in Horis phyſ. berol., in Verhandel. der Geſ. naturf. Freunde, in Jahrb. der Gewächsk., in nov. act. nat. cur., in Kunze's mykol. Heften.

Ehrh. Frider. EHRHART, botanicus regius Hannover. († 1795): *Beyträge zur Naturkunde.* Th. 1—6. Hannov. 1787—1792. Collectiones plantarum ab ipſo ſiccatarum auctoritate valent.

Ell. Stephan. ELLIOTT: *A ſketch of the botany of South-Carolina and Georgia.* vol. 1. 2. Charlest. 1817 f. 8.

Ellis. Jo. ELLIS, mercator Londinenſis († 1776): Obf. in Philoſ. transact. 57.

Eſchweil. F. G. ESCHWEILER: *De fructificatione generis Rhizomorphae commentatio.* Elberf. 1822. 4. *Syſtema lichenum.* Norimb. 1824. 4.

Eſp. Eugen. Jo. Chriſt. ESPER, prof. Erlangenſis: *Icones fucorum.* Norimb. 1797—1799. 4.

Etling. Andr. Ern. ETLINGER: *Diſſ. de Salvia.* Erl. 1777. 4.

Euphraſ. Beng. And. EUPHRASÉN: *Reiſe nach der Inſel Barthelemy, Euſtache and Chriſtoph.* Aus dem Schwed. Gott. 1798. 8.

Falk. Jo. Petr. FALK, Georgii comes per Sibiriae partem, Caſani ſibi mortem conſcivit 1774. Obf. in Georgi Bemerkungen einer Reiſe. Petersb. 1775. 4.

Fée. A. L. A. FÉE, pharmacopola Pariſienſis: *Eſſai ſur les cryptogames des écorces exotiques officinales.* Paris 1824—1826. 4.

Feuill. Ludov. FEUILLÉE, monachus doctiſſimus, botanicus regius, diu in Chili vixit. (Nat. 1660 † 1732.) *Journal des obſervations.* tom. 1—3. Paris 1714. 1725. 4.

Ficin. Henr. FICINUS, prof. Dresdenſis: *Flora der Gegend um Dresden.* Th. 1. 2. 1821. 1823. 8.

Fiſch. Ferdin. FISCHER, Halberſtadienſis, primum horti Razumoviani prope Mosquam, jam horti academici Petropolitani praefectus. Obf. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſcou. Ingentem orientalium plantarum meſſem Candolleo et mihi largitus eſt.

Fl. wetter. G. Gärtner, B. Meyer et J. Scherbius: Oekonomiſch-techniſche Flora der Wetterau. Frkf. Th. 1—3. 1799—1802. 8.

Flörk. Henr. Guſt. FLÖRKE, prof. Roſtochienſis. Alpes noricas rhaeticasque ſedulo ſcienterque peragravit, proventus et mecum et cum Willdenovio communicavit. *Deutſche Lichenen.* Lief. 1—10. Berl. 1815. Collectio lichenum ſiccatorum cum idonea expoſitione. Obf. in Hoppe's Taſchenb., in Schrader's Journ., in Berl. Magaz.

Flot. . . A FLOTOW, equitum levis armaturae centurio, eximius lichenum muſcorumque indagator: Obſ. in Jahrb. der Gewächsk.

Flügg. Jo. FLÜGGE, M. D.: *Graminum monographiae.* Hamb. 1810. 8.

Forsk. Petrus FORSKOL, cum Niebuhrio Aegyptum et Arabiam peragravit (nat. 1732 † 1763): *Flora aegyptiaco-arabica.* Havn. 1775. 4. *Icones rerum naturalium.* Havn. 1776. 4.

Forſt. Jo. Rein. FORSTER, Cookii comes in ſecundo περίπλῳ, demum prof. Halenſis (nat. 1729 † 1798): *Characteres generum plantarum.* Lond. 1776. 4. Plantas plerasque a ſe inventas mihi donavit.

— — Filius Georgius, prof. Vilnenſis, demum Moguntinus (nat. 1754 † 1794): *Prodromus florulae inſularum auſtralium.* Gott. 1798. 8. Idem in commentariis Gotting. 1787. floram Magellanicam illuſtravit.

Furl. Forſt. Thom. *Furley* FORSTER, mercator Londinenſis: *Flora Tunbrigenſis.* Lond. 1816. 8. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 5.

Fouger. Aug. Dionyſ. FOUGEROUX de Bondaroy, acad. Pariſ. ſodalis: Obſ. in act. acad. Pariſ. 1785. 1786.

Fraſ. Jo. FRASER: *Thalia dealbata*, tabula ſingularis, del. Sowerby. 1794. fol. *Catalogus plantarum in America boreali incentarum.* 1813. 8.

Fr. Fries. El. FRIES, adjunctus in univerſ. Lundinenſi: *Novitiae florae ſuecicae.* P. 1—8. 1814 f. *Obſervationes mycologicae.* Havn. vol. 1. 2. 1815. 1818. 8. *Flora hallandica.* Lund. 1818. 1819. 8. *Syſtema mycologicum.* vol. 1. 2. Lund. 1821. 1823. 8. *Plantae homonemeae.* Lund. 1825. 8. Obſ. in act. acad. holm. et in Kunze's mykol. Heften. Siccatorum lichenum et ſcleromycetum collectiones distribuit.

Frölich. Jo. Aloyſ. FRÖLICH, medicus Ellwangenſis Würtenberg.: *De Gentiana libellus.* Erl. 1796. Obſ. in Ulteri Ann. 1.

Fuchs. Leon. FUCHS, prof. Tubingenſis (nat. 1501 † 1565): *Hiſtoria ſtirpium.* Baſil. 1542. fol.

Funck. Henr. Chriſt. FUNCK, pharmacopola Gefrees in Franconia. Plantas cryptogamicas, praeſertim muſcos, ſedulo collegit: ſiccatas divulgavit: *Kryptogamiſche Gewächſe des Fichtelgebirges*, faſc. 1—31. 1801 f. 4. *Deutſchlands Mooſe*, ein Taſchen-Herbarium. Bayreuth 1820. 8.

Gärtn. Joſ. GÄRTNER, medicus Calwenſis Würtenb. (nat. 1732 † 1791): *De fructibus et ſeminibus plantarum.* vol. 1. 2. Stuttg. 1788. 1791. 4. *Supplementum*, ed. fil. Car. Frid. Lipſ. 1805. 4.

Garcin. Laurent. GARCIN, Indiam orientalem et Perſiam peragravit. Obſ. in Philoſ. transact. 36. 38. 45. 46. Herbario ejus uſus eſt N. L. Burmann in edenda flora indica, appoſita Garcini nomenclatura.

Garid. Joſ. GARIDEL, prof. Aquis ſextiis (nat. 1659 † 1737): *Hiſtoire des plantes, qui naiſſent autour d'Aix.* 1715. fol.

Gaudich. . . GAUDICHAUD, comes navarchi Freycinet in itinere περιοδεύτῳ (1817—1820). Inſulas oceani pacifici, Moluccas ulteriores, Maſcarenas et Falklandii, ubi naufragium paſſi ſunt, ſedulo perquiſivit. Floram inſularum Falklandii Mirbelius edidit in Ann. des ſcienc. nat. 5. Meſſem largam plantarum cum Candolleo et Schwägrichenio communicavit.

Gaudin. Jo. GAUDIN, pracco ſacer Neviduni: *Agroſtologia helvetica.* vol. 1. 2. Paris 1811. 8.

Gay. Jo. GAY, marchioni Sémonville ab epiſtolis, Pariſ. Obſ. in Mém. du muſ. *Monographie des Laſiopétalées.* Paris 1821. 4. *Fragment d'une monographie des Buttneriacées.* Paris 1823. 4. Ex itinere per Pyrenaeos montes ſegetem plantarum reportavit, cujus et me participem facit.

Geiſel. Eduard. Ferdin. GEISELER, medicus Gedanenſis: *Crotonis monographia.* Hal. 1807. 8.

Gerard. Ludov. GERARD, M. D.: *Flora gallo-provincialis.* Paris 1761. 8.

Gieſek. Car. Ludov. (Metzler-) GIESEKE, prof. Dublinenſis, in Grönlandia 1806—1813 degit: multas plantas et Hornemanno et aliis impertiit.

— Paul. Dieter. GIESEKE, prof. Hamburgenſis. Cum aliis iconum faſc. 1. absque titulo edidit, Hamb. 1777. fol.

Gilib. Jo. Eman. GILIBERT, ad tempus prof. Vilnenſis: *Flora lithuanica inchoata.* P. 1. 2. Grodno. 1781. 1782. 8. *Chloris grodnenſis*, in Ufteri delect. opuſc. 2.

Ging. .. DE GINGINS, in Candollei prodromo plura elaboravit genera. Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

Gled. Jo. Theoph. GLEDITSCH, prof. Berolinenſis (nat. 1714 † 1786): *Methodus fungorum.* Berl. 1753. 8. Obſ. in act. acad. berol. 1766.

Glox. Benj. Petr. GLOXIN: *Obſervationes botanicae.* Argent. 1785. 4.

Gmel. Jo. Georg. GMELIN, acad. Petropolit. ſodalis (nat. 1709 † 1755). Omnis Sibiriae, in qua decennium degerat, floram eximie aperuit. *Flora ſibirica.* tom. 1—4. Petrop. 1747—1769. 4.

C. C. Gmel. Carol. Chriſt. GMELIN, prof. Carolsruh.: *Flora badenſis alſatica.* vol. 1—4. Carolsruh. 1805—1826. 8.

J. F. Gmel. Jo. Frider. GMELIN, prof. Gottingenſis (nat. 1748 † 1804): *Syſtema vegetabilium.* vol. 1. 2. Gott. 1791. 8.

S. G. Gmel. Sam. Gottl. GMELIN, acad. Petropolit. ſodalis, oras maris caſpici peragravit (nat. 1743 † 1774): *Hiſtoria fucorum.* Petrop. 1768. 4. *Tagebuch der Reiſe durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen Reichs.* Th. 1—3. Altenb. 1774—1783. 4. Obſ. in nov. comment. acad. petropol. 12. 14.

Gochn. Frider. Car. GOCHNAT: *Tentamen de plantis cichoraceis.* Argent. 1808. 4.

Goldb. Car. Lud. GOLDBACH, prof. Mosquenſis (nat. 1793 † 1824): *Diſſ. Croci hiſtoriam ſiſtens.* Mosqu. 1816. 8. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſc.

Gold. .. GOLDIE, Canadam inviſit. Obſ. in Edinb. philoſ. journ.

Gomez. Bern. Ant. GOMEZ: Obſ. in act. acad. Olyſipon. 3.

Gooden. Sam. GOODENOUGH, epiſcopus Carleoli. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 2. 3.

Gouan. Ant. GOUAN, prof. Monspelienſis: *Hortus monspelienſis.* Lugd. 1762. 8. *Flora monspelienſis.* Lugd. 1765. 8. *Illuſtrationes et obſervationes botanicae.* Turic. 1773. fol.

GRAHAM. Navarchus cum conjuge literata Chili adiit, mortui ibi vidua largam reportavit meſſem.

— Prof. Edinburgenſis: Obſ. in Edinb. philoſ. journ.

Gratel. J. P. A. G. GRATELOUP: *Obſerv. ſur la conſtitution de* 1806, *avec un appendix ſur les Conferves.* Montpell. 1806. 4. Obſ. in Journ. de médec. 4.

Grev. Rob. Kaye GREVILLE: *Scotiſh cryptogamic flora.* vol. 1—4. Edinb. 1822 f. 8. *Flora Edinenſis.* 1824. 8. Obſ. in Transact.

ſoc. Linn., in Mem. of Werner. ſoc. et in Edinb. philoſ. journ.

Gronov. Jo. Frid. GRONOVIUS, ſenator Leidenſis (nat. 1690 † 1762): *Flora virginica* (e Claytoni collectionibus). vol. 1. 2. LB. 1743. 8.

Güldenſt. J. Ant. GÜLDENSTÄDT, acad. Petropolit. ſodalis (nat. 1745 † 1781): *Reiſen durch Rußland und im caucaſiſchen Gebirge.* Th. 1. 2. Petersb. 1787—1791. 4.

Günth. Chriſt. GÜNTHER, pharmacopola Wratislavienſis, acutus plantarum Sileſiacarum ſcrutator. Cum Schummelio edidit: *Herbarium vivum plantas Sileſiacas exhibens*, cent. 1—9. Wratisl. 1809. *Enumeratio ſtirpium phanerogamarum, quae in Sileſia ſponte proveniunt.* Wratisl. 1824. 8. Bergeri plantas italicas ſortitus eſt. Multas ab eo rariores plantas accepi.

Guerſ. L. B. GUERSENT: Obſ. in Bullet. de la ſoc. philomath.

Gunn. J. Ern. GUNNER, epiſcopus Nidroſiae in Norvegia (nat. 1718 † 1773): *Flora norvegica.* P. 1. 2. Nidroſ. et Havn. 1776. 1772. fol. Obſ. in Norſke Videnſk. Selſk. Skrift. 4.

Guſſon. Jo. GUSSONE, praefectus horti botanici, quem Dux olim Calabriae, jam Rex Siciliae utriusque, prope Panormum ſtabiliverat. *Catalogus plantarum, quae in horto regio aſſervantur.* Neapol. 1821. 8. Ingentem plantarum numerum ipſius liberalitati debeo.

Habliz. Car. Lud. HABLIZL, agriculturae in Tauria curator: *Deſcription phyſique de la Tauride.* Haye. 1788. 8.

Hacqu. Balth. HACQUET, prof. Leopolitanus (nat. 1740 † 1814): *Plantae alpinae carniolicae.* Vindob. 1782. 4.

Hänk. Thadd. HÄNKE, Bohemus, magnus peregrinator, Americam auſtralem, Malaſpina duce, Californiam, Mexico, inſulas Philippinas et Marianas perſcrutatus eſt, noviſſime in terra Guaranitica degit (nat. 1760 † 1817). Ingentes theſauros plantarum incognitarum, et quas Neaeus legerat, congeſſit, jam in muſeo bohemico ſervatas. *Reliquiae Hänkeanae.* vol. 1. Prag. 1825. fol. Obſ. in Jacquini collect. 2. et in Abh. der böhmiſchen Geſellſch. 1786.

Hagen. Car. Gothofr. HAGEN, prof. Regiomontanus: *Tentamen hiſtoriae lichenum.* Regiom. 1782. 4. *Preuſsens Pflanzen.* Th. 1. 2. Königsb. 1818. 8.

Hall. Gul. HALL: Obſ. in Transact. ſoc. Edinb. 3.

— Alb. AB HALLER, prof. Gottingenſis, dein praefectus pagi Bern. (nat. 1708 † 1777): *Hiſtoria ſtirpium Helvetiae indigenarum*, tom. 1—3. Bern. 1768. fol. *Opuſcula botanica.* Gott. 1749. 8. Obſ. in comment. Gotting. et in commerc. liter. Noric.

Hall. fil. Alb. AB HALLER, prioris filius, ſenator Bern. (nat. 1758 † 1823): Obſ. in Römeri Archiv. 1.

Hamilt. Franc. HAMILTON, olim *Buchanan*, med. Dr. et ad tempus praefectus horti Calcuttenſis, omnem Indiam orientalem cum Nepala perſcrutatus eſt. Obſ. in Aſiatic reſearches et Transact. of Linn. ſoc. Multas plantas largitus eſt Smithio, Donio, Hookero etc.

Hartm. C. J. HARTMANN: *Handbok uti Scandinaviens flora.* Stockh. 1820. 8.

Haw. Adrian. Hardy HAWORTH: *Obſervations on the genus Mesembrianthemum.* Lond. 1794. 8. *Miſcellanea naturalia.* Lond. 1803. 8. *Synopſis plantarum ſucculentarum.* Lond. 1812. 8. *Supplementum.* Lond. 1819. 8.

Hayn. Frid. Gottl. HAYNE, prof. Berolinenſis: *Getreue Abbildungen und Zergliederungen deutſcher Gewächſe.* Berl. 1798 f. 4. *Getreue Darſtellung und Beſchreibung der in der Arzneyk. gebräuchlichen Gewächſe.* B. 1—10. Berl. 1805—1826. 4.

Hedw. Jo. HEDWIG, prof. Lipſienſis (nat. 1730 † 1799): *Fundamentum hiſtoriae naturalis muſcorum frondoſorum.* P. 1. 2. Lipſ. 1782. 4. *Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum.* Lipſ. 1798. 4. *Deſcriptio et adumbratio muſcorum frondoſorum.* vol. 1—4. Lipſ. 1787—1797. fol. *Species muſcorum frondoſorum*, ed. Schwägrichen. Lipſ. 1801. 4.

H. Hedw. Romanus HEDWIG, prioris filius (nat. 1772 † 1806): Obſ. in Weber's et Mohr's Archiv. 1.

Heiſt. Laur. HEISTER, prof. Helmſtadienſis (nat. 1683 † 1758): *Deſcriptio Brunſvigiae.* Brunſv. 1753. fol.

Hellen. Car. Nicol. HELLENIUS, prof. Aboënſis: *Diſſ. de Hippuride.* Abo. 1786. 4. recuſ. in Ufteri Delect. opuſc. Obſ. in act. acad. holm. 1788.

Henck. Leo Comes HENCKEL a Donnersmark, a conſil. regim. Merſeburgi: *Adumbrationes plantarum in horto halenſi.* Hal. 1805. 4. *Enumeratio plantarum circa Regiomontum creſcentium.* Regiom. 1817. 8.

Herb. Gul. HERBERT, clericus in Spofforth Angliae († 1825): *Appendix to the botanical magazin.* 1821. 8. Obſ. in eodem promtuario.

Herbich. Fr. HERBICH, medicus militaris auſtriacus: Obſ. in Regensb. bot. Zeitung 1823. 1824.

Hergt. Frider. HERGT, medicus Pölsnek in Saxonia Coburg. in Hoppe's Taſchenb. 1807.

Herit. Car. Lud. L'HÉRITIER de Brutelle (nat. 1746 † 1800): *Virgilia* f. l. et a. *Stirpes novae aut minus cognitae*, faſc. 1—6. Paris 1784. 1785. fol. *Geraniologia* 1787. 1788. fol. *Sertum anglicum* 1788. fol. *Cornus* 1788. fol.

Herm. Paul. HERMANN, din in Ceilona vixit, dein prof. Leidenſis (nat. 1640 † 1695): *Catalogus horti lugduno-batavi.* LB. 1687. 8. *Paradiſus batavus.* LB. 1705. 4. *Muſeum ceilanicum.* 1726. 8.

Heyn. Benj. HEYNE, din in India orientali vixit († 1819): Obſervationes ejus plerasque divulgarunt Roxburghius, Careyus et Rothius (nov. ſpec.).

Hilar. Aug. S. HILAIRE, acad. Pariſ. ſocius, Braſiliam et terram Guaraniticam perſcrutatus eſt: *Plantes uſuelles des Braſiliens*, faſc. 1—6. Paris 1824. 1825. 4. *Flora Braſiliae meridionalis*, faſc. 1—4. Paris 1824—1826. 4. Obſ. in Mém. du muſ. et in Ann. des ſcienc. nat.

Hill. Jo. HILL, medicus Londinenſis († 1775): *The vegetable ſyſtem*, vol. 1—26. Lond. 1759-1775. fol.

Hilſenb. Car. Theod. HILSENBERG, Erfurtenſis, pro Siebero plantas in Maſcarenis legit, obiit in Madagaſcaria 1824.

Hökert. .. HÖKERT: Diſſ. de Ammi. Abo. 1810. 4.

Hoffm. Georg. Franc. HOFFMANN, prof. Gottingenſis, dein Mosquenſis (nat. 1760 † 1826): *Enumeratio lichenum*, faſc. 1. Erl. 1784. 4. *Hiſtoria ſalicum iconibus illuſtrata.* vol. 1. 2. Lipſ. 1785. 1791. fol. *Vegetabilia cryptogama*, faſ. 1. 2. 1787. 1790. 4. *Plantae lichenoſae*, vol. 1—3. Lipſ. 1789—1801. fol. *Deutſchlands Flora* (Cryptogamie). Erl. 1795. 12. *Deutſchlands Flora*, ed. 2. vol. 1. 2. Erl. 1800. 1804. 12. *Genera Umbelliferarum.*

Mosqu. 1816. 8. Obſ. in comment. Gotting., in mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſcou etc.

Hofman-Bang. N. HOFMAN-BANG, dominus praediorum in Selandia: *De uſu confervarum.* Havn. 1818. 8. Hornemanno et Lyngbyo plantas a ſe inventas largitus eſt.

Hofmannsegg. Jo. Centur. Comes AB HOFMANNSEGG, Dresdenſis, vitam et facultates rei herbariae augendae rara magnanimitate dicavit, diu (1797—1801) in Luſitania degit, Sieberum in Braſiliam miſit, munificentia regia ſplendidiſſimum opus: *Florae portugaiſe*, tab. 1—85. 1809—1814. fol. inſtruxit atque ornavit. Ingentem copiam plantarum ab ipſo Willdenovius habuit.

Holl. Frid. HOLL, pharmacopola, induſtrius plantarum collector.

Holmſk. Theod. eques HOLMSKIOLD, dominus praediorum in Selandia (nat. 1732 † 1794): *Beata ruris otia, fungis danicis impenſa.* Havn. 1790. fol.

Hook. Gul. Jackſon HOOKER, prof. Glasgoenſis: *Jungermanniarum icones*, faſc. 1—20. Lond. 1813. fol. Floram londinenſem Curtiſii ab anno 1816 inde denuo edidit. *Muſcologia britannica.* Lond. 1818. 8. *Muſci exotici*, vol. 1. 2. Lond. 1818. 1820. 8. *Flora ſcotica.* Edinb. 1821. 8. *Exotic flora*, vol. 1—3. Edinb. 1823—1826. 8. Obſ. in Edinb. philoſ. journ.

Hopk. Thom. HOPKIRK: *Flora Glottiana.* Glasg. 1813. 8.

Hopp. Dav. Henr. HOPPE, Ratisbonenſis, egregius plantarum collector: *Botaniſches Taſchenbuch* 1790—1807. Regensb. 8. Obſ. in Regensb. botan. Zeitung, in Denkw. der bot. Geſellſch. zu Regensburg, in Sturm's Flora.

Hornem. Janus Wilken HORNEMANN, prof. Havnienſis. Florae danicae vol. 8—10. illuſtravit. *Hortus regius botanicus Havnienſis.* vol. 1. 2. Havn. 1813. 1815. 8. *Förſög til en oeconomiſk Plantelaere.* Kiobenh. 1821. 8. Obſ. in Tidſkrift for Naturvidenſk.

Hornſch. Frid. HORNSCHUCH, prof. Gryphiae: *Diſſ. de Voitia et Syſtylio.* Erl. 1818. 4. *Bryologia germanica* (ſocio Nees). vol. 1. Norimb. 1823. 8. Obſ. in Horis phyſ. berol., in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeitung.

Hoſt. Nic. Thom. HOST, archiater palatinus Auſtr.: *Synopſis plantarum in Auſtria ſponte creſcentium.* Vindob. 1797. 8. *Icones et deſcriptiones graminum auſtriacorum.* vol. 1—4. Vienn. 1801—1814. fol.

Houſt. Gul. HOUSTOUN, diu in nova Hiſpania vixit († 1733): *Reliquiae Houſtounianae*, ed. Banks. Lond. 1781. 4.

Houtt. Mart. HOUTTUYN, medicus Amſtelodamenſis: *Linné's vollſtändiges Pflanzenſyſtem.* Th. 1—14. Nürnb. 1777—1788. 8. Obſ. in Verhand. van het Maatſch. te Harlem, 21. en van het Genootſch. te Vliſſingen, 10.

Hudſ. Gul. HUDSON, pharmacopola Londinenſis († 1793): *Flora anglica*, ed. 2. Lond. 1778. 8.

Humb. Alex. AB HUMBOLDT, perilluſtris doctiſſimusque peregrinator, acutiſſimus naturae interpres: *Florae fribergenſis ſpecimen.* Berol 1793. 4. Cum ſocio Amat Bonpland: *Plantes équinoxiales*, vol. 1. 2. Paris 1808—1816. fol. *Melaſtomées* 1809—1816. Adjutore Kunthio: *Nova genera plantarum*, vol. 1—7. Paris 1815—1825. fol. *Mimoſes et autres plantes légumineuſes.* Paris 1819. fol.

Hunter. Gul. HUNTER, medicus in Ind. orient.: Obſ. in Aſiatic reſearch. 9. et in Transact. ſoc. Linn.

Jack. Gul. JACK, diu in India oriental. vixit: Obſ. in Transact. ſoc. Linn , in Malayan miſcell. et in Roxb. fl. ind. 2.

Jackſ. Georg. JACKSON: Obſ. in Transact. ſoc. Linn. et in Andrews botan. repoſit.

Jacqu. Nic. Joſ. A JACQUIN, prof. Vindobonenſis (nat. 1727 † 1820): *Enumeratio ſtirpium in agro Vindobonenſi.* Vienn. 1762. 8. *Selectarum ſtirpium americanarum hiſtoria.* Vienn. 1763. fol. *Obſervationes botanicae.* P. 1—4. Vienn. 1764—1771. fol. *Hortus botanicus vindobonenſis.* P. 1—3. Vienn. 1770—1776. fol. *Flora auſtriaca*, tom. 1—5. Vienn. 1773—1778. fol. *Miſcellanea auſtriaca*, vol. 1. 2. Vienn. 1778. 1781. 4. *Icones plantarum rariorum*, vol. 1—3. Vienn. 1781—1793. fol. *Collectanea ad botanicam, chemiam et hiſtoriam naturalem ſpectantia*, vol. 1—5. Vienn. 1786—1796. 4. *Oxalis.* Vienn. 1792. 4. *Hortus ſchönbrunnenſis*, vol. 1—4. Vienn. 1797—1804. fol. *Fragmenta botanica*, Vienn. 1800—1809. fol. *Stapeliae cultae.* Vienn. 1806—1815. fol.

Jacqu. f. Joſ. Franc. A JACQUIN, prioris filius, prof. Vindobonenſis: *Eclogae botanicae*, vol. 1. Vienn. 1816. fol.

Jan. Georg. JAN, prof. Parmenſis. Flora Italiae ſuperioris cent. 1—10. Sunt plantae ſiccatae. (1818.) Herbarium portatile. 1820. 8.

Jaum. in Duhamel ed. nov.

Jon. Gul. JONES, judex ſummus in Bengalia († 1794): Obſ. in Aſiatic reſearch. 2.

Iſert. Paul. Erdm. ISERT: *Reiſe nach Guinea.* Kopenh. 1790. 8. Plantarum guineenſium copiam et Vahlio et Willdenovio largitus eſt.

Jürg. G. H. B. JÜRGENS, actor cauſſarum Jeveranus. Algarum ſiccatarum copiam faſciculis pluribus divulgavit, multas alias mihi donavit.

Juſſ. Ant. Laurent. A JUSSIEU, prof. Pariſienſis: *Genera plantarum, ſecundum ordines naturales diſpoſita.* Paris 1789. 8. Obſ. in Annal. et Mém. du muſ.

Adr. Juſſ. Adrianus A JUSSIEU, prioris filius: *De Euphorbiacearum generibus tentamen.* Paris 1824. 4. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſtoire nat. de Paris, 2. et in Ann. des ſcienc. nat. 2.

J. Juſſ. Joſephus A JUSSIEU, Antonii Laurentii patruus, Condaminium comitatus eſt per Americam auſtralem, dein ſolus remanſit, aerumnis tandem et livore Hiſpanorum atrociaque confectus ſuccubuit. († 1747.) Heres nepos reliquiarum patrui.

Ives. Eli IVES, prof. in collegio Yaleano novae Caeſareae: Obſ. in Silliman's amer. journ.

Kämpf. Engelb. KÄMPFER, medicus, diu in Perſia, India orientali, Java et Japonia vixit, demum archiater comitis Lippii (nat. 1651 † 1716): *Amoenitates exoticae.* Lemgov. 1712. 4. Icones plantarum japonicarum edidit Joſ. Banks. Lond. 1791. fol.

Kaulf. Georg. Frider. KAULFUSS, prof. Halenſis: *Enumeratio filicum.* Lipſ. 1824. 8. *Erfahrungen über das Keimen der Charen.* Leipz. 1825. 8. In Sturmii flora muſcorum frondoſorum faſc. 15 et 16. claboravit et ornavit. Obſ. in Regensb. bot. Zeitung.

Ker. Jo. *Bellenden-Gawler*, dein KER: Opera periodica, Botanical magazine et botanical regiſter ad tempus inſtruxit et illuſtravit. Obſ. in Annals of botany et Journ. of ſcience and the arts.

Kin. ..KIN in Philadelphia, plantas a ſe collectas Elliottio donavit.

Kit. Paul. KITAIBEL, prof. Peſtinenſis (†1818): *Deſcriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae*, vol. 1—3. Vindob. 1803—1812. fol. Plurimas plantas ipſi debeo.

Klein. ..KLEIN, medicus miſſionis evangelicae in Tranquebar, Willdenovii amicus, cum quo ingentem plantarum numerum communicavit.

Knight. v. *Salisbury.*

Koch. Joſ. KOCH, prof. Erlangenſis: Obſ. in nov. act. nat. cur. et in Regensb. bot. Zeit. Cum Mertenſio floram germanicam edidit.

Köl. Georg. Lud. KÖLER, prof. Moguntinus: *Deſcriptio graminum in Germania et Gallia ſponte naſcentium.* Prof. 1812. 8.

Köll. Jo. Lud. Chriſt. KÖLLE: *Spicilegium obſervationum de Aconito.* Erl. 1788. 8.

König. Jo. Gerard. KÖNIG, medicus miſſionis evangelicae in Tranquebar (nat. 1728 †1785). In Retzii obſervationibus, im Naturforſcher (20, 23.) et in Phyſiogr. Sällſk. handl. 1. ipſius animadverſiones et commentarii exſtant. Schrebero inprimis et Retzio plantas largitus erat.

— Car. *König* cum Jo. Sims edidit Annals of botany, vol. 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8., in quibus plures ejus obſervationes.

Krapf. Car. A KRAPF: *Beſchreibung der um Wien wachſenden eſsbaren Schwämme.* 1. 2. Wien 1782. 4.

Kunth. Car. Sigism. KUNTH, Humboldtii adjutor: *Synopſis plantarum aequinoctialium orbis novi.* vol. 1—4. Paris 1822—1825. 8. Obſ. in Mém. du muſ. et in Ann. des ſcienc. nat. Vid. et Humb.

Kunz. Guſtav. KUNZE, prof. Lipſienſis: *Mykologiſche Hefte*, 1. 2. Leipz. 1817. 1823. 8. Obſ. in Regensb. bot. Zeitung. Plantarum cryptogamicarum inſignem copiam ipſi debeo.

Labill. Jac. Jul. LABILLARDIÈRE, acad. Pariſienſis ſocius, Syriam primum 1787 inviſit, dein cum navarcho Entrecaſteaux, ad inveſtiganda Lapeyrouſii veſtigia, in oceanum pacificum miſſus, novae Hollandiae, Terrae Diemen et novae Caledoniae floram egregie aperuit. *Icones plantarum Syriae rariorum.* dec. 1—5. Paris 1791—1812. 4. *Novae Hollandiae plantarum ſpecimen.* vol. 1. 2. Paris 1804—1806. fol. *Sertum auſtro-caledonicum.* vol. 1. 2. Paris 1824. 1825. fol. Multas ipſi debeo plantas rariſſimas.

Laeſtad. L. L. LAESTADIUS, jam praeco ſacer in Suecia, Lapponiam 1821 peragravit: Obſ. in act. acad. holm. 1822.

Lag. Marian. LAGASCA, prof. Matritenſis, jam exul Londini: *Amenidades naturales de las Eſpañas.* Orihuela. 1811. 4. *Elenchus plantarum, quae in horto bot. matritenſi colebantur.* Matrit. 1816. 4. Obſ. in Herrer. agricultur. ed. nova. Multas et mihi et aliis plantas largitus eſt.

Lam. Jo. Bapt. Monet DE LAMARCK, acad. Pariſ. ſodalis: *Flore françaiſe*, vol. 1—3. Paris 1778. 8. *Encyclopédie méthodique. Botanique.* vol. 1—4. Paris 1783—1796. 4. *Journal d'hi-*

ſtoire naturelle. vol. 1. 2. Paris 1792. *Illuſtrations des genres.* vol. 1—4. Paris 1791 f. 4. Herbarium ejus ditiſſimum ceſſit Röpero, prof. Baſilienſi.

Lamb. Aylmer Bourk. LAMBERT, poſſeſſor herbarii locupletiſſimi, in quo et Ruizii Pavoniique et Forſteri et Pallaſii aliorumque reliquiae ſervantur: *Deſcription of the genus Cinchona.* Lond. 1797. 4. *Deſcription of the genus Pinus.* Lond. 1803. fol. nov. ed. 1823 f. Obſ. in Transact. ſoc. Linn.

Lamx. Jo. Vincent. Felix LAMOUROUX, Agiuenſis, Cadomi vixit (nat. 1779 †1825): *Diſſ. ſur pluſieurs eſpèces de Fucus.* Agen. 1805. 4. *Eſſai ſur les Thalaſſiophytes.* Paris 1813. 4. Ann. du muſ. 20. *Hiſtoire générale des Polypiers.* Paris 1816. 8.

Lang. Ad. Fr. LANG, pharmacopola Peſtinenſis, plantas hungaricas ſiccatas distribuit.

Langsd. Georg. A LANGSDORFF, Heidelbergenſis, jam orator ruthenicus in Braſilia, Kruſenſternii comes in itinere *περιϰοσμῳ*, redux per Aſiam borealem. Piſcherus filicum rariorum a Langsdorffio inventarum faſciculum 1809 edidit. Ipſe plantarum innumeram copiam et Piſchero et Martio aliisque largitus eſt.

Lapeyr. Philipp. *Picot*-LAPEYROUSE, metallorum ſylvarumque curator, prof. Toloſanus: *Flore des Pyrénées*, dec. 1—4. Paris 1795—1801. fol., cujus partem facit monographia Saxifragarum. *Hiſtoire abrégée des plantes des Pyrénées.* Toulouſ. 1813. 8. *Supplément à l'hiſtoire*, Toulouſ. 1818. 8.

Lapierre. .. LAPIERRE: Obſ. in Journ. de phyſ.

Laroch. Franc. LAROCHE: *Eryngiorum hiſtoria.* Paris 1808. fol. Idem textum vol. 5—7. Liliacearum Redoutei curavit.

Latourr. Max. Ant. LATOURRETTE, monetarius Lugduni (nat. 1729 †1793): Obſ. in Journ. de phyſ. tom. 20.

Laur. Fr. LAURER, profector Gryphiae: Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

Lauth. Thom. LAUTH: Diſſ. de Acere. Argent. 1781. 4.

Lawr. .. LAWRANCE, pictrix. *Collection of roſes from nature.* Lond. 1799 f. fol.

Laxarſ. J. LAXARSA, Mexicanus: Obſ. cum Candolleo communicata in Ann. des ſcienc. nat. 3.

Laxm. Eric. LAXMANN, praeco ſacer in Kolywan Sibir. (†1796): Obſ. in nov. comment. acad. Petrop. 15. 16. 18. et in Pallas neuen nord. Beytr. 3.

Lcandr. P. LEANDRO do Sacramento, praefectus horti botanici in Rio Janeiro: Nova plantarum genera in act. acad. monach. 7.

Lechen. v. *Leſchen.*

Ledeb. Car. Frid. LEDEBOUR, prof. Dorpatenſis, Imaum peragravit. Diſſ.: *plantarum domingenſium decadem ſiſtens.* Gryph. 1805. 4. Obſ. in act. acad. petropol. Plantas orientales multas mihi largitus eſt.

Lee et Kenned. .. LEE and KENNEDY, horticultores in Hammerſmith prope Londinum, plantas novas plurimas introduxerunt.

Leers. Jo. Dan. LEERS, pharmacopola Herborn. (nat. 1727 †1774): *Flora Herbornenſis.* 1775. 8.

Lehm. Jo. Chriſt. Georg. LEHMANN, prof. Hamburgenſis: *Monographia generis Primularum.* Lipſ. 1817. 4. *Generis Nicotianarum hiſtoria.* 1818. 4. *Plantae e familia Aſperifoliarum.* P. 1. 2. Berol. 1818. 4. *Monographia generis Potentillarum.* 1820. 4. *Icones plantarum rariorum*, faſc. 1—4. 1820 f. fol. Obſ. in Berl. mag. 8. Multas ipſi plantas debeo.

Lejeun. A. L. S. LEJEUNE, medicus Spadanus: *Flore des environs de Spa.* vol. 1. 2. Liège 1812. 1813. 8.

Lepech. Iwan LEPECHIN, acad. Petropolit. ſodalis: *Tagebuch der Reiſe durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen Reichs.* Th. 1–3. Altenb. 1774—1783. 4. Obſ. in nov. comment. acad. Petrop. 19. in act. ejusdem acad. 1781. 1783.

Lepellet. .. LEPELLETIER: Obſ. in Ann. du muſ. 8.

Leſchen. Lechen. .. LESCHENAULT *de la Tour*, Baudini navarchi in *περίπλῳ* comes, inſulas Moluccanas, Javam, Sumatram et Indiam orientalem perſcrutatus eſt: dein praefuit horto botanico Pondicherienſi. Obſ. in Mém. du muſ.

Lewis. Meriwether LEWIS, proconſul Louiſianae, cum duce bellico Dan. Clark 1804—1806 iter per Americam borealem ad flumen usque Columbiae ſuscepit. Plantas collectas Purſhio donavit.

Libert. Maria Anna LIBERT, virgo rei herbariae gnara, Malmudarienſis: Obſ. in annal. bruxellenſ. 6.

Liboſch. .. LIBOSCHÜTZ: Obſ. in mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſcou, 5.

Lichtenſt. Henr. LICHTENSTEIN, inſignis zoologus, prof. Berolinenſis, Africa auſtrali peragrata, egregiam plantarum copiam reportavit, quae Willdenovio celſerunt.

Lightf. Jo. LIGHTFOOT, clericus in Nottinghamia (nat. 1735 †1788): *Flora ſcotica.* vol. 1. 2. Lond. 1777. 8.

Liljebl. Sam. LILJEBLAD, prof. Upſalienſis (nat. 1761 †1815): *Utkaſt til en ſvenſk flora.* Upſal. 1798. 8. Obſ. in act. acad. holm. 1793.

Lindl. Jo. LINDLEY: *Roſarum monographia.* Lond. 1820. 8. *Collectanea botanica*, faſc. 1—3. Lond. 1823. fol. *Digitalis monographia.* Lond. 1821. fol. Opus periodicum: Botanical regiſter, copioſis ornavit illuſtrationibus. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. et Quarterly journ. of ſciences 18.

Link. Henr. Frider. LINK, prof. Berolinenſis, cum Comite Hofmannsegg Luſitaniam perluſtravit, textum operis ſplendidiſſimi: Flore portugaiſe, elaboravit. Cum Ottone praefecto edidit: *Abbildungen und Beſchreibungen ſeltener Pflanzen im Berl. Garten*, faſc. 1—9. Berl. 1821 f. *Enumeratio plantarum horti berolinenſis altera.* vol. 1. 2. Berol. 1821. 1822. 8. Jahrbücher der Gewächskunde, B. 1. Berl. 1820. 8. Obſ. in Horis phyſ. berol. et Berl. mag. 3. 7. Multas mihi plantas largitus eſt.

L. Carol. LINNAEUS, auctor hujus operis, ſtator rei herbariae nuperioris, prof. Upſalienſis. (Nat. 1707 †1778.) Hoc opus primum prodiit forma longe aliena, magnopere contracta, tanquam pars *Syſtematis naturae.* LB. 1735. fol. Sequentes editiones ſenſim uberiores fuerunt, ultima, quam Linnaeus curavit, eſt duodecima Holm. 1767. 8. Decimam tertiam diverſo modo elaborarunt tum Jo. Fr. Gmelin, tanquam partem Syſtematis naturae, tum Jo. Andr. Murray. Gott. 1774. Decimam quartam idem 1784. Decimam quintam C. H. Perſoon. Gott. 1797. 8.

— — *Species plantarum*, ed. 1. vol. 1. 2. Holm. 1753. 8. Ed. 2. vol. 1. 2. Holm. 1762. 1763. 8. *Mantiſſa plantarum.* 1. Holm. 1767. 8. 2. 1771. 8.

— — *Genera plantarum*, ed. 1. LB. 1737. 8., ed. 6. Holm. 1767. 8.

— — *Hortus Cliffortianus.* Amſtelod. 1737. fol.

C. *Linnaeus*: *Flora lapponica*. Amſtelod. 1737. 8. ed. 2. cur. J. E. Smith. Lond. 1792. 8.
— — *Flora ſuecica*, ed. 1. Holm. 1745. 8. ed. 2. 1755. 8.
— — *Oelandſka och Gothländſka reſa*. Stockh. 1745. 8. *Wäſtgöta reſa*. Stockh. 1747. 8. *Skånſka reſa*. Stockh. 1751. 8.
— — *Flora zeylanica*. Amſtel. 1748. 8.
— — *Hortus upſalienſis*. Holm. 1748. 8.
— — *Philoſophia botanica*. Vienn. 1755. 8. ed. 4. me curante, Hal. 1809. 8.
— — *Amoenitates academicae*, vol. 1—7. Holm. 1749—1769. 8., vol. 8—10. curante Schrebero. Erl. 1785—1790. 8.
— — Obſ. in act. acad. holm., in nov. act. Upſal., in nov. comment. Petropol., in act. acad. Pariſ.

L. fil. Car. LINNAEUS, filius, Prof. Upſal. (nat. 1741 †1783): *Horti Upſalienſis plantarum rariorum* dec. 1. et 2. Holm. 1762. 1763. fol. faſc. 1. Lipſ. 1767. fol. *Supplementum plantarum*. Brunſv. 1781. 8. Ehrhartus huic editioni curam adhibuit, appoſitis ſuis characteribus et nomenclatura. Sua facere filius ſtuduit, quae pater reliquerat. *Nova graminum genera*. Upſal. 1779. 4.

Lobel. Matth. LOBELIUS, Belga, botanicus regius britannicus (nat. 1538 †1616): *Stirpium nova adverſaria*. vol. 1. 2. Lond. 1570. 1605. fol. *Plantarum ſ. ſtirpium hiſtoria*. Antverp. 1576. fol. *Icones ſtirpium*. Antverp. 1591. 4. *Stirpium illuſtrationes*, ed. How. Lond. 1655. 4.

Loddig. Conr. LODDIGES, horticultor in Hackney prope Londinum: *Botanical cabinet*. vol. 1—7. Lond. 1817 f. 12.

Löfl. Petr. LÖFLING, Hiſpaniam et Americam auſtralem inviſit (nat. 1729 †1756): *Reſa til ſpanſka länderna*, ed. Linn. Stockh. 1758. 8. interpr. germ. Berl. 1766. 8.

Loiſ. J. L. A. LOISELEUR-*Deslongchamps*, Med. Doct.: *Flora gallica*. vol. 1. 2. Paris 1806. 1807. 8. Notices ſur les plantes à ajouter à la flore franç. in Journ. de bot. vol. 2.

Lottermoſ. Theoph. LOTTERMOSER, collega gymnaſii in Raſtenburg, Boruſſ. orient. Obſ. in Beyträgen zur Kunde Preuſsens, 6.

Lour. Jo. DE LOUREIRO, acad. luſitanicae ſocius, miſſioni catholicae in Cochinchina addictus: *Flora cochinchinenſis*, vol. 1. 2. Olyſipon. 1790. 4. ed. Willdenow. Berol. 1793. 8.

Lumnitz. Steph. LUMNITZER: *Flora poſonienſis*. Lipſ. 1791. 8.

Lyngb. Hans Chriſt. LYNGBYE, praeco facer prope Ripas Jutiae: *Tentamen hydrophytologiae danicae*. Havn. 1819. 4. Algas picrasque mihi largitus eſt.

Macbrid. Jac. MACBRIDE, medicus in Carolina, amicus Elliotti, cui magnam impertiit plantarum copiam.

Maratt. Jo. Franc. MARATTI: *Plantarum Romuleae et Saturniae ſpecificae notae*. Rom. 1772. 8.

Marcgr. Georg. MARCGRAV, pictor, inſerviit Comiti Mauritio Naſſavio, dum Braſiliam occuparet (nat. 1610 †1644): *Hiſtoria naturalis Braſiliae*, Piſonis et Marcgravii, ed. J. de Laet. Amſt. 1648. fol.

M. B. Frider. MARSCHALL A BIEBERSTEIN, a conſiliis ſtatus ruthen. (nat. 1766 †1826): *Beſchreibung der Länder am kaſpiſchen Meer*. Frkf. 1800. 8. *Flora taurico-caucaſica*, vol. 1-3. Char-

cov. 1803—1819. 8. *Centuria plantarum rariorum Roſſiae meridionalis.* Charcov. 1810. fol.

Marſh. Humph. MARSHALL: *Arbuſtum americanum, or the american grove.* Philadelph. 1785. 8.

Mart. Car. Phil Fr. MARTIUS, prof. Monachienſis, Braſiliae floram (1817—1820) recognovit et illuſtravit: *Flora cryptogamica Erlangenſis.* Norimb. 1817. 8. *Reiſe in Braſilien* (Spixio comite adjuvante). Münch. 1823. 4. *Genera et ſpecies palmarum, quas in itinere per Braſiliam collegit.* Monach. 1823. fol. *Nova genera et ſpecies plantarum braſilienſium*, vol. 1. 2. Monach. 1824—1826. fol. *Specimen materiae medicae braſilienſis.* Monach. 1824. fol. Obſ. in act. acad. Monach., in nov. act. nat. cur. 10—13., in commentar. ſoc. bot. Ratisbon. 2.

Martens. Georg. a MARTENS: *Reiſe nach Venedig.* B. 1. 2. Stuttg. 1824. 4.

Martyn. Jo. MARTYN, prof. Cantabrigienſis (nat. 1699 †1768): *Hiſtoria plantarum rariorum* cent. 1. Lond. 1728. fol.

Maſſ. Franc. MASSON, hortulanus doctus, diu in inſulis Canariis, Azoribus, maxime autem in Africa auſtrali degit (nat. 1741 obiit in Canada 1805): *Stapeliae novae.* Lond. 1796. fol.

Maton. Gul. Georg. MATON, M. D.: Obſerv. in Transact. ſoc. Linn.

Maur. Erneſt. MAURI: *Romanarum plantarum* cent. 1—13. Rom. 1817—1820. 8.

Mayer. Jo. MAYER, medicus Pragenſis: Obſ. in Abh. der böhmiſchen Geſellſchaft 1785—1787, im Naturforſcher, 17. et in Samml. phyſicaliſcher Aufſätze, 2.

Medic. Frider. Caſim. MEDICUS, praefectus horti Schwezingenſis (nat. 1736 †1809): *Botaniſche Beobachtungen.* Th. 1. 2. Mannh. 1783. 1784. 8. *Ueber einige künſtliche Geſchlechter aus der Malven-Familie.* Mannh. 1787. 8. Obſ. in Ufteri Annal.

Meerb. Nic. MEERBURG, cuſtos horti botanici Leidenſis: *Plantarum ſelectarum icones pictae.* LB. 1798. fol.

Meiſsn. Gul. MEISSNER, pharmacopola Halenſis, ſedulus plantarum cryptogamicarum ſcrutator, Jungermannias novas mecum communicavit.

Menz. Archibald. MENZIES, Vancoverii comes in itinere ad Americae borealis oras occidentales. Egregiae meſſis, quam fecit, participes fuerunt Smithius, Lambertus et alii. Obſ. in Transact. ſoc. Linn.

Mérat. X. V. MERAT: *Nouvelle flore des environs de Paris.* 1813. 8.

Mertens. Franc. Car. MERTENS, mercatorum ſcholae praefectus Bremae, algarum ſcientia clarus. Cum Kochio: J. C. Röhling's Deutſchlands Flora, ed. nov. Frkf. Th. 1. 2. 1823. 1826. 8. Obſ. in Mém. du muſ. 5.

Meyen. Franc. Jul. Ferd. MEYEN, M. D.: Obſ. in Schlechtendalii Linnaea.

Meyer. Ern. H. F. MEYER, prof. Regiomontanus: *Synopſis Juncorum rite cognitorum.* Gott. 1822. 8.

— Georg. Frid. Gul. MEYER, phyſiographus Hannoveranus: *Primitiae florae Eſſequeboënſis.* Gott. 1818. 4. *Die Entwickelung u. Fortpflanzung der Flechten.* Gott. 1825. 8. Lichenum ſcientia excellens, plures novas ſpecies mihi largitus eſt.

Mx. Andr. MICHAUX, Perſiani, Americam borealem, inſulas Maſcarenas et Madagaſcariam inviſit (nat. 1746 †1803): *Flora boreali-americana.* (ed. Cl. Richard.) tom. 1. 2. Paris 1803. 8. *Hiſtoire des chenes de l'Amérique.* Paris 1801. fol.

Mx.

Mx. Filius Andr. Franc. MICHAUX: *Hiſtoire des arbres foreſtiers de l'Amérique ſeptentrionale.* vol. 1—3. Paris 1810—13. 4.

Michel. Petr. Ant. MICHELI, praefectus horti Florentini (nat. 1679 †1737): *Nova plantarum genera.* Flor. 1729. fol.

Mik. Jo. Chriſt. MIKAN, prof. Pragenſis, Braſiliam inviſit: *Delectus florae et faunae braſilienſis.* faſc. 1—4. Prag. 1822 f. fol. Gramina braſilienſia Trinio dedit.

Mill. Phil. MILLER, praefectus horti Chelſeani (nat. 1691 †1771): *Gardeners dictionary*, ed. 1. Lond. 1731. fol. ed. 8. 1797. fol. *Figures of plants, deſcribed in the gardeners dictionary.* vol. 1. 2. Lond. 1760. fol.

Mirb. C. F. *Briſſeau*-MIRBEL, acad. Pariſ. ſocius: Obſ. in Mém. du muſ., Ann. des ſcienc. nat. et in Bulletin de la ſoc. philomath.

Mitch. Jo. MITCHELL, medicus in Virginia: Genera recens condita in Act. nat. cur. 8.

Mocin. ..MOCINO, botanicus Mexicanus († Barcinone 1819). Iconibus ab ipſo, Seſſeo et Cervanteſio curatis, nondum editis, uſus eſt Candolleus.

Möhr. Paul. Henr. MÖHRING, medicus Jeveranus (nat. 1710 †1792): Obſ. in act. nat. cur. 6. 7. 8. et in commerc. lit. Noric.

Mönch. Conr. MÖNCH, prof. Marburgenſis (nat. 1744 †1805): *Enumeratio plantarum indigenarum Haſſiae.* Gott. 1777. 8. *Methodus plantas horti botanici deſcribendi.* Marb. 1794. 8.

Mohr. Dan. Matth. Henr. MOHR, prof. Kilonienſis: *Obſervationes botanicae.* Kil. 1803. 8. Cum Fr. Webero: Naturhiſtoriſche Reiſe durch Schweden, Beyträge zur Naturkunde, Archiv für die ſyſtematiſche Naturgeſchichte, Dillwyn's Conferven, Deutſchlands kryptogamiſche Gewächſe.

Molin. Jo. Ignat. MOLINA, miſſioni catholicae in Chili addictus: *Saggio ſulla ſtoria naturale del Chili*, ed. altera. Bologn. 1810. 4.

Monnard. J. P. MONNARD, rector ſcholae Neodunenſis in Helvetia: Obſ. in Ann. des ſcienc. nat. 7.

Montin. Lars MONTIN, medicus Suecus (nat. 1723 †1785): Obſ. in act. acad. holm., in nov. act. ſoc. Upſal., in Phyſiogr. ſällſkap. et in Götheborgſka vetenſk. ſamhällets handl.

Moretti. Joſ. MORETTI, prof. Ticinenſis: *Memorie ed oſſervazioni intorno a diverſi oggetti riſguardanti le ſcienze naturali.* Pavia 1820. 8. Obſ. in Biblioteca italiana et in Brugnatelli giornale di fiſica.

Moricand. Steph. MORICAND: *Flora veneta.* Genev. 1820. 8.

Moris. . MORIS, Calaritanus, Sardoae florae ſedulus ſcrutator. Plantarum ab ipſo collectarum participem me fecit Balbiſius.

Moriſ. Robert. MORISON, primum horti Bleſenſis praefectus, dein prof. Oxonienſis (nat. 1620 †1683): *Hiſtoria plantarum univerſalis*, vol. 1—3. Oxon. 1715. fol.

Mougeot. v. Neſtler.

Mühlenb. Henr. MÜHLENBERG, praeco ſacer Lancaſtriae in Penſylvania († 1815): *Catalogus plantarum Americae ſeptentrionalis.* Lancaſt. 1813. 8. *Deſcriptio uberior graminum.* Philadelph. 1817. 8. Obſ. in neuen Schriften der Berl. Geſellſch. naturf. Freunde, 4. Et Willdenovio et mihi et Hedwigio ingentem plantarum numerum largitus eſt.

Müll. Ott. Frid. MÜLLER, prof. Havnienſis (nat. 1730 †1784): *Flora danicae* vol. 4 et 5. ejus cura prodierunt. *Flora Fridrichs-*

dalina. Argent. 1767. 8. *Kleine Schriften aus der Naturhiſtorie.* Deſſau 1782. 8. Obſ. in nov. act. petropolit. 3., in act. acad. holm., in nov. act. nat. cur., im Naturforſcher, et in Schriften der Berl. Geſellſch. naturf. Freunde, 4.

Murr. Jo. Andr. MURRAY, prof. Gottingenſis (nat. 1740 † 1791): *Linnaei ſyſtema vegetabilium* ed. 13. Gott. 1774. ed. 14. 1784. 8. Obſ. in nov. comment. Gott. 3—8. et in Commentat. ſoc. Gott. 1—9.

Muſſin. Apoll. Comes MUSSIN-PUSCHKIN († 1805), Caucaſi regionumque finitimarum peragrator, cum Willdenovio multas communicavit ſtirpes.

Mut. Joſ. Coeleſtin. MUTIS, in metropoli Columbiae, Bogota vitam degit (nat. 1734 † 1809). Plurimas plantas ad Linnaeum miſit, multas Humboldtio dedit. Floram bogotenſem, opus XLV annorum, ineditam reliquit, quam curaturi ſunt filius Symphor. Mutis et Joſ. de Caldas. Specimina inſeruerunt in opus periodicum: El ſemanario del nuevo reyno de Granada 1813. 4.

Neck. Natal. Joſ. A NECKER, botanicus electoris Palatinatus (nat. 1730 † 1793): *Elementa botanica.* Neowedi ad Rhen. 1790. 8.

Nectoux. H. NECTOUX, comes Napoleonis in expeditione aegyptiaca: *Voyage dans la haute Egypte.* Paris 1808. 8.

N. E. Neue Entdeckungen v. *Sprengel.*

Née. Ludov. NÉE, Malaſpinae in itinere περιπλῳ comes, immenſum plantarum numerum congeſſit, quo uſus eſt Cavanilles in iconibus et anal. de cienc. natur.

Nees. Car. Gothofr. NEES ab Eſenbeck, prof. Bonnenſis: *Das Syſtem der Pilze und Schwämme.* Nürnb. 1817. 4. *Synopſis Aſterum herbaceorum.* Erl. 1818. 4. *Horae phyſicae berolinenſes.* Bonn. 1820. fol. *De Cinnamomo commentatio.* Bonn. 1823. 4. Cum Hornſchuchio edidit Bryologiam germanicam, adjuvit Weiheum in Rubis germanicis edendis, Sieberi gramina e nova Hollandia nuncupavit. Obſ. in nov. act. nat. cur., in comment. ſoc. bot. Ratisbon., et in Regensb. bot. Zeitung.

— Theoph. Frid. NEES, prioris frater, prof. Bonnenſis, cum fratre Boltonii tom. 4. interpretatus eſt ac auxit. Obſ. in nov. act. nat. cur. et in Kunze's mykol. Heften.

Neſil. C. G. NESTLER, prof. Argentinenſis: *Monographia de Potentilla.* Paris 1816. 4. Cum Mougeoto ſtirpes cryptogamas Vogeſo-rhenanas ſiccatas, vol. 1—6. 1810—1820. edidit.

Neuwied. Maxim. Princeps Wied-NEUWIED (nat. 1782), Braſiliam peragravit. Plerasque ſtirpes a ſe inventas et Schradero et Neeſio dedit, quorum ille eas in annalibus literariis Gottingenſibus divulgavit, hic, adjuvante Martio, in novis actis nat. cur. deſcripſit ac delineavit.

Nitzſch. Chriſt. Ludov. NITZSCH, prof. Halenſis: *Beytrag zur Infuſorien-Kunde oder Naturbeſchreibung der Cercarien und Bacillarien.* Hall. 1817. 8.

Nocc. Dominic. NOCCA, prof. Ticinenſis: *Ticinenſis horti plantae ſelectae.* Ticin. 1800. fol. Cum Balbiſio edidit *floram ticinenſem*, vol. 1. 2. Ticin. 1816. 1821. 4. Obſ. in Uſteri Ann. 5.

Noiſ. Ludov. NOISETTE, horticultor prope Pariſios: plures novas ſtirpes introduxit.

Nor. Ferdin. DE NOROÑA, Hiſpanus, inſulas Philippinas, Javam, Madagaſcariam et Maſcarenas perſcrutatus eſt: obiit in inſ.

Franciae 1787. Obſ. in Verh. van het Batav. Genootſch. 5. Gazas ejus fortitus eſt Labillardière.

Nutt. Thom. NUTTALL, prof. Philadelph.: *The genera of North-American plants.* vol. 1. 2. Philadelph. 1818. 8. Obſ. in Journ. of the acad. of Philadelph. et in Silliman's americ. journ.

Oed. Georg. Chriſt. AB OEDER, praetor et praefecturae Oldenburg. redemtor (nat. 1728 †1791): *Florae danicae* volumina tria priora edidit.

Oliv. Gul. Anton. OLIVIER, medicus, Perſiam peragravit (nat. 1756 †1814): *Voyages dans l'empire Othoman, l'Égypte et la Perſe*, vol. 1—3. Paris 1801. 8.

Olivi. Joſ. OLIVI: *Zoologia adriatica.* Baſſano 1792. 4.

Ort. Caſim. Gomez DE ORTEGA, prof. Matritenſis: *Continuacion de la flora eſpañola*, tom. 5. 6. Madr. 1784. 4. *Novarum aut rariorum plantarum horti Matritenſis* dec. 1—8. Matrit. 1800 f. 4.

Osb. Petrus OSBEK, praepoſitus eccleſiarum in Suecia, Chinam inviſit (nat. 1723 †1805): *Dagbok öfver en oſtindiſk reſa.* Stockh. 1757. 8. Obſ. in act. acad. holm. 1762. 1765. 1769 f.

Ott. Frid. OTTO, praefectus horti botanici Berolinenſis, cum Linkio edidit icones et deſcriptiones plantarum. Obſ. in Verhandel. der Gartenbau-Geſellſchaft. Ingentem plantarum copiam ipſi debeo.

— J. G. OTTO, praeco facer Kaufungae in Saxonia: *Verſuch einer Anordnung der Agaricorum.* Leipz. 1816. 8.

Otth. .. OTTH, Candollei adjutor in elaborando prodromo.

Paiv. Imman. Joach. Henr. A PAIVA, medicus Olyſiponenſis: *Memorias de hiſtoria natural* etc. Lisbon. 1790. 4.

P. B. A. M. F. J. PALISOT DE BEAUVOIS, acad. Pariſ. ſocius, Guineam inviſit, diu in Hiſpaniola et America boreali degit (†1820): *Flore d'Oware et de Benin*, faſc. 1—6. Paris 1805—1810. fol. *Eſſai d'une nouvelle agroſtographie.* Paris 1812. 8. Muſcologie ou traité ſur les mouſſes in Mém. de la ſoc. Linnéenne de Paris, 1.

Pall. Petr. Sim. PALLAS, acad. Petropolit. ſocius, magnus peregrinator (nat. 1740 †1810): *Reiſen durch verſchiedene Provinzen des ruſſiſchen Reichs.* Th. 1—3. Petersb. 1771—1776. 4. *Flora roſſica*, vol. 1. 2. Petrop. 1784. 1788. fol. *Neue nordiſche Beyträge*, Th. 1—7. Petersb. 1781—1796. 8. *Species Aſtragalorum deſcriptae et iconibus illuſtratae.* Lipſ. 1800. fol. *Illuſtrationes plantarum minus cognitarum.* Lipſ. 1803. fol.

Panz. Georg. Wolfg. PANZER, medicus Herspruck in Franconia: *Obſervationum botanicarum ſpecimen.* Norimb. 1781. 8. *Ideen zu einer künftigen Reviſion der Gräſer.* München 1813. 4. In Sturmii flora plura capita elaboravit.

Parkinſ. Jo. PARKINSON, botanicus regius Britann.: *Paradiſi in ſole paradiſus terreſtris.* Lond. 1629. fol. *Theatrum botanicum.* 1640. fol.

Patrin. Eugen. Ludov. Melch. PATRIN, Imaum 1781 perſcrutatus eſt. Obſ. in Pallas nordiſchen Beytr. Plantae ab ipſo collectae tum Pallaſio tum muſeo Pariſienſi cellerunt.

Perpent. Helena PERPENTI, femina Comenſis: Obſ. in Biblioteca italiana 1817.

Perſ. Chriſt. Henr. PERSOON: *Obſervationes mycologicae*, vol. 1. 2. Lipſ. 1796. 1798. 8. *Commentatio de fungis clavaeformibus.*

Lipſ. 1797. 8. *Tentamen dispoſitionis fungorum.* Lipſ. 1797. 8. Linnaeani ſyſtematis editionem 15. jam diximus. *Icones et deſcriptiones fungorum minus cognitorum.* faſc. 1. 2. Lipſ. 1799. 1800. 4. *Synopſis methodica fungorum.* Gott. 1801. 8. *Icones pictae fungorum rariorum*, faſc. 1. 2. Paris 1803. 4. *Synopſis plantarum ſ. Enchiridion botanicum*, vol. 1. 2. Paris 1805. 1807. 12. *Abhandlung über die eſsbaren Schwämme*, überſetzt von Dierbach. Heidelb. 1822. 8. *Mycologia europaea*, vol. 1. 2. Erlang. 1822. 1824. 8. Obſ. in Ufteri Annal., in Journ. de botanique et in Wetterauer Annal.

Petagn. Vincent. PETAGNA: *Inſtitutiones botanicae*, vol. 1-5. Neapol. 1785—1787. 8.

Pill. et *Mitterp.* Matth. PILLER et Ludov. MITTERPACHER de Mitterburg, prof. Peſtinenſis (nat. 1734 †1814): *Iter per Poſeganam, Sclavoniae provinciam.* Budae. 1783. 4.

Pio. Jo. Bapt. PIO: *De Viola ſpecimen.* Taurin. 1813. 4.

Piſ. Gul. PISO, medicus heroïs Mauritii Comitis Naſſavii, Braſiliam invadentis: *De Indiae utriusque re naturali et medica.* Amſt. 1658. fol.

Plukn. Leon. PLUKNET, botanicus regius Britann.: *Almageſtum botanicum.* Lond. 1696. 4. *Mantiſſa* 1700. *Amaltheum* 1705. 4.

Plum. Car. PLUMIER, e Minimorum ordine, botanicus regius gallicus, Indiam occidentalem ſedulo et ſcienter perſcrutatus eſt (nat. 1666 †1704): *Nova plantarum genera.* Paris 1703. 4. *Traité des fougères de l'Amérique.* Paris 1705. fol. *Plantarum americanarum* faſc. 1—10., ed. Jo. Burmann. Amſt. 1755—1760. fol.

Pöppig. Eduard. PÖPPIG, Lipſienſis, Cubam adiit. Plantae ſiccatae venales.

Pohl. Jo. Imman. POHL: *Verſuch einer Flora Böhmens.* Th. 1. 2. Prag 1810. 1814. 8. *Des Freyherrn von Hochberg botaniſcher Garten zu Illuboſch.* Prag. 1812. 8. Obſ. in Hoppe's Taſchenb. 1807.

Poir. J. L. M. POIRET, Numidiam peragravit: *Voyage en Barbarie.* Paris 1789. Encyclopaediam botanicam a vol. 5. inde et ſupplementa digeſſit.

Poit. . . POITEAU, doctus plantarum cultor, diu in Hiſpaniola commoratus eſt. Plantas rariſſimas cum aliis communicavit. Obſ. in Annal. et Mém. du muſ.

Pollich. Jo. Ad. POLLICH, medicus Caeſareae Lutrae (†1780): *Hiſtoria plantarum in Palatinatu electorali ſponte creſcentium.* tom. 1—3. Mannh. 1776. 1777. 8.

Pollin. Cyrus POLLINI, prof. ad tempus Veronenſis: *Viaggio al lago di Garda.* Verona 1816. 8. *Sulle alghe viventi nelle terme Euganee.* Milano 1817. 8. *Flora veronenſis*, vol. 1—3. Veron. 1822—1824. 8. Multas mecum plantas communicavit.

Portenſchl. Franc. a PORTENSCHLAG-*Ledermeyer*, JCtus Viennenſis (nat. 1772 †1821), ſedulus plantarum collector: *Enumeratio plantarum in Dalmatia lectarum.* Vindob. 1824. 8. Amici poſuerunt hoc monumentum: plantae a Rochelio delineatae.

Pourr. . . POURRET, abbas et canonicus S. Jacobi in Gallaecia Hiſpaniae: *Chloris narbonenſis* inſerta actis academiae Toloſanae 3. Plantarum ingentem copiam Willdenovio largitus eſt.

Presl. Car. Boriwogo PRESL, cuſtos muſei bohemici Prag., Siciliam inviſit, cum fratre J. Swatopluco edidit *Floram cechicam.*

Prag. 1819. 8. Seorſim: *Cyperaceae et gramineae ſiculae.* Prag. 1820. 8. *Deliciae pragenſes.* Prag. 1822. 8. *Reliquiae Hänkeanae*, vol. 1. Prag. 1825. fol. *Flora ſicula.* Prag. 1826. 8.

Purſh. Frider. PURSH, qui ipſe ſe Sibiria natum dictitabat, regiones Americae borealis perveſtigavit († 1820): *Flora Americae ſeptentrionalis.* vol. 1. 2. Lond. 1814. 8.

Pyl. Bachelot DE LA PYLAIE: Obſ. in Journ. de bot. 4. 5.

Rad. Juſtus RADIUS, medicus Lipſienſis: *De Pyrola et Chimophila ſpecimen.* Lipſ. 1821. 4.

Radd. Joſeph. RADDI, Florentinus, Braſiliam obiit. Obſ. in Atti di Siena, 9., memorie di Modena 18. 19. et opuſcoli ſcientif. di Bologna. 3. 4. *Jungermanniographia etruſca.* Modena 1818. 4.

Raſin. Car. RAFINESQUE-*Schmalz*, diu in Sicilia commoratus eſt, jam prof. Lexington, Amer. bor.: *Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove ſpecie di animali e piante di Sicilia.* Palerm. 1810. 8. *Specchio delle ſcienze.* P. 1. Palerm. 1814. 8. *Florula Ludoviciana.* New-York. 1817. 8. (e C. C. Robin voyages 1807.) Obſ. in Annal. bruxell. et in Silliman's americ. Journ.

Ram. Ludov. Franc. RAMOND, olim prof. ad Aquas Convenarum (Bagnères), dein praefectus Arverniae, Pyrenaeos montes obiit: *Voyages au Mont-perdu.* Paris 1801. 8. Obſ. in Bullet. de la ſoc. philomath.

Rau. Ambroſ. RAU, prof. Wirceburgenſis: *Enumeratio Roſarum* circa Wirceburgum creſcentium. Norimb. 1816. 8.

Rebent. Jo. Frider. REBENTISCH, praefectus ſeminarii chirurgici Berolin.: *Prodromus florae neomarchicae.* Berol. 1804. 8. *Index plantarum circum Berolinum ſponte naſcentium.* Berol. 1805. 8.

Red. P. J. REDOUTÉ, eximius plantarum pictor Pariſ.: *Les Liliacées*, vol. 1-8. Paris 1802-1816. fol. *Les Roſes.* Paris 1817 f. fol. Splendidiſſimum utrumque opus.

Reich. Jo. Jac. REICHARD, medicus Francofurti ad Moenum (nat. 1748 † 1789): *Syſtema plantarum*, P. 1—4. Frcf. 1779. 1780. 8. *Flora moeno-francofurtana*, tom. 1. 2. Frcf. 1772. 1778. 8. Obſ. in Schrift. naturf. Freunde zu Berlin, 1.

Reichenb. Ludov. REICHENBACH, prof. Dresdenſis: *Monographia generis Aconiti et Delphinii.* Lipſ. 1820. fol. *Icones et deſcriptiones plantarum*, vol. 1. Lipſ. 1822. 4. *Iconographia botanica*, vol. 1—4. Lipſ. 1823—1826. 4. *Hortus botanicus*, cent. 1. Lipſ. 1824. 4. Faſciculos 42. 43. 45. florae Sturmianae elaboravit. Obſ. in Regensb. bot. Zeit. Multas plantas ipſi debeo.

Reinw. G. C. REINWARDT, prof. Leidenſis, diu in Java vixit: Obſ. in Verhand. van het bataav. Genootſch. 9. et in Blum. catal. Buitenzorg.

Relh. Rich. RELHAN, clericus: *Flora cantabrigienſis.* 1785. 8. *Supplem.* 1—3. 1786—1793. 8.

Requien. . . REQUIEN, Avenionenſis: Enumeratio plantarum in Valle-clauſa creſcentium, in Guérin deſcription de Vaucluſe. Avign. 1813. 12. Obſ. in Ann. des ſcienc. natur. 5. Multas cum Candolleo plantas communicavit.

Retz. And. Jo. RETZIUS, prof. Lundinenſis (nat. 1744 † 1821): *Faſciculus* 1—6. *obſervationum botanicarum.* Lipſ. 1779—1791. fol. *Florae Scandinaviae prodromus*, ed. 2. Lipſ. 1795. 8. Obſ. in act. acad. holm. et in Phyſiogr. ſällſkap. handl.

Reyn. L. REYNIER, medicus Lauſannenſis (†1824): Obſ. in Journ. de phyſ., Mém. de la ſoc. de Lauſanne, Mém. pour l'hiſt. nat. de la Suiſſe, in Höpfner's Mag. für die Naturk. Helvetiens.

Rheed. Henr. Adr. *van* RHEEDE *tot Drakenſteen*, proconſul Malabar.: *Hortus malabaricus*, P. 1—12. Amſtelod. 1678—1703. fol.

Rich. Ludov. Claud. RICHARD, acad. Pariſ. ſocius, diu in Guiana vixit, eximius plantarum ſcrutator. (nat. 1754 †1821.) Obſ. in Perſoonii enchiridio, in Journ. de phyſ., in Ann. et Mém. du muſ., in Melaſtomeis Humboldtianis. Innumeras plantas aliis largitus eſt.

— Achill. RICHARD, prioris filius, prof. Pariſ.: *Botanique médicale.* 1. 2. Paris 1823. 8. Obſ. in Ann. bruxell. 4. et in Ann. des ſcienc. nat.

Richardſ. Jo. RICHARDSON, Franklini comes in itinere ad polum arcticum. Floram earum regionum adumbravit in Franklin's voyage to the ſhores of the polar ſea. Lond. 1823. 4.

Riſſ. A. RISSO: *Hiſtoire naturelle des orangers.* (ſocio Poiteau) vol. 1. 2. Paris 1820. 4. Obſ. in Ann. du muſ. 20.

Riv. Aug. Quirin. RIVINUS, prof. Lipſienſis (nat. 1652 †1725): *Introductio generalis in rem herbariam.* 1690—1699. fol.

Robſ. Ed. ROBSON: Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 3.

Rochel. Ant. ROCHEL, cuſtos horti Peſtinenſis, dudum chirurgus in Rownye Hungar: plantarum carpathicarum induſtrius ſcrutator, quarum multas mihi miſit. *Pflanzen-Umriſſe aus dem ſüdlichen Karpath des Bannats.* 1820.

Rodrigu. Joſ. RODRIGUEZ apud Lagaſc. elench. hort. Matrit.

Röhl. Jo. Chriſt. RÖHLING, inſpector Maſſenheim: *Deutſchlands Flora.* Th. 1—3. Frkf. 1812—1814. 8.

Röm. Jo. Jac. RÖMER, prof. Turicenſis (†1819): *Archiv für die Botanik.* Th. 1—3. Lipſ. 1796—1803. 4. *Linnaei ſyſtema vegetabilium*, vol. 1—6. (Cl. I—V., ſocio Schulteſio.) Stuttg. 1817—1820. 8.

Rohde. Mich. ROHDE, Bremenſis, egregius collector et obſervator. Obſ. in Schrader's Journ. Multas mihi plantas miſit.

Roland. Dan. ROLANDER: Obſ. in act. acad. holm. 1756.

Roſc. Gul. ROSCOE, civis Liverpoolienſis, eruditiſſimus vir. Scitamineas primum in Transact. ſoc. Linn. 8. dein in opere ſplendido, quod etiamnum continuatur, egregie illuſtravit. Plantas ipſi debeo plures.

Roſtcov. Frid. Gul. Theoph. ROSTCOVIUS, medicus Stettinenſis: *Diſſ. de Junco.* Hal. 1801. 8. *Flora ſedinenſis.* Stettin. 1824. 8. Plerasque plantas ab ipſo inventas mihi largitus eſt.

Roth. Alb. Gul. ROTH, archiater popularis principatus Bremenſis: *Beyträge zur Botanik.* Th. 1. 2. Bremen 1782. 1783. 8. *Tentamen florae germanicae.* P. 1—3. Lipſ. 1788—1800. 8. *Catalecta botanica*, faſc. 1—3. Lipſ. 1797—1806. 8. *Neue Beyträge zur Botanik.* Frankf. 1802. 8. *Botaniſche Bemerkungen.* Leipz. 1807. 8. *Novae plantarum ſpecies, praeſertim Indiae orientalis.* Halberſtad. 1821. 8.

Rottb. Chriſt. Friis ROTTBÖLL, prof. Havnienſis (nat. 1727 †1797): *Deſcriptionum et iconum liber.* Havn. 1773. fol. *Deſcriptiones plantarum rariorum.* Havn. 1776. 4. Obſ. in Collect. ſoc. med. Havn. 2., in Kiobenh. Selſk. Skrift. 10., in Danſke Videnſk. Selſk. nye Skrift. 2.

Rottl. .. ROTTLER, miſſioni evangelicae in India orientali, Vepery, addictus. Obſ. in neuen Schriften der Berl. Geſellſch. naturf. Freunde, 4. Vahlio, Willdenovio et mihi multas miſit plantas.

Roxb. Gul. ROXBURGH, medicus Anglus in India orient.: *Plants of the coaſt of Coromandel.* vol. 1—3. Lond. 1795—1816. *Alphabetical liſt of the plants of S. Helena:* ad Beatſon's tracts relative to the island of S. Helena. Lond. 1816. 4. *Flora indica*, ed. Wallich et Carey. Calcutta. vol. 1. 2. 1821. 1824. 8. Obſ. in *Aſiatic reſearches*, vol. 11. Plantarum copiam et Willdenovio et mihi donavit.

Rudg. Ed. RUDGE: *Plantarum Guianae rariorum icones et deſcriptiones.* Lond. 1806. fol. Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 8. 10.

Rud. Jo. Fr. RUDOLPH, acad. Petropolit. ſocius (nat. 1744 † 1809). Obſ. in act. acad. Petropolit. Egregiam plantarum orientalium collectionem ab eo accepi.

Rudolph. Car. Asm. RUDOLPHI, prof. anatomiae Berolinenſis, olim rei herbariae ſcientia inſignis, multas mihi plantas rariores largitus eſt. Obſ. in Schrader's Journ.

R. et P. Hippol. RUIZ et Joſ. PAVON, Hiſpani, comite Dombeyo omnem regionum Americae auſtralis dudum Hiſpaniae ſubditarum ambitum obierunt. *Florae peruvianae et chilenſis prodromus.* Matr. 1794. fol. *Flora peruviana et chilenſis*, vol. 1—3. Matr. 1798 f. fol.

R. et Sch. v. Röm. et Schult.

Rumph. Georg. Everard. RUMPHIUS, mercator, proconſul batavus in inſula Amboina (nat. 1637 † 1706): *Herbarium amboinenſe*, ed. Burmann. vol. 1—7. Amſt. 1741—1751. fol.

Ruſſel. Alex. RUSSEL, medicus Halepenſis († 1768): *Naturgeſchichte von Aleppo*, überſ. B. 1. 2. Göttingen 1798. 8.

Sabin. Joſ. SABINE, ſocietati horticult. britannicae ab epiſtolis: Obſ. in Transact. ſoc. horticult. et in Botan. regiſter.

Sadler. Joſ. SADLER, Peſtinenſis: *Diſſ. ſiſtens deſcriptionem plantarum epiphylloſpermarum Hungariae.* Peſtin. 1820. 8.

Salisb. Rich. Ant. SALISBURY: *Icones ſtirpium rariorum.* Lond. 1791. fol. *Prodromus ſtirpium in horto ad Chapel-Allerton.* Lond. 1796. 8. *Paradiſus londinenſis*, vol. 1. 2. Lond. 1805—1808. 4. *Ψευδονύμως* dicitur, *Knightii* nomine, commentarium de *Proteis* edidiſſe, quem, nusquam venalem, mutuo ab Haworthio accepi. Obſ. in Annals of botany, et in Transact. of horticult. ſociety.

Salm. Joſephus, Princeps SALM-*Dyk* (nat. 1773): *Verzeichniſs des Geſchlechts Aloë* f. l. et a. Multas praeſertim ſucculentas, plantas mihi largitus eſt.

Salzm. Phil. SALZMANN, ſedulus plantarum per Galliam auſtralem, Corſicam et Hiſpaniam indagator. *Enumeratio plantarum rariorum, quas collegit.* Monspel. 1818. 8.

Sant. Georg. SANTI: *Viaggi per la Toſcana*, vol. 1—3. Piſa 1795—1806. 8.

Sav. Cajetanus SAVI, prof. Piſanus: *Flora piſana.* tom. 1. 2. Piſa 1798. 8. *Botanicon etruſcum.* tom. 1—4. Piſa 1808—1825. 8. *Obſervationes in varias Triſolii ſpecies.* Flor. 1810. 4.

Savign. .. SAVIGNY nonnulla capita in Encycl. botan. vol. 4. elaboravit.

Schäff. Jac. Chriſt. SCHÄFFER, praeco ſacer Ratisbonenſis (nat. 1718 † 1790): *Fungorum, qui in Palatinatu et Bavaria circa Ratisbonam naſcuntur, icones.* tom. 1—4. Ratisb. 1762—1770. 4.

Schärer. Lud. Imman. SCHÄRER, praeco ſacer Bern.: *Lichenum helveticorum ſpicilegium.* Bern. 1823—1826. 4. Obſ. in Muſée helvet. 1.

Schangin. Petr. SCHANGIN, metallorum inſpector in Barnaul Sibir. (nat. 1741 † 1816.) Pallaſio plantarum ſibiricarum et mongolicarum copiam miſit. Obſerv. in Pallas neuen nord. Beytr. 6.

Scherer. Jo. Andr. SCHERER: Obſ. in Jacquin coll. 1.

Schimper. Car. SCHIMPER, Heidelbergenſis: Obſ. in Regensb. botan. Zeit. 1825.

Schk. Chriſt. SCHKUHR, artifex mechanicus Wittebergenſis (nat. 1740 † 1811): *Botaniſches Handbuch.* Th. 1—3. Wittenb. 1791—1803. 8. *Beſchreibung und Abbildung der Riedgräſer.* Wittenb. 1801. 1806. 8. *Vier und zwanzigſte Klaſſe des Linné'ſchen Pflanzenſyſtems.* B. 1. Wittenb. 1809. 4.

Schlechtend. Dieter. a SCHLECHTENDAL, dicaſterii provincialis praeſes Paderborn. Obſ. in Berl. Mag. 7. 8. Supplementum ad Willdenovii enumerationem poſthumum edidit.

— Dieter. a SCHLECHTENDAL, prioris filius, cuſtos herbarii regii berolinenſis: *Animadverſiones in Ranunculeas Candollii*, faſc. 1. 2. Berol. 1819. 1820. 4. *Flora berolinenſis*, vol. 1. 2. Berol. 1823. 1824. 8. *Adumbrationes plantarum*, faſc. 1—3. Berol. 1825. 1826. 8. *Linnaea*, vol. 1. Berol. 1826. 8. Officioſae ejus humanitati debeo gratus plantarum in herbario regio ſervatarum uſum.

Schleich. J. C. SCHLEICHER, plantarum collector et venditor, Bex ad lacum Lemanum: *Catalogus plantarum in Helvetia ſponte naſcentium*, ed. 4. 1821. 8.

Schmidel. Caſim. Chriſt. SCHMIDEL, prof. Erlangenſis (nat. 1718 † 1793): *Icones et analyſes plantarum.* Norimb. 1782. fol. *Diſſertationes botanici argumenti.* Erlang. 1783. 4.

Schmidt. Franc. SCHMIDT, hortulanus: *Oeſtreichs allgemeine Baumzucht.* Th. 1. 2. Wien 1792. 1794. fol.

— Franc. Wilib. SCHMIDT, prof. Pragenſis († 1796): *Flora boëmica*, cent. 1—4. Prag. 1793. 1794. fol. Obſ. in Mayer's phyſik. Aufſätzen 1., in neuen Abh. der böhmiſchen Geſellſch. 2., in Römer's Archiv, 1.

— Jo. Car. SCHMIDT, ſcholae Fellenbergianae in Hofwyl prope Bernam collega, cum Kunzio edidit: Deutſchlands Schwämme in getrockneten Exemplaren (1816—1818). Obſ. egregiae de Phacidio et de disponendis Sphaeriis, quas ſequutus ſum in hoc opere, in Kunze's mykolog. Heften, 1. 2.

Schneevoogt. G. Voorhelm SCHNEEVOOGT: *Icones plantarum rariorum*, faſc. 1. 2. Harlem. 1793. fol.

Scholl. Frid. Ad. SCHOLLER, paedagogus fratrum Moravicorum Barby (nat. 1718 † 1785): *Flora barbienſis.* Lipſ. 1775. 8. *Supplementum florae.* 1787. 8.

Schott. Henr. SCHOTT, inſpector horti botanici Vindobonenſis († 1819). Egregiam plantarum copiam congeſſit cumque aliis communicavit.

— Henr. SCHOTT, prioris filius, hortulanus, Braſiliam adiit. Obſ. in Wiener medic. Jahrb. 6. et in appendice ad hoc opus.

Schousb. P. C. A. SCHOUSBOE, mercaturae Danorum procurator in Mauritania: *Beobachtungen über das Gewächsreich in Marocos.* Aus dem Däniſchen von J. A. Marcuſſen. Leipz. 1800. 8.

Schouw. Joach. Frid. SCHOUW, prof. Havnienſis: Italiam et Siciliam 1817—1819 peragravit, mihi et algas et alias plantas largitus eſt. Verſuch einer allgemeinen Pflanzen-Geographie. Berl. 1823. 8.

Schrad. Henr. Adolph. SCHRADER, prof. Gottingenſis: *Spicilegium florae germanicae.* Hannov. 1794. 8. *Syſtematiſche Sammlung kryptogamiſcher Gewächſe.* 1. 2. Gött. 1796. 1797. 8. *Sertum Hannoveranum*, faſc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Journal für die Botanik*, B. 1—5. Gött. 1799—1801. 8. *Neues Journal für die Botanik*, B. 1—4. Gött. 1806—1810. 8. *Commentatio de Veronicis ſpicatis.* Gott. 1803. 8. *Flora germanica*, vol. 1. (Cl. I—III.) Gott. 1806. 8. *Hortus gottingenſis*, faſc. 1. 2. 1809. 1813. fol. *Monographia generis Verbaſci.* faſc. 1. 2. Gott. 1813. 1823. 4. Obſ. in Gött. gel. Anzeigen.

Schrank. Franc. de Paula SCHRANK, acad. Monachienſis ſocius: *Bayerſche Flora.* 1. 2. München 1789. 8. *Primitiae florae Salisburgenſis.* Frcf. 1792. 8. *Reiſe nach den ſüdlichen Gebirgen von Bayern.* München. 1793. 8. *Plantae rariores horti Monacenſis*, faſc. 1. 2. Monach. 1817. fol. Obſ. in Uſteri Annal., im Naturforſcher, in act. acad. Monach., in Denkwürd. der bot. Geſellſch. in Regensb., in Regensb. bot. Zeit.

Schreb. Jo. Chriſt. Dan. SCHREBER, prof. Erlangenſis (nat. 1739 † 1810): *Icones plantarum minus cognitarum*, dec. 1. Hal. 1766. fol. *Beſchreibung der Gräſer.* Th. 1—3. Leipz. 1769—1810. fol. *Spicilegium florae Lipſ.* 1771. 8. *De Phaſco obſervationes.* Lipſ. 1772. 4. *Plantarum verticillatarum unilabiatarum genera et ſpecies.* Lipſ. 1774. 4. *Genera plantarum*, vol. 1. 2. Frcf. 1789. 1791. 8. Obſ. in nov. act. nat. cur. 3. 4. in nov. act. Upſal. 1.

Schubert. C. SCHUBERT in Ficini flora Dresd. 2.

Schübl. Guſt. SCHÜBLER, prof. Tubingenſis: *Diſſ. ſiſtens deſcriptiones cerealium cultorum.* Tubing. 1818. 4.

Schult. Jo. Aug. SCHULTES, prof. Landshut. in Bavaria: *Oeſtreichs Flora.* B. 1. 2. Wien 1794. 8. *Obſervationes botanicae.* Oenipont. 1809. 8. Cum Römero edidit Syſtema vegetabilium.

Schultz. Car. Frid. SCHULTZ, medicus Neobrandenburgi: *Prodromus florae Stargardienſis.* Berol. 1806. 8. *Supplementum* 1. Neobrandenb. 1819. 8. Obſ. in nov. act. nat. cur.

Schum. Chriſt. Frid. SCHUMACHER, prof. Havnienſis: *Enumeratio plantarum in partibus Saelandiae ſeptentrionalis et orientalis.* P. 1. 2. Havn. 1801. 1803. 8. Obſ. in Naturh. Selſk. Skrift. 1. 3.

Schumm. SCHUMMEL, collector Sileſius vid. *Günther.*

Schwab. Henr. SCHWABE, pharmacopola Deſſavienſis, acutiſſimus plantarum, praeſertim algarum, indagator.

Schwägr. Frid. SCHWÄGRICHEN, prof. Lipſienſis, eximius muſcorum frondoſorum ſcrutator. *Supplementum* 1. *et* 2. *ad J. Hedwig ſpecies muſcorum frondoſorum.* Lipſ. 1811—1826. 4. *Hiſtoriae muſcorum hepaticorum prodromus.* Lipſ. 1814. 8. Muſcos rariores multos ipſi debeo.

Schweigg. Aug. Frid. SCHWEIGGER, prof. Regiomontanus (in Sicilia trucidatus 1821): *Flora erlangenſis* (cum Franc. Körte).

Erl. 1811. 8. Obſ. in Königsb. Archiv für Naturwiſſ. 1. Plurimas eximio viro plantas debeo. Multis ille bonis flebilis occidit!

Schwein. Lud. Dav. A SCHWEINIZ, miſſioni fratrum Moravicorum in Bethlehem Penſylvaniae addictus, ſocio J. B. *ab Albertini: Conſpectus fungorum in agro Niskienſi creſcentium.* Lipſ. 1805. 8. Caricum americanarum monographia. 1822. Obſ. in Ann. of the Lyceum of New-York, 1., in Silliman's americ. Journ. et in act. nat. ſcrutat. Lipſ. 1.

Sebaſt. Anton. SEBASTIANI, prof. Romanus: *Florae Romanae prodromus.* Rom. 1818. 8.

Second. . SECONDAT: *Obſervations de phyſique et d'hiſtoire naturelle.* Paris 1750. 8.

Segu. Franc. SEGUIER, Nemauſenſis, Scipionis Maffei hoſpes: *Plantae veronenſes*, tom. 1—3. Veron. 1745—1754. 8.

Ser. Nic. Car. SERINGE, Bernae dudum, jam Genevae vivit: *Eſſai d'une monographie des ſaules de la Suiſſe.* Bern. 1815. 8. *Mélanges botaniques.* vol. 1. Bern. 1818. 8. *Muſée helvétique d'hiſt. naturelle*, vol. 1. Genev. 1823. 4. In Candollei prodromo plura capita elaboravit.

Seſſ. . SESSÉ, botanicus mexicanus, cujus icones et deſcriptiones plantarum mexicanarum *Mocino* mexicanus, Monspelii exul, cum Candolleo communicavit.

Seſt. Dominic. SESTINI, abbas, celeberrimus numiſmatum ſcrutator. *Viaggio da Buchareſt a Coſtantinopoli.* 1794. 8. Quas in hoc itinere per Moeſiam inferiorem et Thraciam invenerat plantas, cum Willdenovio communicavit, qui, quod Galacz (oppidum ad Danubium) aſcriptum erat, Galatiam interpretatus eſt, falſam patriam.

Sibth. Jo. SIBTHORP, prof. Oxonienſis († 1796), Graeciam omnem Aſiamque minorem bis obiit. *Flora Oxonienſis.* Oxon. 1794. 8. *Flora graeca*, ſplendiſſimum opus, Smithio curante ab anno 1806 inde prodit.

Sieb. Franc. Gul. SIEBER, Pragenſis, inſignis peregrinator, ingentes theſauros regionum variarum acceſſuque difficillimarum aperuit. Braſiliam primum, Comitis Hofmannseggii juſſu, adiit, dein Auſtriam omnem, Italiamque peragravit, tum et Cretam et Aegyptum ſcienter obiit, tandem novam Hollandiam inviſit. Ipſius ſumtibus et Hilſenbergius Maſcarenas et Kohautus Martinicam et Senegambiam adierunt. *Reiſe nach der Inſel Kreta.* Th. 1. 2. Leipz. 1823. 8.

Siegesb. Jo. Georg. SIEGESBEK, prof. Petropolitanum, Anandriam nuncupaſſe conſtat c Linn. amoen. 1. p. 248.

Sims. Jac. SIMS, poſt Curtiſii obitum opus: Botanical magazine, inſtruxit.

— Jo. SIMS, M. D. cum Konigio: *Annals of botany*, 1. 2. Lond. 1805. 1806. 8.

Sm. Jo. Ed. SMITH, M. D., digniſſimus Linnaei heres: *Plantarum icones hactenus ineditae.* faſc. 1—3. Lond. 1789—1791. fol. *Icones pictae plantarum rariorum.* Lond. 1790—1793. fol. *Spicilegium botanicum*, 1. 2. Lond. 1791. 1792. fol. *Engliſh botany* (Sowerbio icones inſtruente). vol. 1—36. Lond. 1790—1814. 8. *Sketch of a tour on the continent*, vol. 1—3. Lond. 1793. 8. *Tracts relating to natural hiſtory.* Lond. 1798. 8. *Flora britannica*, vol. 1—3. Lond. 1800. 8. *Exotic botany*, faſc. 1—8. Lond. 1804—1806. 8. *Florae graecae prodromus.* vol. 1. 2.

Lond. 1806. 1813. 8. *The engliſh flora*, vol. 1—3. Lond. 1824. 1825. In Transact. ſoc. Linn., in Reeſii Cyclopaedia et in actis taurinenſibus innumeras deſcripſit plantas novas aut raras. Plures etiam mihi largitus eſt.

Chr. Sm. Chriſt. SMITH (nat. 1781 † 1816), prof. Chriſtianiae deſignatus, comes Buchii in inſulis Canariis et Tuckeii ad Africam tropicam occidentalem. Et Buchius et R. Brownius divulgarunt, quas invenit plantas. (R. Brown's obſerv. on the herbarium collected by Chr. Smith in the vicinity of the Congo. Lond. 1818. 4.)

Soland. Dan. Car. SOLANDER, Bankſii comes in celeberrimo itinere περιπλόμῳ, dein bibliothecarius muſei britannici (nat. 1736 † 1786). Ἀνεξδότοις uſi ſunt Jon. Dryander et R. Brownius.

Sonner. Petr. SONNERAT, illuſtris navigator, rei herbariae ſcientia clarus († 1781): *Voyage à la nouvelle Guinée.* Paris 1776. 4. *Voyages aux Indes orientales et à la Chine.* Paris 1782. 4.

Sowerb. Jac. SOWERBY, pictor rei herbariae gnarus († 1822): *Engliſh fungi or muſhrooms.* N. 1—29. Lond. 1799. fol. In opere Smithiano: Engliſh botany, icones fecit.

Sparrm. Andr. SPARRMAN, Ekebergii et Forſteri in itineribus comes, dein in Africa auſtrali commoratus, tandem acad. holm. addictus (nat. 1747 † 1820). *Reſa til Goda-hopps-udden.* Stockh. 1783. 8. Obſ. in act. acad. holm. et in nov. act. ſoc. Upſal.

Spin. Marchio SPIN, chiliarchus militum Sardin. *Le jardin de S. Sebaſtien.* Turin. 1818. 8.

* *Auctor. Florae halenſis tentamen novum.* Hal. 1806. 8. *Mantiſſa* 1. *florae halenſis cum cent. novarum plantarum.* 1807. 8. *Obſervationes botanicae in floram halenſem.* 1811. 8. *Plantarum minus cognitarum pug.* 1. *et* 2. Hal. 1813. 1815. 8. *Plantarum umbelliferarum prodromus.* Hal. 1813. 8. *Species Umbelliferarum minus cognitae.* Hal. 1818. 4. *Novi proventus hortorum halenſis et berolinenſis.* Hal. 1818. 8. *Anleitung zur Kenntniſs der Gewächſe.* Th. 1—3. ed. 1. Hall. 1802—1804. 8. ed. 2. 1817. 1818. 8. *N. E. Neue Entdeckungen im ganzen Umfang der Pflanzenkunde.* Th. 1—3. Leipz. 1820—1822. 8. In Römeri et Schulteſii ſyſtemate vegetabilium Umbelliferas (vol. 6.) digeſſit. Obſ. in act. acad. Holm. et Petropolit., nov. act. nat. cur., Transact. ſoc. Linn., Bulletin de la ſoc. philomath., Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Moſcou, Schrader's Journ., Berlin. Magaz., Wetter. Annalen, Denkwürd. der bot. Geſellſchaft in Regensb.

Stackh. Jo. STACKHOUSE: *Nereïs britannica*, ed. 2. Oxon. 1816. 4.

Stark. STARKE, praeco ſacer Tſchirnae Sileſiae: Obſ. in Schrader's Journ. Plantas multas, praeſertim cryptogamicas, cum aliis communicavit. Obſ. in Schrader's Journ. 1799.

Stechm. Jo. Paul. STECHMANN: *Diſſ. de Artemiſiis.* Gott. 1775. 4.

Steph. Frid. STEPHAN, prof. Mosquenſis († 1817): *Enumeratio ſtirpium agri Mosquenſis.* Mosqu. 1792. 8. *Icones plantarum Mosquenſium*, dec. 1. 2. Mosqu. 1795. fol. Obſ. in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Mosc. 1.

Sternb. Caſp. Comes a STERNBERG, e proceribus Bohemiae: *Botaniſche Wanderung in den Böhmer Wald.* Regensb. 1806. 8. *Reiſen durch Tyrol in die öſtreichiſchen Provinzen Italiens.* Regensb. 1806. *Reviſio Saxifragarum iconibus illuſtrata.* Ratisb.

1810. fol. Obſ. in Sturmii flora, in Denkwürd. der bot. Geſellſch. zu Regensb. et in Regensb. bot. Zeit.

Steud. Ern. STEUDEL, medicus Eſslingenſis Würtenb.: *Nomenclator botanicus*, vol. 1. 2. Stuttg. 1821. 1824. 8.

Stev. Chriſt. STEVEN, a conſil. ſtatus ruthen. Obſ. in Marſchall-Bieberſteinii flora taurico-caucaſica, in Transact. ſoc. Linn. et in Mém. de la ſoc. d'hiſt. nat. de Mosc. 3—6.

Strauſs. Frid. A STRAUSS, Aſciburgii: Obſ. in Annal. der Wetter. Geſellſch. 2.

Stremp. Car. Frid. STREMPEL: *Filicum berolinenſium ſynopſis.* Berol. 1822. 8.

Sturm. Jac. STURM, artifex Norimbergenſis: *Deutſchlands Flora*, Abth. 1. Heft 1—47. Abth. 2. Heft 1—17. Abth. 3. H. 1—4. 1799 f. 12.

Suffr. . . DE SUFFREN: *Principes de botanique, ſuivis d'un catalogue des plantes du Frioul et de la Carnia.* Veniſe. 1802. 8.

Suter. Jo. Rud. SUTER, prof. Bern. († 1827): *Flora helvetica*, vol. 1. 2. Turic. 1802. 12. ed. 2. cur. Hegetſchweiler. Turic. 1822. 8.

Sutt. Car. SUTTON: Obſ. in Transact. ſoc. Linn. 4.

Sw. Ol. SWARTZ, prof. Holmienſis, Indiam occidentalem perſcrutatus eſt (nat. 1760 † 1817): *Nova genera et ſpecies plantarum.* Holm. 1788. 8. *Obſervationes botanicae.* Erl. 1791. 8. *Icones plantarum incognitarum, quas in India occidentali detexit.* Erl. 1794. fol. *Flora Indiae occidentalis*, vol. 1—3. Erl. 1797—1806. 8. *Diſpoſitio ſyſtematica muſcorum frondoſorum Sueciae.* Erl. 1798. 8. *Synopſis filicum.* Kil. 1806. 8. In opere: Svenſk botanik plurimas illuſtravit plantas; nemini mortalium liberalitate, et erga me, ceſſit. Obſ. in act. acad. holm., in Schrader's Journ., in Berl. Magaz. et in Transact. ſoc. Linn.

Sweet. Rob. SWEET: *Hortus ſuburbanus Londinenſis.* Lond. 1818. 8. *Geraniaceae*, Lond. 1820 f.

Sym. Jelinger SYMONS: *Synopſis plantarum inſulis britannicis indigenarum.* Lond. 1798. 8.

— Mich. SYMES, legatus britannicus in Ava: *Account of an embaſſy to the kingdom of Ava.* Lond. 1800. 4.

Targion. Octav. TARGIONI-TOZZETTI, prof. Florentinus: Obſ. in Memorie di Modena.

Tauſch. Ignat. Frid. TAUSCH, prof. Pragenſis: *Hortus Canalius* f. *plantarum, quae in horto Joſephi Malabaila, Comitis de Canal coluntur, icones et deſcriptiones*, dec. 1. Prag. 1823. fol. Obſ. in Regensb. bot. Zeit.

Tenor. Mich. TENORE, prof. Neapolitanus: *Flora neapolitana*, faſc. 1—6. Neapol. 1811. fol. *Prodromus florae neapolitanae.* Neap. 1811—1813. 8. *Synopſis novarum plantarum, quae in prodromo deſcribuntur.* Neap. 1815. 8. Plantarum collectionem novarum mihi largitus eſt.

Thor. Jo. THORE, medicus Tarbellis Aquitaniae (Dax en Gaſcogne) († 1823): *Eſſai d'une Chloris du département des Landes.* Dax. 1803. 8. Obſ. in Journ. de botanique.

— Claud. Ant. THORY: *Prodrome de la monographie du genre Roſier.* Paris 1820. 8. Redontaei Roſas adumbravit.

Thouin. Andr. THOUIN, praefectus horti botanici regii Pariſienſis († 1824): Obſ. in Ann. et Mém. du muſ.

Thuar. Aub. AUBERT du PETIT-THOUARS, acad. Pariſienſis ſocius, a. 1792—1802 in inſulis Acunnae, Maſcarenis et Mada-

gaſcaria commoratus eſt: *Hiſtoire des végétaux, recueillis dans les iles auſtrales d'Afrique.* Paris 1806. 4. *Genera nova Madagaſcarenſia.* Paris 1810. 8. *Mélanges de botanique et de voyages.* Paris 1811. 8. *Hiſtoire des plantes Orchidées, recueillies ſur les trois iles auſtrales d'Afrique.* Paris 1822. 8.

Thuill. J. L. THUILLIER, prof. Pariſienſis (†1822): *Flore des environs de Paris.* Paris 1799. 8.

Thunb. Car. Petr. THUNBERG, prof. Upſalienſis, a. 1772—1778 Africam auſtralem, Javam, Ceylonam et Japoniam inviſit: *Flora japonica.* Lipſ. 1784. 8. *Icones plantarum japonicarum.* Upſal. 1794. fol. *Prodromus plantarum capenſium.* Upſal. 1794. 8. *Flora capenſis.* (Cl. 1—4.) Upſal. 1813. 12. *Flora capenſis,* ed. Schultes. Stuttg. 1823. 8. *Diſſertationes botanicae,* (ed. Perſoon.) 1. 2. Gott. 1799. 1800. 8. Obſ. in act. acad. Holm., Petropol., nov. act. ſoc. Upſal., Transact. ſoc. Linn., comment. ſoc. phyſiogr. Lundin., ſoc. Havn., ſoc. Harlem.

Till. Mich. Angel. TILLI, praefectus horti botanici Piſani: *Catalogus plantarum horti Piſani.* Flor. 1723. fol.

Timm. Joach. Chriſt. TIMM, conſul Malchini Megapol.: *Florae megapolitanae prodromus.* Lipſ. 1788. 8. Obſ. in Siemſſen's Magaz. für Naturk. Meklenb.

Tin. Vincent. TINEO, prof. Panormitanus: *Plantarum rariorum Siciliae pugillus.* Panorm. 1817. 8. Egregiarum plantarum ſicularum copiam mihi donavit.

Tod. Henr. Jul. TODE, praeco ſacer Pritzier Megapol. (nat. 1733 †1797): *Fungi meklenburgenſes ſelecti.* P. 1. 2. Luneb. 1790. 1791. 4.

Torr. Jo. TORREY, medicus Noveboracenſis: *Catalogue of plants in the vicinity of New-York.* Albany 1819. 8. *Flora of the middle and northern ſections of the united ſtates,* vol. 1. New-York 1824. 8. Obſ. in Ann. of the Lyceum of New-York et Silliman's amer. journ. Inſignem plantarum rariorum copiam mihi largitus eſt.

Tourn. Joſ. Pitton DE TOURNEFORT, inſignis peregrinator per Graeciam Aſiamque minorem, eximius auctor ſyſtematicus, prof. Pariſienſis (nat. 1656 †1708): *Inſtitutiones rei herbariae,* vol. 1—3. Paris 1719. 4. *Relation d'un voyage du Levant.* tom. 1. 2. Amſt. 1718. 4. Obſ. in act. acad. Pariſ.

Townſon. loco Townſend. Rob. TOWNSON: *Travels in Hungary.* Lond. 1797. 4.

Trattin. Leop. TRATTINIK, cuſtos muſei imperatorii Vindobon.: *Fungi auſtriaci, ad ſpecimina viva cera expreſſi.* Vindobon. 1804. 1805. *Archiv der Gewächskunde,* faſc. 1—4. Wien 1811. 1812. 4.

Trentep. Jo. Frid. TRENTEPOHL, praeco ſacer Oldenbrock in ducatu Oldenburg. Obſ. in Rothii catal. et bot. Bemerkungen.

Trevir. Lud. Chriſt. TREVIRANUS, prof. Wratislavienſis: *Allii ſpecies.* Wratisl. 1822. 4. Obſ. in Berl. Magaz., Jahrb. der Gewächsk. et in nov. act. nat. cur. 13.

Triguer. . . DE TRIGUEROS, Hiſpaniam baeticam perſcrutatus eſt. *Ἀνεκδότοις* florae Carmonenſis uſus eſt Cavanilles.

Trin. Car. Bern. TRINIUS, acad. Petropolit. ſodalis: *Fundamenta agroſtographiae.* Vienn. 1820. 8. *Clavis agroſtographiae antiquioris.* Coburg. 1822. 8. *Species graminum iconibus et deſcriptionibus illuſtratae,* faſc. 1—4. Petrop. 1825. 1826. 8. Obſ. in neuen Entdeck. 2.

Turn. Dawſon TURNER: *A ſynopſis of the britiſh Fuci.* Lond. 1802. 12. *Muſcologiae hibernicae ſpicilegium.* Yermouth. 1804. 8. *Fuci*, or coloured figures and deſcriptions etc. vol. 1—4. 1807. fol.

Turp. P. J. F. TURPIN, ingenioſus et doctus plantarum pictor. Cum Poiteo: *Flore des environs de Paris.* faſc. 1—7. 1808 f. Cum eodem Duhamelii novam curavit editionem. Obſerv. in Ann. et Mém. du muſ.

Turr. Ant. TURRA: *Florae italicae prodromus.* Vicent. 1780. 8.

Tuſſ. F. R. DE TUSSAC: *Flore des Antilles*, vol. 1—3. Paris 1808—1826. fol.

Ucr. E. Bernard. UCRIA, demonſtrator plantarum Panorm.: *Hortus regius Panormitanus.* Panorm. 1819. 4. Obſ. in Römer Archiv, 1.

Urv. Jo. Dumont D'URVILLE, primum comes navarchi Gauttier 1819 et 1820 inſulas maris aegei et oras ponti euxini inviſit, dein 1822—1825 itinere περιχοσμίῳ inclaruit. Enumeratio plantarum in Mém. de la ſoc. Linn. de Paris, 1.. Sur la flore des Malouines in Ann. des ſcienc. nat. 6.

Vahl. Martin. VAHL, prof. Havnienſis, Europam auſtralem ipſamque Numidiam obierat (nat. 1749 †1804): *Symbolae botanicae*, P. 1—3. Havn. 1790—1794. fol. *Eclogae americanae*, fol. 1. 2. Havn. 1796. 1798. fol. *Icones illuſtrationi plantarum in eclogis inſervientes*, dec. 1—3. Havn. 1798. 1799. fol. Florae danicae vol. 6. et 7. inſtruxit. *Enumeratio plantarum*, vol. 1. 2. Havn. 1804. 1805. 8. Obſ. in Naturhiſt. Selſk. Skrivt. 1. 2.

Vaill. Sebaſt. VAILLANT, prof. Pariſienſis (nat. 1669 †1721): *Botanicon pariſienſe.* Leid. 1727. fol. Obſ. in act. acad. Pariſ. 1718—1722.

Vand. Domin. VANDELLI, Italus, prof. Conimbricenſis, diu in Braſilia degit: *Diſſ. de Aponi thermis.* Patav. 1758. 4. *Faſciculus plantarum.* Olyſip. 1771. 4. *Diccionario dos terminos technicos de hiſtoria natural.* Coimbr. 1788. 4. Recuſ. in Römer. ſcriptor. de plantis luſitan., hiſpan. et braſil.

Vauch. Jo. Petr. VAUCHER, verbi divini miniſter Genevenſis: *Hiſtoire des Conferves d'eau douce.* Genèv. 1803. 4. Obſ. in Mém. du muſ. et in mém. de la ſoc. phyſ. de Genève.

Vell. Thom. VELLEY, chiliarchus britann. († 1806): *Coloured figures of marine plants.* Bathon. 1795. fol. Obſ. in Transact. ſoc. Linn.

Vent. Steph. Petr. VENTENAT, prof. Pariſienſis (nat. 1757 †1808): *Deſcription des plantes nouvelles, cultivées dans le jardin de M. Cels.* Paris 1800. fol. *Monographie du genre Tilleul.* Paris 1802. 4. *Jardin de la Malmaiſon*, vol. 1. 2. Paris 1803. 1805. fol. *Choix de plantes.* faſ. 1—10. Paris 1803—1808. 4. *Decas generum novorum.* Paris 1808. 4.

Veſt. Laur. DE VEST, prof. Graiaci in Styria. Obſ. in Regensb. bot. Zeit. Cum Römero et Schulteſio plantas communicavit.

Vib. Eric. VIBORG, prof. Havnienſis (nat. 1759 †1822): *Abh. von der Gerſte.* Kopenh. 1802. 4. Obſ. in nov. act. havn. 1.

Vigu. loco Vign. L. G. A. VIGUIER: *Hiſtoire naturelle des Pavots et des Argémones.* Montpell. 1814. 4.

Vill. D. VILLARS, primum medicus Gratianopol., dein prof. Argentinenſis († 1814): *Hiſtoire des plantes du Dauphiné*, vol. 1-4. Grenoble 1786—1789. 8. *Précis d'un voyage botanique.* Strasb. 1812. 8.

Vitm. Fulgent. VITMANN: *Summa plantarum, quae hactenus innotuerunt*, vol. 1—6. Mediol. 1789—1792. 8.

Viv. Domin. VIVIANI, prof. Genuenſis: *Annali di botanica*, 1. 2. Genova 1802. 1804. 8. *Florae italicae fragmenta.* Gen. 1808. 4. *Florae libycae ſpecimen.* Gen. 1824. fol. *Florae corſicae prodromus, cum appendice.* Genuae 1824. 1825. 4.

Vog. Bened. Chriſt. VOGEL, prof. Altorfinus: *Plantarum rariorum icones Trewianas illuſtravit.* Norimb. 1779. fol.

Voit. J. G. VOIT, medicus Svinfurtenſis: *Hiſtoria muſcorum frondoſorum in ducatu herbipolitano creſcentium.* Norimb. 1812. 8. Icones Sturmii in florae fect. 2. faſc. 11—14. illuſtravit.

Volckam. Jo. Georg. VOLCKAMER, medicus Norimbergenſis (nat. 1616 †1693): *Flora norimbergenſis.* Norimb. 1700. 4.

Wahlb. Petr. Frider. WAHLBERG: *Flora gothoburgenſis.* Upſal. 1820. 8.

Wahlenb. Georg. WAHLENBERG, prof. Upſalienſis: *Flora lapponica.* Berol. 1812. 8. *De vegetatione helvetica.* Turic. 1813. 8. *Flora Carpathorum.* Gott. 1814. 8. *Flora upſalienſis.* Upſal. 1820. 8. *Flora ſuecica.* P. 1. 2. Stockh. 1824. 1826. 8. Operis, Svenſk botanik tom. 9. redegit. Obſ. in act. acad. holm.

Waiz. Frid. WAIZ, tabularii praefectus Altenburg. Roſarum collector.

Wall. Nathan. WALLICH, horti botanici Calcutt. praefectus: *Tentamen florae nepalenſis illuſtratae.* Calcutt. et Seramp. 1824. fol. Obſ. in Roxburghii flor. ind., in Aſiatic reſearch., in Transact. ſoc. Linn. et in Tidſkrift for Naturvidenſkab.

Wallm. . . WALLMODEN: Obſ. in Liljeblad's ſvenſk flora.

Wallr. Frid. WALLROTH, medicus Northuſanus: *Annus botanicus.* Hal. 1815. 8. *Schedulae criticae.* Hal. 1822. 8. Obſ. in Verhand. der berl. Geſellſch. naturf. Freunde, 1.

Walt. Thom. WALTER: *Flora Caroliniana.* Lond. 1788. 8.

Wangenh. Frid. Ad. Jul. a WANGENHEIM, ſylvarum curator: *Beſchreibung einiger nordamericaniſchen Holzarten.* Gött. 1781. 8. Obſ. in Beobacht. der berl. Geſellſch. naturf. Freunde.

Web. Fr. WEBER, prof. Kilonienſis (nat. 1781 †1823). Cum Mohrio: *Naturhiſtoriſche Reiſe durch einen Theil Schwedens.* Gött. 1804. 8. *Deutſchlands kryptogamiſche Gewächſe.* Kiel 1807. 12. *Archiv für die ſyſtematiſche Naturgeſchichte.* 1. Leipz. 1804. 8. *Beyträge zur Naturkunde*, B. 1. Kiel 1805. 8. *Groſsbritanniens Conferven*, nach Dillwyn bearbeitet, Heft 1—4. Gött. 1803—1805. 8. . . Scorſim: *Hiſtoriae muſcorum hepaticorum prodromus.* Kil. 1815. 8.

— Georg. Henr. WEBER, prof. Kilonienſis, prioris pater: *Spicilegium florae gottingenſis.* Goth. 1778. 8. Cf. Wiggers.

Weig. Chriſt. Ehrenfr. a WEIGEL, prof. Gryphiae: *Flora pomerano-rugica.* Berol. 1769. 8. *Obſervationes botanicae.* Gryph. 1772. 4.

Weih. Aug. WEIHE, medicus Herford.: *Beſchreibung der deutſchen Brombeerarten, mit Abbildungen.* Heft 1—4. Bonn 1820 f. fol. Gramina germanica ſiccata faſciculis 12. edidit.

Weinm. J. A. WEINMANN, hortulanus imperatricis viduae Ruthen. in Pawlowſk. Obſ. in Regensb. bot. Zeit. 1821 f.

Weis. Fr. Gul. WEIS: *Plantae cryptogamicae florae Gottingenſis.* Gott. 1770. 8.

Wendl. Henr. Ludov. WENDLAND, hortulanus Herrenhuſanus: *Commentatio de Acaciis aphyllis.* Hannov. 1820. 4.

— Jo. Chriſt. WENDLAND, praefectus horti Herrenhuſani, prioris pater: Cum Schradero: *Sertum hannoveranum*, faſc. 1—3. Gott. 1795—1797. fol. *Hortus herrenhuſanus*, tom. 1—4. Hannov. 1798. 1799. fol. *Botaniſche Beobachtungen.* Hannov. 1798. 4. *Ericarum icones*, faſc. 1—17. Hannov. 1798—1806. 4. *Sammlung ausländiſcher und einheimiſcher Pflanzen.* B. 1. 2. Hannov. 1806—1810. 4.

Weſt. Hans WEST: *Beſkrivelſe over S. Croix.* Kiobenh. 1793. 8.

Wib. Aug. Gul. Eberh. Chriſt. WIBEL: *Primitiae florae Werthemenſis.* Jen. 1799. 8.

Wigg. Frid. Henr. WIGGERS: *Primitiae florae holſaticae.* Kil. 1780. 8. Verus auctor eſt G. H. Weber, prof. Kilonienſis, qui et *ſupplementum hujus florae* 1787. 8. edidit.

Wikſtr. Jo. Imman. WIKSTRÖM, cuſtos muſei acad. Holm.: *Diſſ. de Daphne.* Upſal. 1817. 4. Obſ. in act. acad. holm. Plantas ſuccicas multas ipſi debeo.

Wilk. Sam. Guſt. WILCKE: *Flora gryphica.* Gryph. 1765. 8.

W. Chriſt. Lud. WILLDENOW, prof. Berolinenſis (nat. 1765 † 1812): *Florae berolinenſis prodromus.* Berol. 1787. 8. *Tractatus de Achilleis.* Hal. 1789. 8. *Hiſtoria Amaranthorum.* Turic. 1790. fol. *Phytographia ſ. deſcriptio plantarum rariorum.* Erl. 1794. fol. *Linnaei ſpecies plantarum*, tom. 1—5. Berol. 1797—1818. 8. *Enumeratio plantarum horti berolinenſis*, 1. 2. Berol. 1809. 8. *Supplementum* poſthumum adidit Schlechtendal. *Berliniſche Baumzucht*, ed. 2. Berl. 1811. 8. Obſ. in Uſteri's Magazin, in neuen Schriften berl. Geſellſch. naturf. Freunde, in Berl. Magazin, in act. acad. berolin., monach., erford.

Willem. Petr. Remig. WILLEMET, inſulas Maſcarenas peragravit, obiit in India orientali 1790 (nat. 1762): *Herbarium Mauritianum*, quod ad Millinum miſerat, edidit Uſteri in Ann. 18.

— Remig. WILLEMET, prioris pater, medicus Nancianus († 1807): *Flore de l'ancienne Lorraine.* vol. 1—3. Nancy 1805. 8.

Willich. Chriſt. Lud. WILLICH, medicus Clausthal. († 1776.) Obſervationes botanicae, recuſae in Reichard ſylloge opuſculorum botanicorum. Frcf. 1782. 8.

Wint. Jo. Joſ. WINTERL, prof. Peſtinenſis († 1789): *Index horti botanici.* Peſtini. 1788. 8. (Cum tabulis 25, ſed haud abſolutus.)

Wither. Gul. WITHERING, medicus Birmingham. (nat. 1741 † 1799): *A ſyſtematical arrangement of britiſh plants*, ed. 5. vol. 1—4. Birmingh. 1812. 8.

Wohlleb. Jo. Frid. WOHLLEBEN, M. D.: *Supplementum ad Leyſſeri floram halenſem.* Hal. 1796. 8.

Woods. Joſ. WOODS Roſas britannicas illuſtravit in Transact. ſoc. Linn. 12.

Woodw. Thom. Jenkinſon WOODWARD: Obſ. in Philoſ. transact. 74. et in Transact. ſoc. Linn.

Wormſk. Martin. WORMSKIOLD, centurionis legatus, Norvegiam 1807, tum Grönlandiam 1812—1815 inviſit, dein Kotzebueum in *περίπλῳ* 1816 comitatus, in Camtſchatca biennium commoratus, redux ingentem plantarum numerum reportavit, quas et Hornemannus et Lyngbyus illuſtrarunt.

Wrang. Frid. Ant. a WRANGEL: Obſ. in act. acad. holm. 1823.

Wred.

Wred. J. C. L. WREDOW, verbi divini minister Parum Megapol. (nat. 1773 † 1823): *Oekonomisch-technische Flora Meklenburgs.* Th. 1. 2. Lüneb. 1811. 1812. 8.

Wright. Gul. WRIGHT: Obs. in plantas jamaicenses, in Lond. medic. Journ. 8., in Usteri Mag. 4. 7. et in Philos. transact. 67.

Wulf. Fr. Xaver. WULFEN, abbas Clagenfurt in Carinthia († 1804). Obs. in Jacquini miscell. et collect., tum et in Römeri Archiv. 3.

Young. Thom. YOUNG, medicus: Obs. in Transact. soc. Linn. 3.

Zanon. Jac. ZANONI, prof. Bononiensis (nat. 1615 † 1682): *Istoria botanica*, ed. Monti. Bonon. 1742. fol.

Zanted. Aug. ZANTEDESCHI, medicus in Bovegno Brixian.: Obs. in comment. acad. Brixianae, 1813—1814. 1818. et in Brugnatelli diario physico.

Zea. . . ZEA, prof. Matrit.: Obs. in act. acad. Matrit. 1806.

Zuccagn. Attil. ZUCCAGNI, praefectus horti botan. Florent.: *Centuria 1. observationum botanicarum.* Flor. 1806. 4. Recus. in Römeri collectan. Turic. 1809. 4.

Zuccar. J. G. ZUCCARINI, prof. Monachiensis: Obs. in act. acad. Monach.

INDEX GENERUM.

Nomina literis obliquis expreſſa ſynonyma ſunt.

A.

Abelia R. Br. 223. 239.
Ablania Aubl. 210.
Abroma Jacqu. 295.
Abronia Hook. 53.
Acacia W. 261-262.
Acacia W. et al. 165.
Acaena 19. 336.
Acalypha 315.
Acer 150.
Achillea 303.
Achyranthes 102-102. 341.
Achyranthes L. et Coll. 102. 106.
Achyronia * 271. 287.
Aconitum 211.
Acronodia Blum. 145. 149.
Acroſtichum 320.
Acroſtichum Thuar. 320.
Acrozus * 145. 149.
Adenanthera Kunth. 165.
Adenocalyx Berter. 169.
Adenocarpus Cand. 273.
Adenogramma Reichenb. 541.
Adenophora Fiſch. 77.
Adina Salisb. 80.
Adonis 217-218.
Adriana Gaudich. 316-317.
Aegiceras Gärtn. 254.
Aeſchynanthus Jack. 223. 238.
Aeſchynomene Ort. et Jack. 273. 294.
Aetheilema R. Br. 236.
Afzelia Sm. 170.
Agaricus 332-333.
Agati Rheed. 284.
Aglaia Lour. 85. 246. 250.
Agrimonia 190.
Agroſtis 31. 337.
Aïdclus * 11. 17.
Aira 32.
Aiuga 226.
Aïzoon 193.
Alamania Laxarf. 306. 309.
Alchemilla 45.
Alchornea Sw. 251.
Alectorolophus M. B. 232.
Alegria Seſſ. 201. 205. 296.
Aleurites W. 262.
Aliſma 144.
Allium 132.
Alopecurus 30.
Alphitomorpha Wallr. 332.
Alpinia 8.
Alſodea Thuar. 99.
Alſtonia R. Br. 65.
Alſtrömeria 135.
Alternanthera Don. et Kunth. 103. 106. 107.
Alyſſum 239.
Alyxia Banks 109.
Amajoua Aubl. 139. 342.
Amarantus 122.
Amaria Seb. Mut. 247. 254.
Amaryllis 132-133.
Amaryllis Lindl. et Sims. 133.
Amerimnum P. Br. 268.
Amicia Kunth. 264. 294.
Ammannia 43.
Ammobium R. Br. 300.
Amomum Kön. 7.
Ampelopſis Blum. 90.
Amphilochia Mart. 4. 10.
Amphinomia Cand. 247. 255.
Amphirrhox * 51. 99.
Amphymenium Kunth. 268.
Amyris 148-149.
Anacardium 156.
Anagallis 339.
Anagyris 170.
Anatherum P. B. 33.
Anchietea Hilar. 51. 98.

Anchuſa 55. 539.
Anchuſa Stev. 339.
Anciſtrum Thuar. 19.
Andira Leſchen. 269.
Androcymbium W. 141. 142.
Andromeda 159.
Andropogon 22. 33. 337.
Andropogon Humb. et al. 337.
Androſace 57.
Aneilema Hook. et Don. 25.
Anemone 220-221.
Angelica 121.
Angelonia Humb. 255.
Anguillaria R. Br. 142.
Anguillaria * 141. 142.
Aniſomeles R. Br. 226.
Aniſopogon R. Br. 336.
Anneſorrhiza Schlecht. 118.
Anona 216.
Anona Radd. et Spr. 214.
Anthericum 135.
Antheſteria 337.
Anthoſpermum 338.
Anthyllis 266.
Aotus Sm. 175.
Apargia Scop. 305.
Apatelia Cand. 210. 211. 295.
Aphanamixis Blum. 246. 251.
Aphananthe Link. 122.
Aphanoſtemma Hilar. 219.
Aphelandra R. Br. 236.
Aplophylla Adr. Juſſ. 163.
Aquilicia Gärtn. 70.
Arabis 242.
Aralia 125.
Araucaria R. Br. 315.
Arbutus Forſt. et Mill. 158. 543.
Archytea Mart. 295. 296.
Arctotis 304.
Ardiſia Sw. 67-68.
Arenaria 181-182.
Arenaria Fiſch. 124.
Argophyllum Forſt. 100.
Argoſtemma Wallich. 50. 81-82.
Ariſtida 31.
Ariſtolochia 310.
Armeria W. 127.
Arnica 302.
Aromadendron Blum. 202. 217.
Artemiſia 300.
Arthroſtemma Don. 161.
Arum 311. 347.
Aſaphes * 222. 232.
Aſcium Schreb. 207.
Aſclepias 110. 341.
Aſpalathus 267-268.
Aſpalathus Burm. et Don. 171. 271.
Aſparagus 136.
Aſperula 39.
Aſpidiſtra Ker. 152.
Aſpidium Sw. 320.
Aſpidoſperma Mart. 49. 58.
Aſtephanus R. Br. 112.
Aſter 301.
Aſteriſcium Chamiſſ. 116.
Aſterocephalus Vaill. 38.
Aſtilbe Don. 145. 153.
Aſtragalus 288.
Aſtranthus Lour. 145.
Aſtrolobium Desv. 294.
Athamanta 119-120.
Athamanta Don. 119.
Auguſta Leandr. 301.
Avena 35.
Aylmeria Mart. 102. 103.

B.

Baccharis Trevir. 501.
Bactyrilobium Schrad. 166.
Bäckea 149.
Baeobotrys Forſt. 83-84.
Ballota 227.
Balſamina Hook. 99.
Balſamita Desf. 300.
Banffya Baumg. 53. 114. 179.
Bangia Lyngb. 332.
Bankſia L. fil. 47.
Baphia Afz. 158. 175.
Baptiſia Vent. 171.
Barbiera Cand. 282.
Barbula Hedw. 323.
Bartlingia Reichenb. 50. 79.
Bartramia Hedw. 325.
Bartſia 238.
Bartſia Mx. et L. 232.
Baſſia Kön. 189.
Bauera Andr. 209.
Bauhinia 166.
Beaumontia Wallich. 49. 65.
Begonia 211-213.
Bellium 303.
Ben-tiru-tali Rheed. 62.
Berberis 138.
Bergia 184.
Berula Koch. 120.
Besleria 238.
Betonica 227.
Beureria Jacqu. 66.
Bidens 299.
Bignonia 237.
Biſcutella 239.

Blackwellia Commerſ. 191.
Blitum 10.
Blumenbachia Schrad. 208.
Bocagea Hilar. 130. 143-144.
Böhmeria Jacqu. 513-514.
Bönninghauſia * 279.
Boletus 333-334.
Bolivaria Schlechtend. 11. 12.
Bombax 259-260.
Bombax W. 206.
Bonannia Presl. 244.
Bonnaya Link. 15.
Bonnetia Schreb. 206-207.
Bonplandia W. 51. 91.
Borbonia 267.
Borbonia * 284.
Borkhauſia Böhm. 504.
Boronia Sm. 148.
Borrago 55.
Boſſiaea Vent. 274.
Boswellia Colebr. 161.
Bouſſingaultia Humb. 52. 108.
Bowdichia Kunth. 158. 169.
Bowleſia R. et P. 117.
Brachyſtemma Don. 114. 181.
Bractearia Pöpp. 73.
Bradleia Gärtn. 248.
Brandeſia Mart. 106.
Braſſica 243. 346.
Braſſica Gaud. et Urv. 243.
Braya Sternb. 259.
Brayera Kunth. 192. 195.
Bremontiera Cand. 293.
Brexia Noronh. 51. 94.
Bromelia 131.
Bromus 36.
Brongniartia Kunth. 264. 287.
Browneа Jacqu. 253.
Brucea Herit. 43.
Brunelia R. et P. 191.
Brunonia Sm. 346.
Brunſvigia Lindl. 133.
Bryonia 248.
Bryum 324.
Bubon Schlechtend. 120.
Bubroma Schreb. 295.
Bucholzia Mart. 103.
Bucida 177.
Buddlea 42.
Büchnera 255.
Büttnera 93.
Bulliarda Cand. 48.
Bupleurum 117-118.
Burchellia R. Br. 85.
Burmannia 23.
Burtonia R. Br. 175.
Butomus 157.
Buxus 314.

C.

Cachrys 119.
Cadſura Juſſ. 345.
Caesalpinia 169.
Caladium Vent. 511.
Calanthe R. Br. 309.
Calathea Meyer. 5.
Callicarpa 41.
Callicoma R. Br. 191.
Callirrhoë Nutt. 259.
Calliſtachys Vent. 173.
Calliſthene Mart. 10.
Callitriche 4.
Callopiſma Mart. 338.
Calophaca Fiſch. 273.
Calophyllum 203.
Calorophus Labill. 36.
Calpandria Blum. 247. 260.
Caltha 220.
Calyptranthes Sw. 194.
Calyſtegia Wallich. 62.
Camellia 260.
Campanula 76-78. 340.
Campylanthus Roth. 19.
Campyleia Thuar. 222. 232.
Camunium Rumph. 250.
Canavalia Cand. 280.
Canna 4-5.
Canthium Lam. 82.
Cantua Juſſ. 64.
Capellia Blum. 202. 217.
Caperonia Hilar. 310. 314-315.
Capparis 204.
Capparis Jacqu. 139.
Capraria 236.
Caprifolium Don. 82.
Caragana Lam. 263. 280.
Caraipa Aubl. 201. 207.
Carapa Blum. 147.
Cardamine 241-242.
Carduus 298.
Carex 311-313.
Carex Nees. 39.
Cariſſa 70-71.
Carmichaëlia R. Br. 263. 271.
Carolinea 260.
Carpopogon Roxb. 263. 272.
Carum Koch. 120.
Caryochloa * 22. 30.
Caryophyllus Labill. 193.
Caſalea Hilar. 218. 220.
Caſearia 176.
Caſparea Kunth. 166.

Caffelia Necs. 222. 231.
Caffia 166-169.
Caffine 123.
Caffine Mart. 48.
Caftilleia Mut. 232.
Cataſetum Rich. 307.
Catesbaea 40.
Cattleya Lindl. 309.
Caucalis 119.
Caucalis Don. 119.
Caulinia 25.
Cauſtis R. Br. 26.
Ceanothus 88.
Cedrela P. Br. 95.
Celaſtrus 88-89.
Celoſia 102.
Celoſia L. 106.
Cenchrus 33.
Cenomyce Laur. 327.
Centaurea 298.
Centranthera R. Br. 235.
Centrophorum Trin. 22. 30. 33.
Ceraſtium 183.
Ceratochloa Cand. 36.
Cerbera 66.
Cerbera Rudg. 58.
Cerinthe 53.
Ceſtrum 71.
Chaenomeles Lindl. 196.
Chaerophyllum Fiſch. et al. 120.
Chaetocalyx Cand. 279.
Chailletia Cand. 122.
Chara 331.
Cheiranthus 243.
Cheiranthus Hall. fil. 242.
Chelone 223. 235.
Chenopodium 122.
Cherleria 183.
Chionanthus L. 12.
Chirita Don. 15.
Chironia 60.
Chiſocheton Blum. 246. 251.
Chlora 147.
Chloris W. 337.
Choriſia Kunth. 253.
Chorizema Labill. 172.
Chorizema Sm. 172.
Chriſtia Mönch. 291.
Chryſiphiala Bot. reg. et Hook. 132.
Chryſocoma 298.
Chryſophyllum 70.
Chryſosplenium 179.
Cinchona 73. 340.
Cineraria 302.
Cineraria Tenor. 302.
Cinnamomum Don. et Hook. 156.
Cipadeſſa Blum. 252.
Cirſium Vaill. 297-298.
Ciſſampelos 317.
Ciſſus 43-44.
Ciſtus 205-206.
Citrus 295.
Cladium P. B. 21.
Cladonia Hoffm. 327.
Cladoſtachys Don. 102.
Clematis 221.
Cleome 138-139.
Clerodendron 231.
Cleyera Thunb. 206.
Cliffortia 209. 345.
Clinopodium Roxb. 224.
Clitoria 282.
Clitoria Juſſ. et al. 286. 287.
Cluſia Rich. 208.
Clypea Blum. 316.
Cnemidoſtachys Mart. 313.
Cneſtis Lam. 255.
Cnicus Tenor. et C. C. Gmel. 297. 298.
Cnicium Cuſſ. 118.
Cnidium Koch. 118.
Cobaea Cav. 64.
Coccoloba 154.
Cocculus Blum. 143.
Cochloſpermum Kunth. 201. 206.
Codia Forſt. 146. 152.
Codonopſis Wallich. 78.
Coelogyne Lindl. 305. 308.
Colax Lindl. 307.
Colbertia Blum. et Don. 213.
Colchicum 141.
Colchicum R. Br. 134.
Collaea * 304.
Collaea Cand. 279.
Collema Kunth. et Radd. 329.
Cologania Kunth. 282. 283.
Colpodium R. Br. 31.
Columbia Perſ. 205.
Colutea 278.
Colymbea Saliſb. 315.
Comandra Richardſ. 109.
Comarum Roxb. 198.
Combretum 166.
Commelina 25.
Comocladia 25.
Compſanthus * 130. 137.
Compſoa Don. 130. 137.
Conanthera R. et P. 136.
Conchocarpus Mik. 91.
Condalia Cav. 108.
Conferva Pollin. et Radd. 331. 332. 335.
Conium 120.

Conium Berg. 118.
Connarus L. Cand. 254.
Connarus L. et al. 255.
Conobea Aubl. 232.
Conohoria Hilar. 99.
Conoria Kunth. 99.
Conofpermum Sm. 46.
Convallaria 136.
Convolvulus 60-62.
Convolvulus Wallich. 65.
Conyza 301.
Cookia Blum. 161. 162.
Copaifera 176-177.
Copaiva Jacqu. 177.
Corallophyllum Kunth. 145. 147.
Cordia 66.
Cordyla Lour. 247. 262.
Cornus 44.
Correia Vand. 162.
Corrigiola 124.
Corydalis Dillen. 264.
Corynandra Schrad. 201. 204.
Corynella Cand. 263. 280.
Corynitis * 263. 280.
Coftus 7-8.
Cotyledon 188.
Coulteria Kunth. 169.
Couma Aubl. 49. 58.
Couraturi Aubl. 208.
Courfetia Cand. 283.
Coutoubea Aubl. 338.
Cowania Don. 192. 197.
Crambe 346.
Craniolaria Nees. et Mart. 238.
Crataegus Link. 196.
Crenias * 246. 247.
Crepis 304.
Crepis Guffon. et Forsk. 304. 305.
Crinum 133-134.
Critamus Koch. et Beff. 119. 120.
Crocus 23.
Crotalaria 275-277.
Crotalaria Cand. et al. 266. 267. 286.
Croton 262.
Croton L. 314.
Crozophora Neck. 314.
Crumenaria Mart. 51. 102.
Cryptandra Sm. 63.
Cryptolobus * 272.
Cubaea Scop. 170.
Cucullaria Schreb. 4. 9.
Cuncea Hamilt. 40.
Cunila 16.
Cunila Hook. et W. 224. 226.
Cupania 149.
Cuphea P. Br. 190.
Curatella 209.
Curculigo Gärtn. 154.
Curcuma 7.
Curtia Schlechtend. 60.
Cufcuta 114.
Cufpa Humb. 99.
Cyamopfis Cand. 280.
Cyanotis Don. 138.
Cyathea Sw. 320.
Cyathodes Chamiff. 67.
Cybbanthera Hamilt. 234.
Cyclopia Vent. 171.
Cydonia Hamilt. 196.
Cylifta Ait. 269.
Cymation * 130. 141. 142. 143.
Cymbidium Sw. 307.
Cymbopogon * 337.
Cyminofma Gärtn. et Cand. 148.
Cynanchum 110.
Cynogloffum 55.
Cynomorium 336.
Cynosurus Hort. berol. 36.
Cyperus 28-29.
Cypripedium 310.
Cyrtandra Forft. 14-15.
Cyrtanthus Ait. 134.
Cyrtocarpa Kunth. 157. 161.
Cyrtopodium R. Br. 308.
Cytinus 145. 246.
Cytifus 272.
Cytifus Loif. 279.

D.

Dalbergia L. fil. 268-269.
Dalbergia Perf. et Hook. 170. 275.
Dalea 294-295.
Danthonia Cand. 54.
Daphne 152. 343.
Daphne Radd. 152.
Darlingtonia Cand. 262.
Daubentonia Cand. 273.
Daucus 119.
Davilla Vand. 201. 209.
Daviefia Sm. 174.
Daviefia Sieb. et Sm. 172. 175.
Dawfonia R. Br. 321.
Deguelia Aubl. 269.
Dejanira Schlechtend. 41.
Delilia * 305.
Delima 206.
Delphinium 211.
Dendrobium Sw. 309.
Dendrobium Hook. 310.
Depazea Fr. 332.

Deschampsia R. Br. 52.
Desmanthus W. 165.
Desmochaeta Cand. 103.
Desmochaeta Cand. 102.
Desmodium Cand. et Lindl. 290–293.
Detarium Juss. 158. 177.
Deyeuxia Clarion. 30.
Deyeuxia * 536.
Dianthus 179.
Dicerma Cand. 289. 290.
Dichilos Cand. 263. 273.
Dichonema Fr. Nees. 532.
Diclidanthera Mart. 343.
Dicliptera Juss. 19.
Dicliptera Nees. 237.
Diclytra Don. 265.
Dicorypha Thuar. 47.
Dicranum Hedw. 322.
Dictyoloma Adr. Juss. 51. 94.
Didymocarpus Jack. et al. 13–15. 223. 238.
Didymochiton Blum. 247. 253.
Didymodon Hedw. 323.
Digitalis 234.
Dillenia 202.
Dillenia Roxb. 213.
Dillwynia Sm. 174–175.
Dillwynia Sieb. 174.
Dimereza Labill. 146. 150.
Dioclea Kunth. et Cand. 283.
Dioscorea 143.
Diospyros 146–147.
Diphaca Lour. 170.
Diplocomium Funck. 324.
Diplopetalon * 146. 150.
Diplophractum Desf. 205.
Dipsacus 37–38.
Disandra L. 63. 145.
Discocapnos Schlechtend. 264.
Disemma Labill. 250.
Disporum Don. 136.
Ditassa R. Br. 52. 111.
Ditmaria * 4. 8.
Dodecatheon 56.
Dodonaea 152.
Dolichonemia Nees. 170.
Dolichos 280.
Dolichos L. et al. 270. 281. 282. 285.
Dombeya Cav. 256.
Dombeya Lamb. 315.
Donax Lour. 6.
Draba 240.
Dracaena 136.
Drimys 215.
Drosera 126.
Drymaria W. 124.
Dufourea Hilar. et Nees. 10. 328.
Dulongia Kunth. 53. 114.
Dumasia Cand. 263. 279.
Dumerilia Lag. et Cand. 297. 301.
Dupontia R. Br. 32.
Duvalia Nees. 326.
Duvaua Kunth. 148.
Dysoxylon Blum. 252.

E.

Ecastaphyllum Rich. 268.
Eccremocarpus R. et P. 237.
Echinocarpus Blum. 201. 204.
Echites 64.
Echites Roxb. et Labill. 65.
Echium 54.
Edwardsia Salisb. 172.
Ehrenbergia Spr. et Mart. 542. 543.
Ehretia 66.
Elacagnus 47.
Elaeocarpus 189.
Elaphrium Kunth. 148–149.
Eleiotis Cand. 269.
Eleocharis Don. et Nees. 47.
Eleusine Gärtn. 36.
Elodea Humb. et Rich. 25.
Elvasia Cand. 145.
Elymus 34.
Embelia Burm. 50. 69.
Empedoclea Hilar. 201. 203.
Encyanthus Lour. 157. 158.
Enkianthus Lour. 157.
Entada Adans. 164.
Entelea R. Br. 201. 204.
Epacris Forst. 64.
Epicharis Blum. 251.
Epidendrum 309.
Epilobium 151.
Eranthemum R. Br. 19.
Eria Lindl. 310.
Erica 146. 342.
Erineum Pers. 335.
Eriodendron Blum. et Mart. 259.
Eriostemon Sm. 157. 164.
Eriostemon Spr. et al. 164. 189.
Erisma Mart. 9.
Ernodea Sw. 40.
Erodium Herit. 249.
Erucastrum Presl. 244.
Ervum 346.
Eryngium 115.
Erysimum 242. 243.

Erythraea Rich. 57.
Erythrina 278.
Erythrina Roxb. 291.
Erythroſtictus Schlechtend. 142.
Eſcallonia Mut. 94.
Eſenbeckia Kunth. et Blum. 126. 257.
Eucalyptus Herit. 195.
Eugenia Mart. et Coll. 193.
Eulophia R. Br. 307.
Euphorbia 311.
Euphraſia 232.
Euphronia Mart. 246. 251.
Eurotium Grev. 332.
Eurycoma Jack. 53. 125.
Euthemis Jack. 51. 92.
Eutrema R. Br. 239.
Evodia Labill. 43.
Evolvulus 113.
Evonymus 92-93.
Exacum 41. 338.
Eyſenhardtia Kunth. 268.

F.

Fabiana R. et P. 49. 62.
Fagelia Neck. 276.
Fagraea Wallich. et al. 71.
Farſetia Turr. 240.
Fedia Mönch. 23.
Ferula Tenor. 122.
Feſtuca 36.
Feuillaea 250.
Fimbriſtylis Vahl. 26.
Flacourtia Commerſ. 208-209.
Frankenia 141.
Freylinia Coll. 66.
Fritillaria 135.
Frullania Radd. 324.
Fuchſia 151.
Fumaria 264.
Funaria Hedw. 324.

G.

Galactia P. Br. 282-283.
Galactia Perſ. 282.
Galega 286.
Galega Thunb. et Jacqu. 171. 278.
Galenia * 122.
Galeopſis 228.
Galipea Aubl. 53. 91.
Galium 39. 338.
Galvania Velloz. 79.
Garcinia 189.
Gardenia 84-85.
Gardneria Wallich. 40.
Gardoquia R. et P. 225.
Gaſtonia Roxb. 125.
Gaultheria 159. 343.
Gaultheria * 160.
Gay-Luſſacia Schlechtend. 160.
Geeria Blum. 202. 213.
Geiſſoïs Labill. 158. 177.
Genioſtoma Forſt. 59.
Geniſta Burm. et al. 171. 266.
Gentiana 32. 112-113.
Geophila Don. 50. 82.
Geranium 253.
Geranium Boccon. et Bivon. 249.
Geſnera 238.
Geum Purſh. et Langsd. 189. 345.
Gilliesia Lindl. 22. 24.
Gladiolus 23.
Glaucium Tournef. 203.
Glechoma Roxb. 225.
Glechon * 222. 227.
Globba 8.
Glorioſa 135.
Gloſocomia Don. 78.
Gloſſarrhen Mart. 99.
Glottidium Desv. 287.
Gloxinia Herit. 239.
Glycine 269-270.
Glycine W. 278.
Glycoſmis Corr. 161-162.
Glyphis Ach. 327.
Gnaphalium 300.
Gnidia 152.
Godoya R. et P. 158. 201. 206.
Gomphia Schreb. 162-163.
Gompholobium Sm. 172-173.
Gompholobium Bonpl. et Sm. 175.
Gomphrena 104-106.
Gomphrena Vahl. et al. 106-108.
Gongora R. et P. 305. 307-308.
Goniocarpus Thunb. 48.
Goniocheton Blum. 252.
Gonolobus Mx. 110.
Gonyanthes Blum. 306. 310.
Goodenia Sm. 76.
Goodia Salisb. 267.
Goodia Cand. 272.
Gordonia 260.
Goſſypium 257.
Gouania 101-102.
Gouffeia Cand. 114. 181.
Graemia Hook. 297. 299.
Grahamia * 297. 299.
Gratiola 15.
Gratiola Rottl. et Sw. 14. 17.

Grevillea R. Br. 46.
Grewia 205.
Griffinia Lindl. 133.
Grimmia Hedw. 521.
Guajacum L. 254.
Guarea 251.
Guatteria R. et P. 214-215.
Guilandina 165.
Guilleminea Kunth. 52. 105.
Gymnoſtomum Hedw. 521.
Gynandropſis Blum. 138.
Gynoſtemma Blum. 240. 251.
Gypſophila 178-179.
Gyrophora Kunth. 527.

H.

Habranthus Herb. 133.
Haemocharis Mart. 260.
Haemodorum Sm. 24.
Hänkea R. et P. 88.
Hagenbachia Nees. 24.
Hakea Schrad. 46.
Haleſia 256.
Halimodendron Cand. 263. 280.
Hallia Thunb. 263. 269.
Hallia W. 266.
Hamamelis 47.
Hamiltonia W. 109.
Hamiltonia Don. et Roxb. 73. 139.
Harpullia Roxb. 51. 92.
Harriſonia Adanſ. 321.
Haſſeltia Kunth. 201. 204.
Hebanthe Mart. 103. 104.
Hecaſtophyllum Kunth. 268.
Hedera 102.
Hedychium Kön. 6-7.
Hedycrea Schreb. 108.
Hedyotis 40.
Hedyſarum 290-293.
Hedyſarum L. al. 267. 275. 279.
Helianthemum Tournef. 207.
Heliconia 109.
Helicteres 256.
Heliophila 244.
Heliotropium 53-54.
Heliotropium Lehm. 66.
Hellenia W. 8.
Helminthia Juſſ. 305.
Heloſciadium Koch. 119. 120.
Helxine Requien. 318.
Hemerocallis 135.
Hemerocallis Thunb. 134.
Hemianthus Nutt. 11. 17.
Hemiphragma Wallich. 222.
Henckelia * 11. 13. 14.
Heracleum 121.
Hermannia L. 255.
Hermas 118.
Herneſia Humb. et Spr. 146. 153. 191. 252.
Herpeſtes Gärtn. 254.
Herpeſtes Purſh. 17.
Heſperis Viv. 242. 243.
Heſſea Berg. 134.
Heteromorpha Schlechtend. 117.
Heurnia R. Br. 52.
Heylandia Cand. 263. 266-267.
Heynea Roxb. 252.
Hibbertia Salisb. 211.
Hibiſcus 258.
Hieracium 304.
Hierochloë Gmel. 32.
Hippeaſtrum Herb. 133.
Hippion * 58. 60. 340.
Hippuris 10.
Hirſchfeldtia Presl. 244.
Hirtella 86. 341.
Hollböllia Wallich. 342.
Holoregmia Nees. 238.
Holoſteum 37.
Homalium Jack. 210.
Hookeria Sm. 324.
Hoplotheca Nutt. 52. 107.
Horkelia Schlechtend. 341.
Hornſchuchia Nees. 131. 144.
Hortia Vand. 51. 91. 94.
Houſtonia 41.
Hovea R. Br. 267.
Hovenia Thunb. 88.
Hoya R. Br. 110.
Humirium Mart. 345.
Hunteria Roxb. 50. 69.
Hura Kön. 8.
Hutchinſia R. Br. 240.
Hydnocarpus Vahl. 93-94.
Hydnum 334.
Hydrangea 178.
Hydranthelium Kunth. 26.
Hydraſtis 202. 220.
Hydrocotyle 116.
Hydrolea 114.
Hygrophila R. Br. 237.
Hymenaea 170.
Hymenodictyon Wallich. 73.
Hymenophyllum Sm. 320.
Hymenopogon Wallich. 50. 74.
Hymenoſpron * 264. 285.
Hymenoſtomum * 321.
Hymenothecium Lag. 32.
Hypericum 296-297.
Hypnum 324.
Hypochnus Fr. 335.

Hypochoeris 305.
Hypoxis 134.
Hyptis Jacqu. 229.
Hyſſopus 227.

I.

Jackia Wallich. et Blum. 50. 81. 265.
Jackſonia R. Br. 175.
Jambolifera 148.
Jasminum 11-12.
Iberis 240.
Icacina Adr. Juſſ. 51. 91.
Icica Kunth. 148.
Ilex 48.
Ilex Nees. 88. 89.
Illecebrum 105.
Illecebrum W. et Spr. 103. 106. 107.
Impatiens 99-100.
Imperatoria 121.
Incarvillea Roxb. 237. 238.
Indigofera 284-286.
Indigofera Mut. 270.
Inga 261.
Inga W. et Cand. 254.
Inula 301.
Ionidium Hilar. et Mart. 97. 98.
Ipomoea Sims et al. 60-62.
Ireſine 103-104.
Ireſine * 107.
Iris 24.
Irlbachia 540.
Iſolepis Don. et Carmich. 27. 28.
Iſotoma Lindl. 75.
Itea 94.
Juncus 137-138.
Jungermannia 524-526.
Jungia 501.
Juſſieva 151.
Juſticia 18-19.
Ixodia R. Br. 500.

K.

Kämpfera 7.
Kennedia Vent. 289.
Kielmeyera Mart. 207.
Kieſeria Nees. 207.
Kölera Perſ. 35.
Königia 57.
Kolbea Schlechtend. 130. 142.
Koniga R. Br. 239. 240.
Kuhlia Kunth. 201. 208.

L.

Labatia Sw. 42.
Labichea Gaudich. 11. 12.
Lacis Schreb. 146. 210.
Laciſtema Sw. 11. 21.
Lagetta Juſſ. 152.
Lamium 228-229.
Langsdorffia Leandr. 125.
Lanipila Burch. 303.
Lanſium Rumpf. 252.
Lantana Link. et Ott. 231.
Laſioſpermum Trevir. 503.
Lathyrus 283-284.
Laurus 155-156.
Laurus Bot. mag. et Nees. 156.
Lavradia Vand. 95.
Lebeckia Thunb. 273.
Lecananthus Jack. 50. 74.
Lecanora Radd. 530.
Lecidea Ach. 327.
Lecythis 208.
Leea 70.
Lemanea Bory. 531.
Leonia R. et P. 540.
Leontodon 304.
Lepia Presl. 240.
Lepidagathis W. 237.
Lepidium 240.
Lepidoſperma Labill. 26.
Leptocarpus Nees. et Link. 57. 231.
Leptodermis Wallich. 130. 139.
Leptomeria R. Br. 109.
Leptoſpermum Forſt. 194.
Leptoſpermum Labill. 149.
Lepyrodia R. Br. 56.
Leſpedezia Mx. 271.
Leſpedezia Perſ. 267.
Leſſertia Cand. 278.
Leucas R. Br. 230.
Leucogramme Meyer. 326. 327.
Leucoïum 132.
Leucopogon Sieb. et Mal. miſc. 67.
Leycesteria Wallich. 50. 85.
Liatris Gärtn. 298.
Licania Aubl. 52. 108.
Lichen Engl. bot. 528.
Lichenſticinia Schlechtend. et W. 118. 119. 142. 143.
Liguſticum 120-121.
Liguſticum Chamiſſ. et Spr. 119.
Liguſtrum 12.
Lilium 134-135. 542.
Limodorum 506.
Limodorum Labill. 509.

Limonia 162.
Linaria * 16. 234.
Lindernia 232.
Lindleya Nees. 260.
Linociera Sw. 12.
Linum 127-128.
Liparia 284.
Lippia 231.
Liriodendron L. 217.
Liſianthus P. Br. 59. 339-340.
Lithoſpermum Roxb. 66.
Loaſa Adanſ. 208.
Lobelia 75-76.
Lobularia Desv. 239.
Löflingia 336.
Logania R. Br. 59.
Lomaria W. 320.
Lonchocarpus Kunth. et Cand. 268-269.
Lonicera 82-83.
Lopezia Cav. 8.
Loranthus 139-140.
Lotus Lag. et al. 266. 270. 271. 284. 287.
Lourea Desv. et Cand. 291. 292.
Lühea W. 295. 296.
Lumnitzera Jacqu. 223.
Lupinus 275.
Luſſacia * 160.
Luxemburgia Hilar. 146. 150. 201. 206.
Lychnis 183.
Lychnophora Mart. 297. 299.
Lycopſis 339.
Lycurus Humb. 32.
Lyginia R. Br. 26.
Lyſimachia 55-56.
Lyſinema R. Br. 64.
Lyſionotus Don. 11. 14.
Lyſiopoma Humb. 76.
Lythrum 191.

M.

Maba Forſt. 139.
Machaerium Kunth. 268.
Macroceratides Radd. 281.
Macrocnemum 73.
Macrocnemum Roxb. 74.
Macrodon W. Arnott. 323.
Macromitrion Brid. 322.
Macroſcepis Kunth. 110.
Macrotropis Cand. 170.
Maerua Forsk. 208.
Maeſa Don. 83. 84.
Magnolia 216-217. 345.
Magonia Hilar. 150.
Maju Molin. 170.
Malcolmia R. Br. 243.
Malocchia Sav. 280.
Malpighia 179.
Malva 257. 346.
Manettia Mut. 40.
Mangifera Desrouſſ. et Kunth. 161.
Manglietia Blum. 217.
Maranta 5-6.
Marathrum Humb. 146. 210.
Marchantia 326.
Marialvea Vand. 345.
Mariſcus Vahl. 29.
Marrubium 239-240.
Martia Leandr. 286.
Martynia 238.
Maſchalocarpus * 321-322.
Maſſonia 132.
Maſtigophorus Caſſin. 301.
Mataxa * 297. 303.
Matthiola R. Br. 242.
Mauria Kunth. 157. 161.
Maxillaria Hook. 307.
Maytenus Kunth. 89.
Mazus Lour. 234.
Mecanopſis Cand. 203.
Medicago Cand. 271.
Meeſia Hedw. 324.
Megaclinium Lindl. 306. 309.
Melaleuca 295.
Melanopſidium Coll. 139.
Melanoſticta Cand. 169.
Melanthium 142.
Melanthium L. et al. 141. 142.
Melaſtoma 160.
Melia Cand. 252.
Melianthus 223.
Melica 32.
Melidora Salisb. 158.
Melilotus Tournef. 271.
Meliſſa 224.
Meliſſa Arduin. 227.
Melochia Hilar. et L. 248.
Melodinus Forſt. 109.
Meniſcoſta Blum. 53. 114.
Meniſpermum 143.
Mentha 227-228.
Merckia Fiſch. 53. 124.
Mesembrianthemum 196.
Meſpilus 196.
Meſpilus Don. 196.
Metrocynia Thuar. 254.
Metrodorea Hilar. 51. 94.

Metrosideros Gärtn. 194.
Meum Tournef. 119.
Michelia 202. 217. 346.
Micranthera Choisy. 201. 208.
Micromelum Blum. 157. 162.
Microsemma Labill. 203.
Microstachys Hilar. 513.
Microtea Sw. 122.
Mierisia Lindl. 130. 137.
Millera L. 303. 305.
Mimosa 147.
Mimosa L. et al. 165. 253. 262.
Mimulus 234.
Mirbelia Sm. 175.
Mitreola Rich. 49. 59.
Mniopsis Mart. 248.
Mogiphanes Mart. 52. 107.
Mogorium Lam. 12.
Moldenhawera Schrad. 170.
Mollia Mart. 295. 296.
Molopospermum Koch. 121.
Momordica 246.
Monarda 16.
Monenteles Labill. 297. 300.
Monnina R. et P. 265.
Monotropa 162.
Montia 37.
Moquilea Mart. 341.
Moraca 24.
Morina Don. 232.
Morinda 80.
Mucuna Cand. 281.
Murraya 162.
Murucuja Perf. 250.
Musa 109.
Mussaenda 73.
Mycoporum Meyer. 326.
Myosotis 54.
Myriadenus Desv. 289.
Myrica 47-48.
Myriophyllum 314.
Myristica 252.
Myrodendron Schreb. 345.
Myroxylon Kunth. et Lamb. 170.
Myrrhis Morif. 120.
Myrsine 68-69.
Myrsine Wallich. 69.
Myrtus 193.

N.

Napimoga Aubl. 210.
Narcissus 132.
Nassavia Commerf. 301.
Nasturtium R. Br. 241.
Nasturtium Boccon. 241.
Nauclea 80-81.
Negretia Kunth. 281.
Neillia Don. 192.
Nemophila Bart. 55.
Nepenthes 256.
Nepeta Trevir. 226.
Nerija Roxb. 86.
Nerium Roxb. 65.
Neuropeltis Wallich. 52. 113.
Nevrocarpon Desv. 264. 286-287.
Nicolsonia Cand. 290.
Nicotiana 62.
Nierembergia R. et P. 62.
Niffolia Jacqu. 268.
Noisettia Humb. 51. 98.
Noisettia Hilar. 98.
Nolana 67.
Nonatelia Aubl. 81.
Norantea Kunth. 207.
Notelaea Vent. 12.
Notylia Lindl. 305. 308.
Novella Rumph. 257.
Nuttallia Hook. 259.
Nyctanthes Lour. 12.

O.

Ocellularia Meyer. 326.
Ochrosia Labill. 66.
Ocimum 223-224.
Octomeria R. Br. 310.
Odonia Bertol. 263. 279.
Oenanthe 118-119.
Oenanthe Nutt. 121.
Oenothera 150-151.
Olax 25.
Oligosporus Caffin. 297. 300.
Olyra 29.
Omphalobium Gärtn. 157. 247. 255.
Omphalobium Jacqu. fil. 254.
Oncidium Sw. 308.
Oncoma * 11. 18.
Ononis 266. 346.
Onosma 54.
Ophiopogon Ker. 136.
Ophiorrhiza 49. 50. 75.
Ophiorrhiza L. 59.
Ophrys 306.
Opilia * 86. 250.
Orchis 306.
Oreas Chamiss. 239. 241.
Origanum 227.
Orlaya Hoffm. 119.

Ormosia Jackf. 176.
Ornithogalum 132.
Ornithogloſſum Salisb. 142-143.
Ornithopodium Burm. 293.
Ornithopus 294.
Ornitrophe Labill. 150.
Orobus 283.
Orophea Blum. 144.
Orthotrichum Hedw. 323.
Orthotrichum Hornſch. 322.
Osbeckia 161.
Oſcillatoria Vauch. 332.
Oſtericum Beſſ. 121.
Oſtrya Michel. 310.
Otoptera Cand. 275.
Oudneya R. Br. 239. 242.
Oxalis 184-188.
Oxera Labill. 11. 18.
Oxylobium Andr. 172.
Oxypetalum R. Br. 52. 111-112.

P.

Pachyrrhizos Rich. 264. 281.
Pachysandra Hook. 314.
Paederia 70.
Paeonia 211.
Palava Kunth. et al. 210. 211.
Palicourea Hilar. 79.
Paliurus Lam. 124.
Panax 114.
Pancovia W. 145. 170.
Pancratium 132.
Panicum 33-44.
Papaver 203.
Papaver Don. 203.
Pappophorum Schreb. 34.
Parentucellia Viv. 223. 238.
Parietaria 318.
Parkia R. Br. 247. 253.
Parkinſonia 170.
Parmelia Ach. 328-330.
Parochetus Hamilt. 263. 279.
Paſpalum 30.
Paſſiflora 249-250. 346.
Paſtinaca 121.
Patrinia Juſſ. 38.
Pauletia Kunth. 166.
Paullinia 153.
Pedicularis 233-234.
Pelexia Poit. 306.
Peltidea Laur. 331.
Peltigera Hoffm. 331.
Pentapetes 256.
Pentſiemon Torr. et Nutt. 235.
Peperomia Hook. 20. 21.
Pergularia 110.
Perilla 222. 227.
Periploca W. et al. 112.
Pernettia Gaudich. 157. 158.
Perrottetia Kunth. 50. 87.
Perſea Gärtn. 156.
Perſoonia Sm. 45.
Petrea 231.
Peucedanum 121.
Peucedanum Mönch. et al. 119. 121.
Peziza 335.
Pfaffia Mart. 52. 103. 106-107.
Phaca 287.
Phaeocarpus Mart. 150.
Phalangium Lindl. 136.
Phallus 335.
Phaſeolus 281-282.
Phaylopſis Bot. mag. 256.
Phebalium Vent. 157. 164.
Phelline Labill. 37. 42.
Philagonia Blum. 37. 43.
Philotheca Rudg. 255.
Philoxerus R. Br. 107.
Phlomis 230.
Phrynium W. 4. 6.
Phycella Lindl. 130. 133.
Phylica 108.
Phyllerium Fr. 335.
Phyllodium Desv. 289.
Phyſalis 72.
Phyſianthus Mart. 52. 112.
Phyſidium Schrad. 235.
Phyſoſtemon Mart. 145. 147.
Phyteuma 76.
Picris Delil. 305.
Pictetia Cand. 264. 294.
Pilocarpus Vahl. 126.
Pimpinella Don. 119.
Pineda R. et P. 210.
Pinus 315.
Piper 20-21.
Piriqueta Kunth. 124.
Piſcidia Jacqu. 273.
Piſonia 145.
Piſonia W. 12.
Piſtacia 316.
Pitcarnia Herit. 131.
Plantago 42.
Platychilum Delaun. 267.
Platygramme Meyer. 327.
Platylobium Sieb. et al. 172. 274.
Platypetalum R. Br. 239. 241.
Platyſpermum Koch. 119.
Plazia R. et P. 301.

Plectanthera Mart. 150. 206.
Plectranthus Herit. 224.
Plectranthus Don. 223-224.
Pleea Reichenb. 142.
Pleurandra Labill. 191.
Pleuraphis Torr. 22. 32.
Pleuropogon R. Br. 22. 31.
Pleurothallis Lindl. et Kunth. 308.
Plocama Ait. 50. 79.
Poa 35.
Poa R. Br. 36.
Pocockia Ser. 271.
Podaliria Lam. 171.
Podaliria Mx. et al. 171. 176. 267.
Podolobium R. Br. 172.
Podolobium Cand. 172.
Podofaemon Nees. 50.
Pohlana Mart. 125.
Poiretia Cand. 293.
Poitea Vent. 284.
Polanifia Blum. 139.
Polemannia Berg. 135.
Pollinia * 337.
Polycarpon 37.
Polygala 265.
Polygonum 154-155.
Polypodium 320.
Polypogon Desf. 50.
Polyporus Fr. Nees. et Blum. 333.
Polytrichum 323.
Pomaderris Labill. 89.
Porana Burm. 62.
Porpa Blum. 201. 204.
Pofoqueria Wallich. et Roxb. 84.
Potalia Aubl. 343.
Potamogeton 48-49.
Potentilla 198-199. 344.
Pothos 310-311.
Poupartia Commerf. 158. 188.
Pozoa Lag. 116.
Prangos Lindl. 119.
Pratia Gaudich. 76.
Prenanthes 304.
Prepufa Mart. 342.
Preslea Mart. 338-339.
Prieftleya Cand. 264. 284.
Primula 56-57.
Prosopis 165.
Proftanthera Labill. 226.
Prunus 192.
Pfeudanthus Sieb. 22. 25.
Pfidium 194.
Pfilobium Jack. 50. 74.
Pfophocarpus Neck. 280.
Pforalea 270-271.
Pforalea Poir. 293.
Pfychotria 78-79.
Pfychotria L. 82.
Pfyllocarpus Mart. 37. 58-59.
Pteris Thuar. 320.
Pterisanthes Blum. 44.
Pterocarpus Löfl. 268.
Pteronevron Cand. 241.
Pterofpermum Schreb. 256.
Pterofpermum Blum. 256.
Pueraria Cand. 263. 275.
Pulmonaria 54.
Pultenaea Sm. 173-174.
Pultenaea Sieb. 172. 174. 175.
Pupalia Mart. 103.
Pycnoftachys Hook. 222. 227.
Pygeum Gärtn. 192. 193.
Pyrethrum Sm. 303.
Pyrus 196. 343.
Pyrus Don. 196.

Q.

Qualea Aubl. 4. 9-10.
Qualea Link. et Spr. 9. 10.
Quaffia 163.
Quercus 314.

R.

Raddia Bertol. 29.
Radia Ach. Rich. 296.
Rafnia Thunb. 274.
Rafnia Mart. 269.
Randia Roxb. et Don. 74. 84.
Ranunculus 218-220.
Raphanus 259.
Raputia Aubl. 91.
Rauwolfia 109.
Redowskia Chamiff. et Schlechtend. 240.
Requienia Cand. 267.
Reftio 26.
Reftio Nees. et R. Br. 26. 36.
Retinaria Gärtn. 102.
Rex amaroris Rumph. 141.
Rhabdia Mart. 340.
Rhacodium Rebent. 334.
Rhamnus 86.
Rhamnus Burm. 87.
Rheum 156.
Rhexia 160-161.
Rhinanthus M. B. 252.

Rhinocarpus Berter. 156.
Rhodiola Don. 188.
Rhododendron 160.
Rhodonema Martens. 331. 332.
Rhus 125.
Rhus Burm. 255.
Rhynchoſia Cand. 270.
Rhynchoſpora Vahl. 26.
Ribes 100-101.
Richardia 139.
Riedlea Cand. et Blum. 248.
Riveria Kunth. 269.
Rivina 45.
Robergia Schreb. 188.
Robergia W. 254.
Robinia 279.
Robinia Poir. et al. 149. 176. 203. 268. 274. 279. 280. 293. 294.
Röperia Adr. Juſſ. 164.
Rollinia Hilar. 202. 214.
Rondeletia 74-75.
Roſa 199-200.
Roſea Mart. 103.
Rourea Kunth. et Aubl. 188. 254.
Rubia 39.
Rubus 197. 343-344.
Rudolphia W. 278.
Ruellia 236.
Rumex 144.
Ruppia 49.
Ruſſula Perſ. 333.
Ruta 163-164.

S.

Sabbatia Adanſ. 58.
Sabbatia * 58. 60.
Sabia Colebr. 91.
Sabinea Cand. 263. 279.
Saccharum 33.
Sagittaria 214.
Salix 20.
Salomonia Lour. 4. 246. 248.
Salvia 17.
Sampaca Rumph. 217.
Samyda 176.
Sanicula 116.
Saponaria Schlechtend. 178.
Sarcanthus Lindl. 306.
Sarcocarpon Blum. 202. 217.
Sarcophyllum Thunb. 274.
Sarcopyramis Wallich. 342-343.
Sarmienta R. et P. 336.
Sauravia W. 202. 210-211.
Sauvageſia 95.
Sauvageſia Hilar. 95.
Saxifraga 178.
Scabioſa Vaill. 38.
Scabioſa Viv. et al. 38.
Scaevola 81.
Scandix 120.
Schelveria Nees. 235.
Schiedea Chamiſſ. 180.
Schima Reinw. 260.
Schinus 179.
Schinus Orteg. 148.
Schizaea Sm. 320.
Schizanthus R. et P. 14.
Schizochiton * 246. 251.
Schlechtendalia * 295. 296.
Schmidelia Schreb. 150.
Schnellia Radd. 166.
Schöpfia Schreb. 78.
Schotia Jacqu. 157. 247. 254.
Schubertia Mart. 110.
Schübleria Mart. 540.
Schulteſia Mart. 338.
Schweiggeria Spr. et Hilar. 99.
Schwenckia 13.
Schwenkfeldia Sw. 85.
Scilla 135.
Scirpus 27-28.
Sciuris Schreb. et al. 11. 14. 91.
Scleria Berg. 313.
Sclerodontium Schwägr. 322.
Scleroſtylis Blum. 161. 162.
Scopolia Sm. 91.
Scorzonera 347.
Scutellaria 225-226.
Sebaea R. Br. 41. 338.
Sebaſtiania Bertol. 304.
Sedum 188.
Selinum 121.
Selinum Schum. et Beſſ. 118. 121.
Sempervivum 191.
Senecio 302. 346.
Seriana Blum. 153.
Sertürnera Mart. 106. 107.
Sesbana Poir. 284.
Sesbania Kunth. 283.
Seſeli 118.
Seſeli Koch. 119.
Seſsleria Scop. 34.
Setaria P. B. 33.
Sibbaldia 341.
Sibthorpia 49. 63. 223. 236.
Sida 259.
Sideroxylon 70.
Sieverſia W. 199. 344.
Silaus Beſſ. 118.
Silene 182-183.

Simaba Don. 163.
Simaruba Hilar. 163.
Sinapis 244.
Sinapis Presl. 243.
Sinningia Nees. 223. 238.
Sifon 118.
Sifymbrium 243.
Sifymbrium Monnard. 242.
Sium 120.
Smilax 137.
Sodada Delil. et Forsk. 145. 147. 204.
Solanum 71-72.
Solea * 97-98.
Solulus Rumph. 170.
Sonerila Roxb. 22. 23.
Sophora 170.
Sophora Burch. et al. 171. 172. 176. 262.
Sopubia Hamilt. 222. 235.
Soulamea Lam. 150. 141. 263.
Spartina Schreb. 31.
Spartium 266.
Spathodea P. B. 237.
Spathularia Hilar. 99.
Spergula L. 182. 183.
Spermacoce 40.
Spermadictyon Roxb. 73.
Sphaeria Hall. 332.
Sphaerocarya Wallich. 51. 101.
Sphaerophoron Perf. 531.
Sphaeroplyfa Cand. 278.
Sphaeroftema Blum. 247. 261.
Spigelia 58-59. 339.
Spiraea 195.
Spixia Leandr. 317.
Stachys 229.
Stachytarpheta Vahl. 16.
Stackhoufia Labill. 124.
Stalagmites Murr. 189.
Staphylea 124.
Statice 126-127.
Stelis Sw. 308.
Stemodia 235.
Stenarrhena Don. 222. 225.
Stenomeffon Herb. 132.
Stephania W. et Cand. 139.
Sterculia 256.
Steriphoma * 130. 139.
Sticta Schreb. 330-331.
Stipa 30-31.
Stipa Nees et Müll. 55. 537.
Stizolobium P. Br. 281.
Stizolobium * 281.
Streptopus Mx. 136.
Strumaria Jacqu. 134.
Strychnos 71.
Stylocoryna Cav. 50. 85.
Stylophorus Nutt. 203.
Stylosanthes Sw. 289.
Styphelia Labill. 67.
Succifa Vaill. 38.
Sutherlandia R. Br. 278.
Swartzia W. 202-203.
Swertia 113.
Symphyonema R. Br. 46.
Symphytum 55.
Syndefmis Wallich. 51. 92.
Syrrhopodon Schwägr. 321.

T.

Tabernaemontana 65.
Talafium *. 22. 30.
Talauma Hilar. et Blum. 216-217.
Tamonea Aubl. 251.
Tamus Herit. 143.
Tanacetum L. 300.
Taverniera Cand. 290.
Tephrofia Perf. 274-275.
Ternftrömia Don. 206. 210.
Teftudinaria Burch. 143.
Tetracera 213.
Tetragonia 196.
Tetranthera Jacqu. 156.
Tetratheca Sm. 147.
Teucrium 226.
Teucrium Poir. et Sieb. 19. 226.
Thalictrum 221.
Thapfia 122.
Thelephora Ehrh. 334.
Thenardia Kunth. 65.
Theodora Medic. 254.
Theophrafta Hortul. et Spr. 94. 340.
Thermia Nutt. 171.
Thermopfis Don. et Cand. 171.
Thefium 108-109.
Thefpefia Corr. 257.
Thlafpi 240.
Thouinia Poit. 150.
Thrincia Roth. 305.
Thuia 315.
Thunbergia 257.
Thymus 224-225.
Thyffelium Riv. 119.
Tiarella 178.
Tigridia Herb. 24.
Tillaea Sieb. 48.
Tillaudfia 151.
Tofieldia Hudf. 142.

Tordylium 341.
Torenia 254.
Torilis Gärtn. 119.
Tournefortia 66.
Trachymene Rudg. 116-117.
Tradescantia 138.
Tragopogon 304.
Trematodon * 322.
Tribrachia Lindl. 306. 309.
Tribulus 343.
Trichilia 247. 252.
Trichilia Blum. 252.
Trichospermum Blum. 202. 210.
Trichosporum Don. 238.
Trichostomum Hedw. 322-323.
Tricratus Herit. 53.
Trifolium 271-272.
Triglochin 142.
Triosteum 82.
Triphasia Lour. 141.
Triraphis R. Br. 34.
Tristicha Thuar. 4. 10.
Triticum 337.
Triumfetta 190.
Trixis P. Br. 300.
Trollius 220.
Trommsdorffia Mart. 103. 104.
Tulipa L. 142.
Turnera 124.
Turpinia Perf. 293.
Typha 315.

U.

Udora Nutt. 25.
Uncaria Roxb. et al. 80. 81.
Uncinia Perf. 313.
Uniola Torr. 36.
Unona 215-216.
Urceolaria Feuill. 336.
Urena 257-258.
Urochloa P. B. 53.
Uropetalum Ker. 135.
Urophyllum Wallich. 85.
Urtica 313.
Utricularia (l. Urceol.) 16. 234. 336.
Uvaria 216.
Uvularia 136.

V.

Vaccinium 147.
Vaccinium * 160.
Valeriana 22-25.
Valeriana Brot. 25.
Valerianella Loif. 23.
Vallaris R. Br. 65.
Vanda R. Br. 306.
Vandellia P. Br. 254.
Vangueria Juff. 85.
Vareca Roxb. 93-94.
Varennea Cand. 268.
Vascoa Cand. 274.
Vaucheria Cand. 332.
Velloſia Vand. 296.
Velloſia Mart. 137.
Venana Lam. 94.
Verbaſcum 63.
Verbena 250.
Verbeſina 303.
Vernonia Schreb. 298.
Vernonia * 299.
Veronica 17.
Viborquia Ort. 268.
Viburnum 122.
Vicia 284.
Vigna Sav. 280.
Vilfa Trin. 337.
Vilmorinia Cand. 282.
Vinca 65.
Viola 96-97.
Viola W. 76.
Virgilia Lam. 171.
Viſcum 47.
Viſenia Houtt. 248.
Vitis 89-90.
Vitmannia Vahl. 145.
Viviania Radd. 326.
Vochyſia Mart. 9.
Vrolikia * 222.

W.

Wahlenbergia Don. 78.
Wallenia Sw. 41.
Waltheria 248-249.
Warneria Mill. 220.
Webera Schreb. 83.
Weinmannia 152-153.
Weiſia Hedw. 321 322.
Weſtringia Sm 226
Wikſtrœmia Schrad. 260.
Willichia Mart. 26
Willughbeia Scop 71.
Wittelsbachia Mart. 206
Wormia Rottb. 202. 213.
Wrightia R Br. 65.
Wulfenia Sm. 16.
Wurmbea Thunb. 143.

X.

Xanthium 314.
Xanthoſia Rudg. 114.

Xanthoxylon 125.
Xerophyta Juff. 137.
Xylocarpus Schreb. 147.
Xyloma Perf. 332.
Xylopia 215.

Y.

Yucca 132.

Z.

Zapania Mart. 231.
Zeyheria Mart. 237.
Zephyranthes Sims. et Lindl. 132. 133.
Zigadenus Mx. 142.
Zingiber Gärtn. 7.
Zizyphus Tournef. 86-87.
Zizyphus Wallich. 86.
Zonaria Ag. 331.
Zornia Mx. 289.
Zuccarinia * 50. 81.
Zwingera Schreb. 163.
Zygnema Ag. 331.
Zygophyllum 164.

APPENDIX.

HENRICI SCHOTT
FASCICULUS PLANTARUM BRASILIENSIUM.

Henricus Schott, hortulanus Vindobonenſis, e Braſilia, quam 1817 et 1818 inviſit, ingentem plantarum copiam reportavit. Earum faſciculum, ut curis poſterioribus inſererem, additis characteribus ad me miſſum cum fero acceperim, nolui tamen deeſſe juveni et doctrina et rei herbariae ſcientia inſtructo, quando praeſertim cognovi ex ipſis exemplaribus, nova plura adeſſe, quae alios fugiſſe ſcrutatores viderentur. Itaque ſumma omnia feci, ut et hae ſymbolae, ſueto ordine digeſtae, quamprimum in lucem prodirent.

CL. I.

1. *Broſimum microcarpon* Schott. nullo modo a Br. *Alicaſtro* Sw. diverſum reor. Namque differentia ipſa a Schottio indicata „ramulorum petiolorumque hirtorum," ut exemplaria miſſa docuerunt, in cultis evaneſcit. Notandum tamen, hanc ſpeciem, Jamaicae alioquin peculiarem, et Braſiliae incolam eſſe.
2. *Broſimum discolor* Schott. Br. foliis ovato-ellipticis acutis ſupra nitidis ſubtus glaucis, ramulis pubeſcentibus, fructibus ſucculentis. Egregia et optime diſtincta ſpecies.

CL. IV.

3. *Rhopala multiflora* Schott. Rh. foliis lanceolatis utrinque attenuatis reticulato-venoſis, racemis terminalibus compoſitis calycibusque flavido-tomentoſis, ſtaminibus baſilaribus. Rh. polyſtachyae Humb. affinis (vol. 1. p. 482.) ſed omnino diverſa.

CL. V.

4. *Cordia frondoſa* Schott. C. foliis ovatis acuminatis integerrimis ſupra punctato-ſtellatis ſubtus albido-tomentoſis, floribus paniculato-corymboſis, calycibus truncatis ſulcatis tomentoſis. Finitima C. rotundifoliae R. et P. (vol. 1. p. 649.)
5. *Solanum violaefolium* Schott. S. caule herbaceo radicante, foliis geminis inaequalibus utrinque hirſutis, altero cordato ſubrotundo, altero reniformi, pedunculis ſolitariis axillaribus, calycibus 10fidis. Pertinet ad ſeriem vol. 1. p. 686. pone S. ſylvaticum Dun.

6. Alseïs Schott.

(*Ἀλσηΐδες*, nymphae lucorum, Apollon. Rhod.)

Cal. ſuperus 5partitus. Cor. cyathiformis, limbo 5lobo, fauce barbata. Stamina ad baſin usque corollae libera exſerta. Stigma 2partitum. Germen 2loculare multi-ovulatum.

[Genus Macrocnemo proximum: id vero et calyce obſolete dentato et corolla infundibuliformi et ſtaminum inſertione ad faucem differt. Machaonia Humb., quam ſedulo comparavi, habitu ſimilis, differt eadem ſtaminum inſertione, praecipue vero fructu 2ſpermo.]

A. *floribunda* Schott. Arbor mediocris, foliis oblongis acuminatis utrinque piloſiusculis, ſpicis ramoſis terminalibus, floribus parvis ochroleucis.

7. *Pſychotriam ſtenophyllam* Schott. a Pſ. *noxia* Hilar. cur. poſt. p. 78. diſtinguere nequeo. Adeſt etiam jam Pſ. ſtenophylla * vol. 1. p. 744.

8. 9. *Hirtellas* duas, *tomentellam* et *anguſtifoliam* Schott. jam ſupra p. 341. recenſui.

10. *Hirtella indecora* Schott. eſt H. *paniculata* Lam. vol. 1. p. 766.

11. *Büttneria laevigata* Schott. eſt B. *Gayana* Hilar. cur. poſt. p. 93.

12. Dimorphandra Schott.

Cal. urceolatus 5fidus. Petala 5 patentiſſima ſtaminifera. Stamina abortientia totidem petaloidea ſpathulata, unguiculis linearibus. Lomentum lignoſum polyſpermum latice balſameo farctum.

[Genus ad Proſopin quadammodo accedens, ſed ſtaminibus abortientibus ſatis diverſum. Locum habet vol. 1. p. 794. poſt Humboldtiam.]

D. *exaltata* Schott. Arbor procera, foliis 2pinnatis, foliolis oblongis ſupra nitidis ſubtus hirſutis, ſpicis paniculatis terminalibus, floribus luteis.

13. *Hydrolea elatior* Schott. H. glabra, foliis lineari-lanceolatis, floribus lateralibus terminalibusque cymoſis. Proxima H. corymboſa differt foliis lanceolatis, calycibus hiſpidis. vol. 1. p. 865.

14. *Aſtronium concinnum* Schott. A. foliis pinnatis glabris, foliolis 3jugis oblique ovato-oblongis acuminatis integerrimis, paniculis ♀ nutantibus. In corolla ♀ ſtaminodia 5 erecta, antheris ſterilibus baſi 2partitis.

15. *Aſtronium fraxinifolium* Schott. A. foliis pinnatis hirſutiuſculis, foliolis 6-8jugis lanceolatis acuminatis ſerratis, paniculis ♀ erectis. In corolla ♂ nectarium 10lobum, in ♀ ſtaminodia 5 erecta, antheris ſterilibus minutis.

CL. VI.

16. Myrrhinium Schott.

Cal. ſuperus 4fidus. Cor. 4petala. Filamenta ſubulata, in aeſtivatione verſus petalum 2plicata. Antherae oblongae. Bacca calyce coronata 3-4locularis, loculis polyſpermis.

[Myrteis accenſet cl. auctor: mihi ſatis finita et ab omnibus tom. 2. p. 11. enumeratis diverſa videtur.]

M. *atropurpureum* Schott. Frutex orgyalis, foliis oppoſitis ellipticis coriaceis glabris punctatis ſubtus ferrugineis, floribus cymoſis 2bracteatis atropurpureis. Stamina longiſſima. Semina ſubreniformia. Embryo inſigniter curvatus.

CL. VII.

17. *Petrocaryam braſilienſem* Schott. a P. montana W. (Parinari Aubl.) diſtinguere nequeo. Stamina enim minus exſerta haud tanti videntur, ut, cum alia omnia congruant, ſpecies nova iis ſtabiliatur.

CL. VIII.

18. *Seriana ſtans* Schott. S. erecta, foliis impari-pinnatis glabris ſupra nitidis, foliolis oblique lanceolatis inaequaliter ſerratis, paniculae terminalis ramis flavido-tomentoſis, alis ſamararum apice confluentibus.

19. *Coccoloba peltata* Schott. C. ſcandens, foliis coriaceis peltatis ſubrotundo-ovatis acutis laevibus, racemis florum erectis.

20. *Coccoloba parvifolia* Schott. C. foliis coriaceis obovato-ellipticis utrinque attenuatis glabris, racemis florum ſpicatis erectis.

21. *Haloragis tetrandra* Schott. H. herbacea ſimplex, foliis ſpathulato-linearibus ſubintegerrimis, floribus aggregatis ſubſeſſilibus minutiſſimis tetrandris.

CL. IX.

22. *Perſea floribunda* Schott. eſt P. *Boſo* * vol. 2. p. 269.

23. *Perſea anguſtifolia* Schott. videtur P. *pſychotrioides* * ib.

24. *Perſea incana* Schott. P. foliis oblongo-lanceolatis utrinque attenuatis incano-tomentoſis, venis prominentibus, paniculis folio brevioribus, calycibus tomentoſis.

25. *Perſea puberula* Schott. P. foliis lanceolatis acuminatis ſupra nitidis ſubtus pubeſcentibus, venis prominentibus, paniculis folia ſubaequantibus, calycibus tomentoſis. P. *lineata* * vol. 2. p. 270. proxima.

26. *Perſea lancifolia* Schott. P. foliis lanceolatis utrinque attenuatis glaberrimis nitidis ſubtus glaucis, venis immerſis, racemis axillaribus folio brevioribus, calycibus pubeſcentibus.

27. *Perſea indecora* Schott. P. foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris nitidis, venis prominentibus, racemis axillaribus terminalibusque folio brevioribus, calycibus glabris.

28. † *Cryptocarya hirſuta* Schott. Cr. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis ſubtus ramulisque hirſutis, paniculis axillaribus terminalibusque.

CL. X.

29. *Styrax macrophyllus* Schott. eſt St. *tomentoſus* Humb.

30. *Styrax glabratus* Schott. St. foliis ovato-lanceolatis utrinque attenuatis glabris, venis coloratis, pedunculis subracemosis calycibusque albido-tomentosis.

31. ACOSMIUM Schott.

Cal. campanulatus 4-5fidus. Petala 5 patentissima. Stamina imo calyci inserta. Germen elongatum forte in legumen abit.

[Est *Sweetia* * vol. 2. p. 171., quam e manco exemplari rite enucleare nequivi. Nomen meum, ut prius, retinendum esse videtur.]

lentiscifolium Schott. (Sweetia fruticosa * melius *lentiscifolia* *.) Arbor alta foliis impari-pinnatis, foliolis elliptico-lanceolatis venulosis utrinque nitidis, ramis racemiferis aphyllis, floribus flavis.

32. EXOSTYLES Schott.

Cal. clavatus, laciniis 3 tandem revolutis. Petala 5 subaequalia imbricato-conniventia calyci medio inserta. Stamina subaequalia, filamentis basi dilatatis, antheris sagittatis cuspidatis. Stylus elongatus simplex. Legumen crassum polyspermum.

venusta Schott. Arbor ramis villosis, foliis impari-pinnatis, foliolis ovatis utrinque pilosiusculis, pedunculis subracemosis bracteatis, floribus roseis.

33. †CAULOTRETUS Rich. ?SCHNELLIA Radd.

Cal. subcampanulatus 5dentatus. Pet. 5 calycis fundo inserta unguiculata subaequalia. Stam. 10, alterna minora. Legumen membranaceum medio sub-1spermum, non dehiscens.

smilacinus Schott. Frutex scandens, ramis cirriferis, foliis indivisis ovatis acuminatis 5nerviis glabris, racemis spicatis elongatis.

34. MELANOXYLON Schott.

Calycis sepala 5 basi concreta. Pet. 5 subaequalia. Stamina hirsuta, antheris longitudinaliter dehiscentibus. Legumen compressum falcatum. Semina arillo in alam producto transverse leguminum cavitates implente.

Bräuna Schott. Arbor altissima ligno fusco-atro, foliis impari-pinnatis subtus hirsutis, foliolis oblongo-lanceolatis, racemis paniculatis ferrugineo-tomentosis.

35. *Combretum gracile* Schott. C. foliis oppositis oblongis utrinque attenuatis integerrimis glaberrimis nitidis, racemis laxis compositis pendulis, staminibus calycem urceolatum subaequantibus, petalis spathulato-linearibus.

CL. XII.

36. *Prunus brasiliensis* Schott. est Pr. *sphaerocarpa* Sw.

37. †*Chrysobalanus ovalifolius* Schott. Chr. foliis coriaceis subcordato-ellipticis obtuse apiculatis subtus argenteo-

tomentosis, floribus hermaphroditis, staminibus glabris.

38. † *Chrysobalanus macrophyllus* Schott. Chr. foliis cordato-oblongis obtusis elongatis coriaceis supra nitidis subtus albo-tomentosis, venis parallelis prominentibus, floribus hermaphroditis.

In utraque specie praeter stamina fertilia septena adsunt sterilia minuta.

39. *Mollinediae brasilienſis* nomine misit Schottius *Citrosmam*, quam *Schottianam* nuncupo, foliis ovato-oblongis versus apicem serratis subtus hirsutis, pedunculis elongatis, fructibus tomentosis. Mollinediam R. et P. haud satis notam, ad Citrosmam pertinere reor.

CL. XIII.

40. *Swartzia micropetala* Schott. est Sw. myrtifolia Sm. cur. post. p. 202.

41. *Swartzia elegans* Schott. Sw. foliis pinnatis 3jugis, petiolo marginato, foliolis ovato-lanceolatis acutis subretusis nitidis, racemis axillaribus pauciflоris, petalo cordato-subrotundo unguiculato insigni.

42. Ascra Schott.

[Ἄσκρα, δρῦς ἄκαρπος Hesych.]

Cal. inferus 3sepalus. Cor. 3petala. Filamenta capillaria. Stylus brevis persistens. Germen 1loculare, placentis tribus parietalibus, ovulis plurimis. *Guttiferis* accensenda.

brasilienſis Schott. Arbor mediocris, foliis alternis ovatis utrinque attenuatis obsolete dentatis 5plinerviis glabris, paniculis thyrsoideis pubescentibus, floribus flavidis.

43. † Othlis Schott.

[Ὄθλις Geopon. 2, 4. forte corrupte.]

Cal. 5sepalus 2bracteatus persistens, sepalis bracteisque imbricatis concavis. Pet. 5 decidua. Antherae elongatae lineares continuae, loculis lateralibus tenuissimis. Caps. sub-1sperma. Sem. arillatum. *Dillenieis* forte adnumeranda.

O. *castaneaefolia* Schott. Frutex sarmentosus, foliis alternis sursum confertis oblongis serratis glabriusculis, floribus lateralibus sessilibus.

[Delima guianensis Rich. vol. 2. p. 597. est proxima.]

44. *Begonia hispida* Schott. B. suffruticosa hispida, foliis semicordatis hinc acuminatis inaequaliter denticulatis, panicula multiflora, fructuum ala tertia maxima rotundata.

45. *Begonia vitifolia* Schott. B. suffruticosa hispida, foliis inaequaliter reniformibus angulato-lobatis serratis, floribus hirsutis.

[Magnopere dubia, quando B. reniformis Dryandr. nimis est propinqua.]

46. *Begonia platanifolia* Schott. B. suffruticosa, foliis inaequaliter reniformibus multifidis serrulatis hispidiusculis subtus purpurascentibus, laciniis acutis serrulatis.

47. *Begonia lobata* Schott. B. ſuffruticoſa incano-tomentoſa, foliis inaequaliter reniformibus obtuſe lobatis denticulatis, fructuum ala tertia maxima lineari-elliptica horizontali.

48. *Begonia tomentoſa* Schott. B. ſuffruticoſa, foliis inaequaliter reniformibus ſubtus ferrugineo-tomentoſis denticulatis, fructuum alis binis obtuſis, tertia maxima acuta.

49. *Begonia parvifolia* Schott. B. fruticoſa glabra, foliis ſemicordatis ovato-lanceolatis acuminatis undulato-denticulatis glanceſcentibus, fructuum ala tertia elliptica maxima.

50. *Begonia undulata* Schott. B. fruticoſa glaberrima, foliis ſubſemicordato-lanceolatis acuminatis repando-undulatis, fructuum alis ſubaequalibus rotundatis.
[B. pulchella Radd. proxima, ſed folia dentato-ſerrata.]

51. *Begonia besleriaefolia* Schott. B. fruticoſa ſcandens ramoſiſſima, foliis ſubſemicordato-oblongis acuminatis integerrimis ſupra glabris ſubtus hirſutis, fructuum alis binis obſoletis, tertia maxima rotundata.

52. *Begonia populifolia* Schott. eſt B. *ſcandens* Sw. Adeſt jam B. populifolia Kunth. cur. poſt. p. 212. aliena.

53. *Begonia depauperata* Schott. B. acaulis ſubbifolia, foliis ſubcordato-oblongis acuminatis inaequaliter ſerratis glabris ſupra albo-maculatis ſubtus purpuraſcentibus, floribus ♂ ſubternis 2petalis, filamentis in columnulam elongatam concretis.

54. *Begonia concinna* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ellipticis acuminatis integerrimis utrinque piloſis, florum ♂ petalis exterioribus orbiculatis, fructuum alis binis ſubparallelis rotundatis, tertia maxima obtuſa.

55. *Begonia peltifolia* Schott. B. acaulis, foliis peltatis oblique ovatis acutis integerrimis ſupra glabris ſubtus ferrugineo-tomentoſis, fructuum alis binis rotundatis, tertia maxima obtuſa.

56. DASYNEMA Schott.

Cal. 4-6-8ſepalus. Cor. 0. Stamina hirſuta receptaculo hiſpido inſerta. Antherae longitudinaliter dehiſcentes. Styli 3, 4. Capſ. ſetoſa 4valvis 1ſperma. Semen arillatum.
[*Dillenieis* omnino accenſenda. Ab Ablania et Tetracera differt et antherarum fabrica et ſtylis et fructu.]

D. *hirſutum* Schott. D. foliis breviter petiolatis obovato-lanceolatis acuminatis ſubtus villoſis, calycibus 4ſepalis, antheris muticis.

57. D. *pubeſcens* Schott. D. foliis longe petiolatis oblongis acutiusculis ſubtus pubeſcentibus, calycibus 6-8ſepalis, antheris apice appendiculatis.

58. *Laplacea inaequilatera* Schott. L. foliis inaequilateris ſpathulato-lanceolatis hinc ſerratis illinc integerrimis, floribus 5petalis. Eſt Haemocharis ſemiſerrata Mart. Gordonia cur. poſt. p. 260.

CL. XIV.

59. *Ruellia pulchella* Schott. eſt R. foetida Humb.
60. *Ruellia ſpecioſa* Schott. R. ſuffruticoſa, foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis integerrimis utrinque hiſpidiusculis, ſpicis axillaribus laxis, bracteis foliaceis maximis, ſepalis linearibus longiſſimis.
61. *Chaſmiae ochroleucae* nomine miſit *Bignoniam*, quam *candicantem* Richardi habeo, etiamſi haec haud idoneo modo definita ſit. Folia enim inferiora ſunt ternata, ſuperiora binata, foliola ovata ſeu ſubrotundo-elliptica obtuſa ſubtus tomentoſa, flores paniculati minuti.

CL. XVI.

62. *Myriſtica Bicuhyba* Schott. M. foliis alternis diſtichis lineari-lanceolatis ſubtus glaucis, floribus glomerato-racemoſis pedicellatis Sandris.

CL. XVII.

63. *Trigonia parviflora* Schott. Tr. foliis ellipticis utrinque integerrimis ſubtus floccoſis demum glabratis, paniculis racemoſis axillaribus.

CL. XIX.

64. *Carphobolum ſeſſiliflorum* Schott. dicit *Conyzam lucidam* * vol. 1. p. 509. Eſſe receptaculum paleoſum, quod ſecus mihi in conſpectum venit. Squamae enim anthodii aliquot interiores videntur quidem receptaculum obſidere, ſed ſupereſt ſpatiolum centrale nudum. Si receptaculum vere eſſet paleaceum, Caſſiniae R. Br. ſpeciem dixeris, cui vero repugnaret habitus et patria. Accedit, quod altera ſpecies
65. *Carphobolus umbellulatus* Schott. ne veſtigium quidem palearum in receptaculo oſtendat. Eſt nimirum *Eupatorium umbellulatum* *, collocandum vol. 3. p. 412. poſt E. discolor *, et ſic definiendum: E. foliis alternis oblongis acutis integerrimis ſupra nitidis ſubtus incano-tomentoſis, pedunculis axillaribus aggregatis 1floris, ſquamis anthodii appreſſis fuſcis.

CL. XXI.

66. *Ficus longifolia* Schott. F. foliis utrinque glabris oblongo-lineariibus acuminatis coriaceis nitidis breviſſime petiolatis. Collocanda vol. 3. p. 781. poſt F. americanam Aubl.
67. *Ficus adhatodaefolia* Schott. F. foliis utrinque glabris ovato-lanceolatis acuminatis ſub-3nerviis, receptaculis pedunculatis ſolitariis. Quanquam F. nervoſa Roth. vol. 3. p. 781. nimis ſit propinqua, haud arbitror tamen eamdem eſſe.
68. *Ficus cluſiaefolia* Schott. F. foliis utrinque glabris coriaceis obovatis obtuſiſſimis, venis parallelis ſubimmerſis. F. griſea Vahl. l. c. nimis affinis.
69. *Ficus ceſtrifolia* Schott. F. foliis utrinque glabris ſubcordato-lanceolatis acuminatis opacis ſub-3nerviis.

70. *Ficus eximia* Schott. F. foliis utrinque glabris amplis cordato-oblongis acutis ſubmembranaceis glauceſcentibus. Collocanda vol. 3. p. 778. poſt pedunculatam Ait.

71. *Ficus pulchella* Schott. F. foliis ſubtus ſcabris lanceolatis acuminatis ſubmembranaceis, venis parallelis approximatis, receptaculis pedunculatis majusculis. Affinis F. Radula W. p. 782., quae vero foliis coriaceis differt.

72. *Ficus hirſuta* Schott. F. foliis utrinque hirſutis oblongis obtuſiusculis triplinerviis. Affinis F. clethraefolia W. p. 782.

73. *Ficus holoſericea* Schott. F. foliis late cordatis oblongis acutiusculis ſubundulatis utrinque villoſis, ramulis petiolisque fulvo-hirſutis.

74. *Ficus ruſa* Schott. F. foliis ſubcordato-oblongis acutis ſupra nitidis ſubtus fulvo-pubeſcentibus, petiolis fulvo-hirſutis. Utraque affinis F. fulvae * p. 779., ſed haec folia habet obtuſa, pubem ſubtus denſam tomentoſo-hirſutam.

CL. XXII.

75. †PERIDIUM Schott.

Flores dioeci. Cal. 2ſepalus. Petalum 1 veſicaeforme hinc rimula hians. Nectaria 0. Stamina circiter 12 polyadelpha, antheris baſi fixis 4gonis. ♀ ignot.

[Genus propter flores ♀ et fructus ignotos dubium, *Peraeae*, quam Mutiſius (Stockholm. acad. handl. 1784. p. 299.) deſcripſit, ſatis affine, nectariorum vero, ſeu membranularum multifidarum ſtamina ſtipantium defectu differens. Tricoccis accenſendum omnino videtur.]

P. *obtuſifolium* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtuſis integerrimus ſupra glabris ſubtus ſparſe, floribus aggregatis pedunculatis extus conferte aureo-lepidotis. Gemmae florum plurimae abortiunt, una aut altera perficitur.

76. *Peridium ferrugineum* Schott. P. foliis oblongis utrinque attenuatis ſupra laevibus nitidis ſubtus ſparſe, ramis laxis pedunculisque ſubſolitariis conferte ferrugineo-lepidotis.

77. *Peridium glabratum* Schott. P. foliis obovato-oblongis obtuſiusculis utrinque glabris ſubtus ſubruſeſcentibus, pedunculis ſubſolitariis calycibusque denſe lepidotis.

HALIS, *typis expreſſum Gebauerianis.*